

RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL

1ª via Farmácia

Emitente: ANA CATARINA MATOS ISHIGAMI ALVINO CREMEPE 20552/PE

Endereço: Av. Antônio de Goes, 449, 9 andar, Espaço Maetamorfose, Pina, Recife-PE CEP 51110-000, 449, Pina, Recife, PE, 51110-000 **Tel:** (81) 3125-5795 / (81) 98183-1601

Paciente: Mateus Amorim de Almeida Marques **CPF:** 064.634.954-68

Endereço: Rua da Estrela, 203 - apt 2101, Parnamirim, Recife - Pernambuco, 52060282

1. OBS. SEMPRE ENTRAR EM CONTATO COM O PEDIATRA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE O USO DAS MEDICAÇÕES E CONDUÇÃO DO CASO.

Uso Oral

1. Ondansetrona 4mg ----- 1 caixa

(Ondif)

1/3 (UM TERÇO) do filme a cada 8 horas se vômitos ou náuseas.

2. Probiótico (Florax SM, Floratil, Repoflor, Enterogermina) -----

----- 1 caixa

Tomar 1 flaconete ou 1 sachê (diluído em água), uma a duas vezes ao dia, enquanto perdurar a diarreia.

3. Desloratadina 0,5mg/ml -----

----- 1 caixa

Tomar 2,0 ml, 1x ao dia, por 7 dias, em casos de reação alérgica.

4. Pergo 2mg/ml ----- 1 frasco

Dar 1,5 ml, via oral, 8/8h, se rash alérgico

5. Dipirona solução infantil 50mg/ml ----- 1 caixa

Tomar 2,0 ml de 6/6h se dor ou temperatura maior que 38°C.

6. Ibuprofeno gotas 100mg/ml ----- 1 caixa

Tomar 6 gotas de 6/6h se dor ou temperatura maior que 38°C.

RECEITAAMIGO.COM.BR



DGF5UVE

7. Prednisolona (Predsim) 3mg/ml ----- 1 caixa
Tomar 2,5 ml, uma vez ao dia, por 3 dias, em casos de crises de asma ou reações urticariformes.

8. Amoxicilina 400mg/5ml + Clavulanato de potássio 57mg/5ml (novamox 2x) ----- 60 ml
Tomar 2,0 ml, via oral, 12/12h durante 10 dias

9. Cefadroxila 250mg/5ml ----- 60 ml
Tomar 3,5 ml, via oral, 12/12h, durante 7 dias

Uso inalatorio

10. Aerolin 100mcg/dose ----- 1 unidade
Aplicar 4 jatos com espaçador e máscara 6/6h, durante 5 dias, se crise de sibilância.

11. Espaçador e máscara infantil ----- 1 unidade

Uso nasal

12. Maxidrate gel nasal ----- 2 frascos
Aplicar em narinas para evitar ressecamento

Uso oftalmológico

13. Tobradex colírio ----- 1 frasco
Aplicar 1 gota em cada olho, 4/4h, durante 7 dias

Uso tópico

14. Verutex B ----- 1 tubo
Aplicar 2x ao dia em lesões de pele, durante 5 dias.



AMIGOSIGN ASSINATURA DIGITAL

A assinatura válida está incorporada no arquivo PDF e pode ser validada no site <https://validar.iti.gov.br>.

ANA CATARINA MATOS ISHIGAMI ALVINO

Dra. ANA CATARINA MATOS
ISHIGAMI ALVINO

Médico pediatra neonatologista
CREMEPE 20552/PE RQE 4727

RECEITAAMIGO.COM.BR



DGF5UVE

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR		IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR	
NOME:			
IDENT:	ORG. EMISSOR:		
END:			
CIDADE:	UF:		
TELEFONE:		ASS FARMACÊUTICO DATA: / /	

RECEITAAMIGO.COM.BR



DGF5UVE

RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL

2ª via Paciente

Emitente: ANA CATARINA MATOS ISHIGAMI ALVINO CREMEPE 20552/PE

Endereço: Av. Antônio de Goes, 449, 9 andar, Espaço Maetamorfose, Pina, Recife-PE CEP 51110-000, 449, Pina, Recife, PE, 51110-000 **Tel:** (81) 3125-5795 / (81) 98183-1601

Paciente: Mateus Amorim de Almeida Marques **CPF:** 064.634.954-68

Endereço: Rua da Estrela, 203 - apt 2101, Parnamirim, Recife - Pernambuco, 52060282

1. OBS. SEMPRE ENTRAR EM CONTATO COM O PEDIATRA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE O USO DAS MEDICAÇÕES E CONDUÇÃO DO CASO.

Uso Oral

1. Ondansetrona 4mg ----- 1 caixa

(Ondif)

1/3 (UM TERÇO) do filme a cada 8 horas se vômitos ou náuseas.

2. Probiótico (Florax SM, Floratil, Repoflor, Enterogermina) -----

----- 1 caixa

Tomar 1 flaconete ou 1 sachê (diluído em água), uma a duas vezes ao dia, enquanto perdurar a diarreia.

3. Desloratadina 0,5mg/ml -----

----- 1 caixa

Tomar 2,0 ml, 1x ao dia, por 7 dias, em casos de reação alérgica.

4. Pergo 2mg/ml ----- 1 frasco

Dar 1,5 ml, via oral, 8/8h, se rash alérgico

5. Dipirona solução infantil 50mg/ml ----- 1 caixa

Tomar 2,0 ml de 6/6h se dor ou temperatura maior que 38°C.

6. Ibuprofeno gotas 100mg/ml ----- 1 caixa

Tomar 6 gotas de 6/6h se dor ou temperatura maior que 38°C.

RECEITAAMIGO.COM.BR



DGF5UVE

7. Prednisolona (Predsim) 3mg/ml ----- 1 caixa
Tomar 2,5 ml, uma vez ao dia, por 3 dias, em casos de crises de asma ou reações urticariformes.

8. Amoxicilina 400mg/5ml + Clavulanato de potássio 57mg/5ml (novamox 2x) ----- 60 ml
Tomar 2,0 ml, via oral, 12/12h durante 10 dias

9. Cefadroxila 250mg/5ml ----- 60 ml
Tomar 3,5 ml, via oral, 12/12h, durante 7 dias

Uso inalatorio

10. Aerolin 100mcg/dose ----- 1 unidade
Aplicar 4 jatos com espaçador e máscara 6/6h, durante 5 dias, se crise de sibilância.

11. Espaçador e máscara infantil ----- 1 unidade

Uso nasal

12. Maxidrate gel nasal ----- 2 frascos
Aplicar em narinas para evitar ressecamento

Uso oftalmológico

13. Tobradex colírio ----- 1 frasco
Aplicar 1 gota em cada olho, 4/4h, durante 7 dias

Uso tópico

14. Verutex B ----- 1 tubo
Aplicar 2x ao dia em lesões de pele, durante 5 dias.



AMIGOSIGN ASSINATURA DIGITAL

A assinatura válida está incorporada no arquivo PDF e pode ser validada no site <https://validar.iti.gov.br>.

ANA CATARINA MATOS ISHIGAMI ALVINO

Dra. ANA CATARINA MATOS
ISHIGAMI ALVINO

Médico pediatra neonatologista
CREMEPE 20552/PE RQE 4727

RECEITAAMIGO.COM.BR



DGF5UVE

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR		IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR	
NOME:			
IDENT:	ORG. EMISSOR:		
END:			
CIDADE:	UF:		
TELEFONE:		ASS FARMACÊUTICO DATA: / /	

RECEITAAMIGO.COM.BR



DGF5UVE