

# ІНСТРУКЦІЯ

## для медичного застосування лікарського засобу

### ЖИВОКОСТА МАЗЬ

(*SYMPHYTI UNGUENTUM*)

#### Склад:

**Діючі речовини:** 1 г мазі містить живокосту настойки (*Symphyti tinctura* (1:10), екстрагент - етанол 40%) - 100 мг, вітаміну Е масляного розчину 98% (в перерахунку на 100% вміст вітаміну Е) - 10 мг; допоміжні речовини: парафін білий м'який, олія кукурудзяна, гліцерин, емульгатор Т-2, метилпарагідроксибензоат (Е 218), ароматизатор 482.056, вода очищена.

**Лікарська форма:** Мазь. Основні фізико-хімічні властивості: мазь від кремового до світло-коричневого кольору з характерним запахом.

**Фармакотерапевтична група:** Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м'язовому болю. Код АТС М02А Х.

#### Фармакологічні властивості:

**Фармакодинаміка:** Дія препарату визначається компонентами, що входять до складу препарату: алантоїн, слизисті і дубильні речовини. Таніни живокосту прискорюють процеси загоєння ран і виразкових поразок, алантоїн стимулює ріст кісткової тканини, процеси регенерації епітелію, зменшує больові відчуття, надає кровоспинну і протизапальну дію. Фармакокінетика. Чи не визначалася.

#### Клінічні характеристики:

**Показання:** Ревматичний біль, невралгія, радикуліт, люмбаго, радикуліт, міалгія, артралгія, остеохондроз, артрити; спортивні, побутові травми (удари, розтягнення сухожиль, закриті переломи кісток). Сухість і тріщини шкіри; довгостроково незагойні рани; трофічні виразки.

**Протипоказання:** Підвищена чутливість до компонентів препарату.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій:** Невідомо. У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.

**Особливості застосування:** Для уникнення появи побічних ефектів необхідно попередньо нанести невелику кількість мазі на шкіру для визначення індивідуальної чутливості. Не наносити на шкіру з проявами алергічної реакції, на слизові оболонки, на відкриті рани. Не допускати попадання мазі в очі.

**Застосування в період вагітності або годування груддю:** Не застосовувати препарат в період вагітності або годування груддю.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами:** Невідомо.

**Спосіб застосування та дози:** Залежно від розміру поверхні ураженої ділянки мазь наносять товстим шаром і ретельно втирають в шкіру 2-3 рази на добу, на ніч можна наносити мазь під пов'язку. Курс лікування залежить від тяжкості захворювання, а також від характеру супутньої терапії і визначається лікарем індивідуально, але не повинен перевищувати 4-6 тижнів протягом року.

**Діти:** Застосування препарату дітям і підліткам до 18 років протипоказано.

**Передозування.** Можливе посилення проявів побічних реакцій. При прояві симптомів алергії препарат слід відмінити, залишки змити з шкіри. Терапія симптоматична.

**Побічні реакції:** Можливі реакції гіперчутливості (в т.ч. свербіж, набряк, лихоманка).

**Термін придатності:** 3 роки. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання:** Зберігати при температурі не вище 20С в захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

**Упаковка:** За 40 г в тубі в пачці, по 25 г або по 50 г, або по 90 г у банці в пачці.

**Відпускається:** без рецепта.

РП МОЗ України №UA/6235/01/01

Ліцензія: Серія АВ №598036 від 11 липня 2012 р.

Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прочитати інструкцію та проконсультуватись з лікарем. Зберігати в місцях недоступних для дітей.