

# ІНСТРУКЦІЯ

## з медичного використання препарату

# РОЗТИРАН

(*Rostiran*)

### Склад лікарського засобу:

**Діючі речовини:** 1 г мазі містить ментолу рацемічного 30,5 мг, камфори рацемічної 52,5 мг, тимолу 1 мг; ялицевої олії 0,0555 мл, евкаліптової олії 0,015 мл, мускатного масла 0,0055 мл;

**Допоміжна речовина:** вазелін.

**Лікарська форма:** Мазь. Біла, напівпрозора мазь із сильним специфічним запахом.

**Фармакотерапевтична група:** Засоби, які застосовуються місцево при болях у суглобах і м'язах. Код АТС M02A X10.

Механізм дії препарату обумовлений діючими речовинами і полягає в подразненні нервових закінчень, рефлекторному розширенні артеріол і капілярів. Препарат проявляє відволікаючу, місцево-подразнюючу, знеболювальну дію, помірно протизапальну, антисептичну, спазмолітичну дію.

### Показання для застосування:

Комплексна терапія гострих респіраторних захворювань, що супроводжуються ринітом, відчуттям закладеності носа, кашлем, головним болем.

Біль в суглобах і м'язах, невралгія, міозит, артрит, міалгія, артралгія, ревматизм, ішіас.

**Протипоказання:** Підвищена чутливість до компонентів препарату. Бронхіальна астма, пошкоджена або запалена шкіра, відкриті рани на ділянках застосування.

**Належні заходи безпеки при використанні:** Слід уникати потрапляння мазі в очі та на слизові оболонки. Не слід наносити мазь на пошкоджену шкіру.

При втиранні в шкіру виникає відчуття холоду, потім теплоти, слабого печіння і поколювання.

Після кожного використання мазі ретельно мити руки. При сильному подразненні шкіри втирання слід припинити.

**Особливі застереження:** Використання в період вагітності або годування груддю. З обережністю використовувати мазь в період вагітності або годування груддю, враховуючи співвідношення ризик/користь.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Зазвичай не впливає, але слід враховувати можливість виникнення непритомності і судом.

**Діти:** Препарат використовують дітям від 3-х років.

**Спосіб застосування та дози:** Зовнішньо для розтирань.

**Дорослим і дітям старше 6 років мазь наносять тонким шаром 2-4 рази на добу:**

1. при нежиті або при закладеності носа мазь наносять на неушкоджену шкіру крил носа;
2. при кашлі, пов'язаному з простудними захворюваннями, мазь наносять на верхні ділянки грудної клітини та ший і через 3-5 хвилин обережно втирають легкими масажними рухами;
3. при кашлі, пов'язаному з простудними захворюваннями, мазь наносять на верхні ділянки грудної клітини та ший і через 3-5 хвилин обережно втирають легкими масажними рухами;
4. при головному болю мазь наносять на шкіру скронь;
5. при болях в м'язах, суглобах втирають в шкіру ураженої ділянки, зверху накладають теплу пов'язку.

Дітям від 3 до 5 років мазь наносять тонким шаром на верхню ділянку спини 2-3 рази на добу, але ні в якому разі не на обличчя і крила носа.

**Курс лікування становить 3-5 діб.**

**Передозування:** Відчуття сильного тепла та печіння в місці нанесення мазі, можливо посилення проявів побічних дій. Лікування симптоматичне.

**Побічна дія:** Можливі алергічні реакції (в т.ч. гіперемія, відчуття свербіжу, висипання, кропив'янка), подразнення шкіри, контактний дерматит; головний біль, непритомність, збудження; можливе виникнення судом, викликаних камфорою; бронхоспазм. У дітей можливість розвитку дерматиту.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій:** не відомо.

**Термін придатності:** 3 роки.

Не вживати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання:** Зберігати в щільно закупореній тарі при температурі не вище 25 ° С в захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

**Упаковка:** За 25г в банку в пачці.

**Відпускається: без рецепта.**

РП МОЗ України №UA/6397/01/01

Ліцензія: Серія АВ №598036 від 11 липня 2012 р.

Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прочитати інструкцію та проконсультуватись з лікарем. Зберігати в місцях недоступних для дітей.