

*logo*  
(à déposer dans  
figures/logo\_lycee)

**Lycée Jean-Baptiste de Baudre**  
Agen

# Parcours de consolidation en mathématiques

*Semaine 6 • extrait du parcours complet*

*Spécialité CPI — Conception des Produits Industriels*

**Version étudiant**  
(énoncés et espaces de réponse)

De la rentrée aux vacances de la Toussaint

# Chapitre 6

## Semaine 6 : Dérivation

Cette semaine se compose de trois parties : (a) un rappel mathématique sur les notions à consolider, (b) des exercices classiques d'application directe (tronc commun aux quatre BTS), (c) des activités d'application en contexte CPI, qui réinvestissent ces notions dans des situations métier.

### Rappel mathématique


Cette semaine consolide la notion de dérivée d'une fonction et son interprétation comme taux de variation. La dérivation est l'outil de la première année de BTS pour étudier les variations, identifier les extremums et modéliser des grandeurs qui évoluent (vitesse, courant, débit).

### §1. Nombre dérivé et tangente

#### Définition – nombre dérivé

Le *nombre dérivé* d'une fonction  $f$  en un point d'abscisse  $a$ , noté  $f'(a)$ , est le **coefficient directeur de la tangente** à la courbe représentative de  $f$  au point  $(a; f(a))$ .

C'est aussi le *taux de variation instantané* de  $f$  en  $a$  : il indique à quelle vitesse  $f$  change autour de cette valeur.



## §2. Fonction dérivée

### Définition – fonction dérivée

La fonction dérivée de  $f$ , notée  $f'$ , associe à chaque  $x$  son nombre dérivé  $f'(x)$  (lorsqu'il existe).

### Propriété – dérivées usuelles

| $f(x)$          | $f'(x)$     |
|-----------------|-------------|
| $k$ (constante) | 0           |
| $x$             | 1           |
| $x^2$           | $2x$        |
| $x^3$           | $3x^2$      |
| $x^n$           | $n x^{n-1}$ |

*Exemple* – Si  $f(x) = x^5$ , alors  $f'(x) = 5x^4$ .

## §3. Règles de dérivation

### Propriété – opérations sur les dérivées

Pour deux fonctions  $u$  et  $v$  et un réel  $k$  :

$$(ku)' = k u', \quad (u+v)' = u' + v', \quad (u-v)' = u' - v'.$$

Ces règles permettent de dériver tous les *polynômes*.

*Exemple* – Si  $f(x) = 3x^2 - 5x + 4$ , alors  $f'(x) = 3 \times 2x - 5 \times 1 + 0 = 6x - 5$ .

*Exemple* – Si  $g(t) = t^2 + 3t$ , alors  $g'(t) = 2t + 3$ .

**Point de vigilance.** La dérivée d'une constante est nulle : pour  $f(x) = 4$ , on a  $f'(x) = 0$ , et non 4.

## §4. Interprétation : taux de variation

### Méthode – interpréter $f'$

La dérivée  $f'(a)$  donne le **taux de variation instantané** de  $f$  en  $a$ .

- Si  $f'(a) > 0$ ,  $f$  est croissante autour de  $a$ .
- Si  $f'(a) < 0$ ,  $f$  est décroissante autour de  $a$ .
- Si  $f'(a) = 0$ , la courbe a une tangente horizontale en  $a$  (souvent un *extremum*).

*Exemple* – La position d'un objet mobile est  $x(t)$ . Sa vitesse instantanée est  $v(t) = x'(t)$ .

*Exemple* – La charge d'un condensateur est  $q(t)$ . Le courant qui le traverse est  $i(t) = q'(t)$ .

**§5. Optimisation : trouver un extremum****Méthode – rechercher un extremum**

Pour trouver les valeurs de  $x$  où une fonction  $f$  admet un maximum ou un minimum :

1. On calcule  $f'(x)$ .
2. On résout  $f'(x) = 0$ .
3. On étudie le signe de  $f'(x)$  autour des solutions trouvées pour conclure (minimum ou maximum).

*Exemple – Soit  $C(x) = x^2 - 6x + 10$ . On a  $C'(x) = 2x - 6$ .*

*$C'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 3$ . Pour  $x < 3$ ,  $C'(x) < 0$  (décroissante) ; pour  $x > 3$ ,  $C'(x) > 0$  (croissante).*

*Donc  $C$  admet un minimum en  $x = 3$ , et  $C(3) = 9 - 18 + 10 = 1$ .*

**Exercices classiques**

Les huit premiers sont à traiter en priorité ; les quatre suivants, signalés *Pour aller plus loin*, sont à traiter en travail personnel ou si le temps le permet.

**Exercice 1**

Calculer la dérivée des fonctions suivantes.

- $f(x) = x^2$
- $f(x) = x^3$
- $f(x) = x^4$

Réponse :

**Exercice 2**

Calculer la dérivée des fonctions suivantes.

- $f(x) = 5$
- $f(x) = 3x$
- $f(x) = 7x + 4$

Réponse :

**Exercice 3**

Soit  $f(x) = 3x^2 - 5x + 4$ . Calculer  $f'(x)$ , puis  $f'(2)$ .

Réponse :

#### Exercice 4

Soit  $g(t) = 2t^2 + 3t - 1$ . Calculer  $g'(t)$ , puis  $g'(0)$  et  $g'(5)$ .

Réponse :

#### Exercice 5

Pour la fonction  $f(x) = x^2$ , calculer le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse  $x = 4$ .

Réponse :

#### Exercice 6

Soit  $f(x) = -x^2 + 4x$ . Calculer  $f'(x)$ , puis résoudre  $f'(x) = 0$ .

Réponse :

#### Exercice 7

La position d'un objet mobile est donnée par  $x(t) = t^2 + 2t$ , avec  $t$  en secondes et  $x$  en mètres. Sa vitesse instantanée est  $v(t) = x'(t)$ .

- Calculer  $v(t)$ .
- Calculer la vitesse à  $t = 5$  s.

Réponse :

### Exercice 8

Soit  $C(x) = x^2 - 8x + 20$  une fonction de coût. Déterminer la valeur de  $x$  qui minimise  $C$ , et calculer le coût minimal.

Réponse :

\_\_\_\_\_ Pour aller plus loin \_\_\_\_\_

### Exercice 9

Soit  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 5$ . Calculer  $f'(x)$ , puis résoudre  $f'(x) = 0$ .

Réponse :

### Exercice 10

Soit  $f(x) = x^2$ . Écrire l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse  $x = 3$  (rappel : équation  $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ ).

Réponse :

### Exercice 11

La charge d'un condensateur (en coulombs) suit  $q(t) = 0,5t^2 + 2t$ . Calculer le courant  $i(t) = q'(t)$  qui le traverse, puis le courant à l'instant  $t = 4$  s.

Réponse :

### Exercice 12

Soit  $f(x) = 2x^2 - 12x + 5$ . Étudier le signe de  $f'(x)$  et en déduire les variations de  $f$ .

Réponse :

## Activités d'application

### Activité 1 • De la position à l'accélération

MÉCANIQUE

**Outil réinvesti :** dérivation d'un polynôme    **Lien référentiel :** cinématique d'un point (S3.2.2)

La position d'un chariot (en mètres) est donnée par  $x(t) = 0,5t^2 + 2t$ , avec  $t$  en secondes. On rappelle que la vitesse est la dérivée de la position ( $v = x'$ ) et l'accélération la dérivée de la vitesse ( $a = v'$ ).

1. Déterminer l'expression de la vitesse  $v(t)$ , puis de l'accélération  $a(t)$ .
2. En déduire la vitesse à l'instant  $t = 3$  s.

Réponse :

### Activité 2 • Nombre dérivé et tangente

MÉCANIQUE

**Outil réinvesti :** nombre dérivé, coefficient directeur    **Lien référentiel :** lecture d'une courbe, pente

Soit la fonction  $f(x) = x^2$ . On rappelle que le nombre dérivé  $f'(a)$  est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse  $a$ .

1. Déterminer l'expression de la fonction dérivée  $f'(x)$ .
2. Calculer le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse  $x = 3$ .

Réponse :

### Activité 3 • Minimiser un coût (optimisation)

MÉCANIQUE

**Outil réinvesti :** dérivation, signe de la dérivée, extremum **Lien référentiel :** optimisation d'une conception (C10, C12)

Le coût d'usinage d'une série de pièces (en euros par pièce) est modélisé par  $C(x) = x^2 - 6x + 10$ , où  $x$  est un paramètre de réglage. On rappelle qu'un minimum est atteint là où la dérivée s'annule.

1. Calculer la dérivée  $C'(x)$ , puis résoudre  $C'(x) = 0$ .
2. En déduire le réglage  $x$  qui minimise le coût et la valeur de ce coût minimal.

Réponse :

### Activité 4 • Débit de remplissage d'un réservoir

MÉCANIQUE

**Outil réinvesti :** dérivation, taux de variation **Lien référentiel :** conception, fluides

Le volume d'eau dans un réservoir (en  $\text{m}^3$ ) évolue selon  $V(t) = t^2 + 3t$ , avec  $t$  en secondes. Le débit instantané est le taux de variation du volume, c'est-à-dire sa dérivée  $V'(t)$ .

1. Déterminer l'expression du débit  $V'(t)$ .
2. Calculer le débit à l'instant  $t = 4$  s.

Réponse :

### Activité 5 • Vitesse d'un objet en chute

PHYSIQUE APPLIQUÉE

**Outil réinvesti :** dérivation d'un polynôme **Lien référentiel :** S11 — cinématique (chute)

En première approximation, la distance parcourue par un objet en chute (en mètres) est  $x(t) = 5t^2$ , avec  $t$  en secondes. La vitesse est la dérivée de la position ( $v = x'$ ).

1. Déterminer l'expression de la vitesse  $v(t)$ .
2. Calculer la vitesse à l'instant  $t = 3$  s.

Réponse :

**Activité 6 • Vitesse de refroidissement**

PHYSIQUE APPLIQUÉE

**Outil réinvesti :** dérivation d'une fonction affine, signe    **Lien référentiel :** S11 — thermique

La température d'une pièce qui refroidit (en °C) suit la loi  $T(t) = 80 - 5t$ , avec  $t$  en minutes. La vitesse de refroidissement est le taux de variation de la température, c'est-à-dire  $T'(t)$ .

1. Calculer  $T'(t)$ .
2. Interpréter le signe et la valeur du résultat.

Réponse :