

Labripam

CLORHIDRATO DE CLORURO DE ISOMETAMIDIUM

Polvo para diluir

Injectable

Uso Veterinario

CPE0321495709

Cada 100 ml del producto reconstituido contiene:

Clorhidrato de Cloruro de Isometamidium 2 g.

Indicaciones:

Actúa eficazmente para el control y tratamiento de la Trypanoso miasis en Bovinos, Bufalinos, Ovinos y Caprinos. Tratamiento de Control: Zonas de mediana y alta incidencia 1 ml por cada 20 Kg de peso vivo. En zonas de baja incidencia, aplicar 1 ml por cada 40 Kg de peso vivo. Tratamiento Curativo: Aplicar 1 ml por cada 80 Kg de peso vivo. Inyectar solamente por vía intramuscular profunda preferiblemente en la tabla del cuello. Masajee ligeramente luego de la inyección.

Reconstitución:

Diluir el contenido del frasco con el diluyente estéril, obteniéndose una solución al 2%. Agitar vigorosamente antes de su aplicación y utilizar solo hasta 24 horas luego de su reconstitución.

Advertencias:

Suspender el uso del producto 30 días antes de la salidad de los animales al sacrificio. No destinar la leche para consumo humano hasta 6 días posteriores a la aplicación del medicamento.

Almacenar en un lugar fresco y al abrigo de la luz.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Venta bajo prescripción del Médico Veterinario.
Director Técnico: Dra. Maria Paola Rincón S. Registro
Nº INSAI2041PN33N0518214

