

Florfenicol L.A.

Inyectable

Uso Veterinario

Contenido neto 100 cm³
CPE0312245044

Cada 100 ml. contiene:

Florfenicol	400	mg.
Vehículo c.s.p	1	ml.

Indicaciones:

Antibiótico de amplio espectro que actúa contra bacterias gram positivas y gram negativas del ganado bovino, ovino, caprino, porcino y aves, como: Pasteurellas, Haemophylus somnus, Klebsiella sp., Escherichia coli, Moraxella sp., Salmonella sp., Bacteroides sp., Fusobacterium sp., Corynebacterium pyogenes, Clostridium sp., Streptococcus, causantes de infecciones como neumonías pododermatitis, metritis, enteritis y en general, procesos susceptibles a bacterias sensibles al Florfenicol.

Inyéctese por vía subcutánea o intramuscular preferiblemente en la tabla del cuello.

Bovinos, Ovinos y Caprinos: 1 ml por cada 20 Kg de peso (20 mg/kg), una segunda aplicación a las 48 horas 1 ml por cada 10 Kg de peso (40 mg/kg).

Porcinos: 1 ml por cada 25 a 30 Kg de peso (15 mg/Kg), una segunda aplicación a las 48 horas.

Aves: 0,15 ml por cada 2 Kg de peso.

Esta dosis puede ser modificada por el Médico Veterinario.

Advertencias:

Los animales no deben sacrificarse para consumo humano hasta 36 días después del tratamiento, la leche producida no debe consumirse hasta 5 días después del mismo. Consérvese a una temperatura por debajo de 30°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Venta bajo prescripción del Médico Veterinario.

