

## Tylabrin

Antibiótico de amplio espectro  
Injectable

### Uso Veterinario

Contenido neto 100 cm<sup>3</sup>  
CPE0906113108

### Cada 100ml. contiene:

Tylosina Tartrato	22	g.
Excipientes c.s.p	100	ml.

### Indicaciones:

Infecciones Respiratorias: Traqueitis, Bronquitis, Difteria, Neumonía, Neumoenteritis de los Terneros y Septicemia Hemorrágica.

Infecciones Genitales: Metritis, Endometritis y Mastitis.

Infecciones de la piel y Estructuras Subyacentes: Pododermatitis (Casquera o Chinela).

Inyectase vía Intramuscular por 3 días.

Bovinos:

Vacas y Toros: 8 ml.

Mautes y Novillos: 5 ml.

Becerros: 2 ml.

### Advertencias:

La carne de animales inyectados con Tylabrin pueden consumirse 21 días luego de la última aplicación.

La leche de animales inyectados con Tylabrin puede consumirse 5 días luego de la última aplicación.

No se conocen contraindicaciones ni reacciones secundarias a la fecha.

Almacenar en un lugar fresco y al abrigo de la luz.

Mantenganse fuera del alcance de los niños.

Venta bajo prescripción del Médico Veterinario.

