

# W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック]

## 除脂肪体重と体重管理をサポート

### 消費者薬情報

#### 1.この小冊子に記載の情報

この小冊子では、W8Biotic Powder [ダブリュエイトビオティック粉末]粉末について、一般的な疑問を解決する回答を記載しています。

参照できる情報すべてを含むものではありません。すなわち、担当医師や薬剤師への相談を優先してください。

どんな医薬品にも、効果とリスクがあります。担当医師はあなたがW8Biotic Powder [ダブリュエイトビオティック粉末]粉末を服用することにより期待できる効果と、その一方でリスクとを考慮しています。

この医薬品の服用について、何らかの懸念がある場合は、ご担当の医師または薬剤師におたずねください。

この小冊子は、医薬品と一緒に保管してください。

必要に応じて読み返すようにしてください。

#### 2.W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック]の用途

W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック]は、除脂肪体重と体重管理をサポートし、またカロリーコントロールした食事計画と合わせて摂取した場合に、健康的な血糖値を維持することを目的に処方されます。

W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック]にはタイプ2難消化性でん粉(RS2)であるHi-Maize Resistance Starch [ハイメイズ難消化性でん粉]を含み、満腹感を増加し、体重管理を支援する治療特性を有しています。Hi-Maize [ハイメイズ] はプレバイオティクスであり、健康な胃腸機能を支援する短鎖脂肪酸を生成します。ロイシンは分枝鎖アミノ酸であり、健康な血中グルコースの代謝調節に働きかけ、健康体における骨格筋タンパク質合成をサポートします。W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック]には、ロイシンからアルファヒドロキシソカブロン酸(HICA)を自然に合成することで、健康体における除脂肪筋肉量をサポートすることがわかっている、ラクトバチルス・プラントラム(Med 25)とラクトバチルス・パラカゼイ(Med 24)が含まれています。L-カルチニンは、健康体におけるエネルギー消費量を調整します。

担当の医師は、別の理由からW8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック]を処方している場合があります。

あなたに処方されたW8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック]について疑問があれば、担当の医師におたずねください。

W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック]に依存性はありません。

#### 3.W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック]の服用前に、以下をご確認ください。

##### 3a) 服用してはならない時

次の場合、W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック]を服用しないでください:

1.W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック、メイズ(トウモロコシ)、またはセクション8bに記載された任意の成分に対するアレルギー反応を起こしたことがある

2.安全シールが不在であったり、破れや不正加工の痕跡がある

3.ボトルに印字された使用期限(EXP)が切れている有効期限が切れていたり、パッケージが破損したりしている場合、薬剤師に返却して処分してもらいます。

使用期限の過ぎた医薬品は服用しても、効果が出ないことがあります。

W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック]の服用を始めるべきか否かわからない場合は、担当の医師にお訊ねください。

##### 3b) 服用する前

以下の場合、担当医師に相談してください:

1.何らかの医薬品、食品、防腐剤、染料または添加剤へのアレルギーがある

W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック]には、Hi-Maize [ハイメイズ]難消化性でん粉、ロイシン、カルニチン、およびプロバイオティクス種が含まれます。

W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック]を服用してからアレルギー反応その他の副作用を引き起こした場合、使用を中止し、医師に相談してください。

2.妊娠中または妊娠の予定がある

3.授乳中または授乳の予定がある

4.下記を含む、健康上の問題や困難を抱えているか、または抱えていたことがある:

- 胃腸の不調
- 免疫不全(HIV/AIDS、または化学療法中)
- 短腸症候群

上記いずれかの状態を、担当の医師や薬剤師に伝えていない場合は、W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック]の服用を開始する前に伝えるようにしてください。

##### 3c) その他医薬品の服用

自然療法医、薬局、スーパーマーケット、健康食品店などから、処方箋なしに入手したものを含む、何らかの医薬品を服用している場合は、担当の医師または薬剤師にその旨を伝えてください。

#### 4.W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック]の服用方法

##### 4a) W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック]の服用方法

担当の医師または薬剤師による指示には、すべて慎重に従うようにしてください。服用量は、この

小冊子に記載された情報とは異なる場合があります。

担当の医師または薬剤師による処方に従って、W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック]を服用してください。

##### 4b) W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック]の服用量は?

担当医師の指示に従うか、使用直前に粉末25 g (1さじ)を250mlの冷水に加えてください。

##### 4c) W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック]の服用方法

1回分の粉末を250mlの水に加えてよく混ぜ、すぐにお飲みください。

##### 4d) W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック]の服用タイミング

ご担当の医師から特に指示がない限り、1日1〜2回、食事の前に服用してください。

##### 4e) W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック]の服用期間

W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック]は、医師または薬剤師の処方通りの期間、服用してください。

##### 4f) W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック]を飲み忘れた場合

飲み忘れた用量を一度に服用しようとししないでください。

予期せぬ副作用をもたらす恐れがあります。

次の服用時間が迫っている場合、服用し損ねた用量はそのまま省き、次の用量を服用してください。

判断に迷う場合は、担当の医師または薬剤師に確認してください。

##### 4g) W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック]を服用しすぎた場合(過剰摂取)

できるだけ早く担当の医師または薬剤師を訪問してください。その際、あなたの健康のために最善の措置を判断するためにも、W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック]をどのくらい摂取してしまったかを伝えてください。不快感や中毒の症状が現れたら、医師または薬剤師を訪問してください。

#### 5.W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック]の服用中

##### 5a) 実施すべきこと:

W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック]の服用中に妊娠が判明した場合、直ちに担当の医師または薬剤師に伝えてください。

新たな医療措置を受けることになりそうな場合、担当の医師または薬剤師に、W8Biotic™ [ダブリ

ユエイトビオティック]を服用していることを伝えてください。

手術の予定がある場合、担当の医師または薬剤師に、W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック]を服用していることを伝えてください。担当の医師または薬剤師の指示には、常に慎重に従ってください。

#### 5b) 実施すべきでないこと

W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック]を加熱したり、また熱い液体や食品と混ぜたりしないでください。

W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック]を極端な熱に長時間さらさないでください。

#### 6.副作用

どんな医薬にも副作用はあります。重篤な症状を引き起こすものもありますが、ほとんどの場合は軽症で済みます。

これらはあくまで副作用の可能性であり、ほぼ心配はありません。いずれの副作用も引き起こさない場合もあります。

疑問があれば、担当の医師または薬剤師におたずねください。

次のいずれかの症状を経験し、不安が残る場合は、医師または薬剤師に相談してください。

- 胃部のけいれんまたは痛み
- 便秘
- 下痢
- 便中粘液
- 胃の膨満感
- ガス

これらの副作用は通常、軽度であり、用量によります。こうした症状のほとんどが、W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック]の投与量が減るか、投与が停止してから数日で消えていきます。

また含有成分に対する深刻なアレルギー反応が引き起こされることもまれです。ただし、次のいずれかが発症した場合、担当の医師または薬剤師に伝えてください:

- 皮膚の発疹
- 顔や喉の腫れ
- 呼吸困難
- 皮膚のかゆみ

体調がすぐれない症状に気づいた場合は、医師にご相談ください。

上記以外の副作用が発生することもあります。

#### 7.W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック]の服用後

##### 保管

服用時まで、W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック] はボトルに保管しておきます。W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック]は常に元のボトルに保管してください。粉末をボトルから出すと、品質が保てなくなる恐れがあります。

W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック] は、常に元の容器にて保管してください。摂氏25度未満の環境で保管してください。冷蔵庫での保管を推奨します。ただし、冷凍はしないでください。

W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック] はもちろん、医薬品一般は、浴室やシンクのそばに保管しないでください。

車内や窓辺に放置しないでください。

熱や湿気により、医薬品が使用不能になってしまふことがあります。

子供の手の届かないところに保管してください。

W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック] は光の当たらないところに保管してください。

#### 8.製品の説明

##### 8a) W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック] の見た目

W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック] はオフホワイト色の粉末です。粉末は、容量350 g(14回分用量)の、白色の円筒ボトルに充填されています。

##### 8b) 原材料

#### 25 g(1さじ)用量当たり活性成分

Hi-Maize [ハイメイズ] 難消化性でん粉 ..... 20 g  
L-ロイシン ..... 2 g  
レボカルニチン酒石酸 (Levocarnitine Tartrate) ..... 1.5 g  
レボカルチニン相当量 ..... 1 g  
ラクトバチルス・プランタルム (*Lactobacillus plantarum*; Med 25) ..... 100億株  
ラクトバチルス・パラカゼイ (*Lactobacillus paracasei*; Med 24) ..... 100億株

#### 添加剤

シリカ  
タウマチン  
リンゴ酸  
ステビア  
レモンライムフレーバー

W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック]には人工色素、香料、甘味料を含んでいません

W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック]にはグルテンや乳製品は含まれていません

W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック]は 채식주의の方もご利用いただけます

#### 9.翻訳

To read this information in other languages go to [www.medlab.co/translate](http://www.medlab.co/translate)

Para leer esta información en otros idiomas van a [www.medlab.co/translate](http://www.medlab.co/translate)

Pour lire cette information dans d'autres langues allez à [www.medlab.co/translate](http://www.medlab.co/translate)

لقرءة هذه المعلومات بلغات أخرى تذهب إلى [www.medlab.co/translate](http://www.medlab.co/translate)

この情報を別の言語でご参照になりたい場合、次のURLにアクセスしてください:

Чтобы прочитать эту информацию в другом языке и пойти [www.medlab.co/translate](http://www.medlab.co/translate)

要 閱 讀 這 些 信 息 在 其 他 語 言 中 去 [www.medlab.co/translate](http://www.medlab.co/translate)

要 閱 讀 這 些 信 息 在 其 他 語 言 中 去 [www.medlab.co/translate](http://www.medlab.co/translate)

#### 10.メーカー

W8Biotic™ [ダブリュエイトビオティック]のオーストラリアにおける供給元:  
Medlab Clinical Limited™  
Medlab Clinical Limited™内部署  
66 McCauley Street  
Alexandria NSW 2015  
国内フリーダイヤル:1300 369 570

オーストラリア公開番号  
AUST L 239105  
この小冊子は2014年9月に作成されました  
2014年9月最終更新

Medlab Clinical Limited™