

SB 5B™

サッカロマイセス・セレピシエ SSP が 250mg (50 億 CFU) が含まれています。 ブラウディ

消費者医薬品情報

1. 本説明書の記載内容は？

この説明書は SB 5B™ カプセルに関するいくつかの一般的な質問に回答しています。

すべての情報が記載されているわけではなく、医師または薬剤師の意見に取って代わるものではありません。

すべての医薬品にはリスクと利点があります。医師は SB 5B™ カプセルの服用に関して、有効性に対するリスクを重点的に考慮しています。

本カプセルの服用に当たってご不安がある場合は、医師や薬剤師にご相談下さい。

この説明書は、本剤と一緒に保管して下さい。

改めて読み返す必要があるかもしれません。

2. SB 5B™ の使用目的

サッカロマイセス・ブラウディは証拠に基づく有益なプロバイオティクス酵母です。このような腹痛や腹部膨満、鼓腸及び排便習慣として医学的に診断された過敏性腸症候群に関連する症状の管理や原因から起こる下痢を緩和し、有効性を示します。S. ブラウディは健康的な免疫機能を支え、健康的な胃腸機能および完全性を奨励し、最適かつ有益な微生物の成長を支えています。

胃腸の症状を改善するために使用される薬は多くの異なる種類があります。

医師や薬剤師は他の理由で SB 5B™ を処方する場合があります。

SB 5B™ の処方理由に関して質問がある場合は医師や薬剤師に確認して下さい。

SB 5B™ に中毒性はありません。

3. SB 5B™ 服用前

3a) 服用してはならない場合

次の場合は SB 5B™ を服用しないでください：

1. SB 5B™ や 8b に記載されているいかなる含有成分に対してアレルギー反応を起こした場合。

2. パッケージが破損していたり、改ざんの痕跡が見られる場合。

3. 商品に印刷された使用期限(EXP)が過ぎている場合。

使用期限切れの製品を服用した場合は効果が出にくいことがあります。

SB 5B™ を服用すべきか分からない場合は、医師または薬剤師にご相談下さい。

3b) 服用前の注意点

以下に当てはまる場合は医師にご相談下さい：

1. 他の医薬品、食品、防腐剤、染料または添加剤にアレルギーがある場合。

SB 5B™ にはセルロース、シリカ、ステアリン酸マグネシウムが含まれています。

SB 5B™ 服用後、何らかのアレルギー反応や他の副作用が現れた場合には、ただちに使用を中止し、医師や薬剤師に相談して下さい。

2. 妊娠中、または妊娠を予定されている場合

3. 授乳中、または授乳を予定されている場合

4. 現在、または過去に次の健康上の問題がある場合：

- 胃や腸疾患
- 免疫不全 (HIV /エイズや癌治療中)
- 真菌感染症

上記に関して医師や薬剤師に相談されていない場合は、SB 5B™ 服用開始前にその旨を伝えて下さい。

3c) 他の薬との併用

自然療法医やスーパーマーケット、または健康食品店から処方箋なしで購入できる他の薬を服用している場合は、本剤服用前に医師や薬剤師にご相談下さい。

次のいずれかを服用している場合には、医師や薬剤師にお伝え下さい：

- 免疫抑制薬
- 抗生物質
- 抗真菌薬

SB 5B™ によって影響を受ける可能性がある薬もあります。現在服用している薬の量の変更、薬の変更の必要が出てくるかもしれません。医師の指示に従って下さい。

SB 5B™ 服用中に注意すべきことや回避すべき点については、医師や薬剤師にお尋ね下さい。

この薬品リストについて不明な点があれば、医師や薬剤師にご相談下さい。

4. SB 5B™ の服用方法

4a) 服用量

必ず医師や薬剤師の指示に従って下さい。

医師や薬剤師が処方した通りに SB 5B™ を服用して下さい。

医師や薬剤師の指示は本説明書の記載内容と異なる場合もあります。

4b) SB 5B™ の服用量は？

カプセル (1) 錠を 1 日に (1) 回から (2) 回、または専門家の指示通りに服用して下さい。

SB 5B™ の 1 日の服用量に関しては医師や薬剤師が指示します。現在の健康状態や他の薬の服用により、1 日の服用量が変わります。

4c) SB 5B™ の服用方法

カプセルは毎日、食前に水で服用して下さい。

カプセルを割り、中身を冷たい食べ物にかけて摂取することも可能です。不明な場合は、医師や薬剤師に相談して下さい。

破損しているカプセルは服用しないで下さい。

4d) SB 5B™ の服用時

特に医師からの指示がない限り、食前に服用して下さい。

4e) SB 5B™ の服用期間

医師や薬剤師が処方する間は、SB 5B™ の服用を続けてください。

4f) SB 5B™ の服用を忘れた場合

次の服用時に、前回忘れた分を追加して服用しないで下さい。

これにより、副作用が生じる場合があります。

次の服用時間が近ければ、前回忘れた分は追加せず、規定通りに服用して下さい。

どうしても分からない場合は、医師や薬剤師にお尋ね下さい。

4g) SB 5B™ を規定量以上に摂取 (過剰摂取) した場合

できるだけ早く医師や薬剤師の診察を受けて下さい。医師や薬剤師に SB 5B™ の服用量を伝え、適切な指示に従って下さい。不快感や中毒の兆候が見られない場合でも、医師や薬剤師の診察を受けて下さい。

5. SB 5B™ の服用中

5a) 必ず守る事:

SB 5B™ 服用中に妊娠した場合は、医師や薬剤師にただちにその旨を伝えて下さい。

新しい薬を飲み始める際には、医師や薬剤師に SB 5B™ を服用している旨を伝えて下さい。

歯科手術を含むいかなる手術を受ける場合にも、医師や薬剤師に SB 5B™ を服用している旨を伝えて下さい。常に慎重に医師や薬剤師の指示に従って下さい。

5b) 絶対にしてはいけない事

SB 5B™ を加熱したり、熱い食べ物に追加しないでください。

長時間に渡り、極端な暑さの環境に SB 5B™ を放置しないでください。

5c) 注意する点

SB 5B™ にはプロバイオティクス酵母が含まれているため、抗真菌剤と本剤のプロバイオティクスを一緒に服用すると有効性の減少を促す場合があります。

この相互作用を回避するために、抗生物質の服用から少なくとも前後 2 時間を空けて SB 5B™ の服用をして下さい。

この点については医師にご相談下さい。

6. 副作用

すべての薬には副作用の可能性があります。深刻な場合もありますが、大抵はそうでない副作用です。

起こり得る副作用症状のリストに恐れなくて下さい。但し、必ずしも起こるとは限りません。

質問がある場合は医師や薬剤師にご相談下さい。

次のような症状が出た場合には、医師や薬剤師にご相談下さい:

- 胃部分のけいれんや痛み
- 便秘
- 下痢
- 便中の粘液
- 胃部膨満感
- ガス

これらの副作用は通常、軽度で服用量に関連しています。これらの症状は SB 5B™ の服用量を減らしたり、服用を中止することで消失することがほとんどです。

含有成分による深刻なアレルギー反応はまれです。但し、次のような症状が現れた場合には、ただちに医師や薬剤師にご相談下さい:

- 皮膚の発疹
- 顔および/または喉の腫れ
- 呼吸困難
- 皮膚のかゆみ

6 ヶ月以下の幼児が 6 時間、3 歳以下の子供が 12 時間、3 歳～6 歳の子供が 24 時間、6 歳以上の子供が 48 時間以上に渡り下痢をしている場合は医師の助言を求めてください。

7. SB 5B™ の服用後

7a) 保管方法

服用時までは既存の瓶に SB 5B™ を保管してください。カプセルを瓶から出した状態にすると、保存状態が悪くなる事があります。

SB 5B™ は常に元の容器のみに保管して下さい。

SB 5B™ は冷蔵保管してください。凍らさないで下さい。

SB 5B™ や他の薬は浴室内やシンクの近くに保管しないで下さい。車の中や窓辺に放置しないで下さい。

熱と湿気は本剤を破損しかねません。

SB 5B™ を光から守って下さい。

8. 製品説明

8a) SB 5B™ の形状

SB 5B™ はハードクリアカプセルに入った茶色の粒状粉末です。SB 5B™ はキャップ上に安全シールが貼られ、リサイクル可能なプラスチックボトルに入っています。SB 5B™ の瓶には 60 個のカプセルが入っています。

8b) 含有成分

有効成分
サッカロマイセス・セレブシエ *ssp.* ブラウデ
イ.....250mg
等量.....50 億 CFU

非活性成分

セルロース
シリカ
リン酸水素カルシウム
ステアリン酸マグネシウム

SB 5B™ はベジタリアンに適しています

SB 5B™ は乳製品やグルテンフリーです

9. 翻訳

他の言語での説明は、次のサイトをご参照下さい。 www.medlab.co/translate

Para leer esta información en otros idiomas van a www.medlab.co/translate

Pour lire cette information dans d'autres langues allez à www.medlab.co/translate

لقرائة هذه المعلومات بلغة أخرى تذهب إلى www.medlab.co/translate

他の言語での説明は、
www.medlab.co/translate にアクセスして下さい。

Чтобы прочитать эту информацию на другом языке
посетите www.medlab.co/translate

要閱讀這些信息在其他語言中去
www.medlab.co/translate

要阅读这些信息在其他语言中去
www.medlab.co/translate

10. 製造業者

SB 5B™ はオーストラリアで供給されています:

Medlab Clinical Limited™ の 1 部門
66 McCauley Street
Alexandria NSW 2015
フリーダイヤル: 1300 369 570

SB 5B™ は北米では次の会社によって供給されています: InMed Technologies™ の 1 部門
Suite 400, 29883 Santa Margarita Pkwy
Rancho Santa Margarita CA 92688
フリーダイヤル 1800 921 1710

オーストラリアのリスティングナンバー
AUST L 268232

本説明書は 2015 年 11 月に作成されました。
2016 年 1 月最終更新

Medlab Clinical Limited™