

Biotic Jnr.™

有助於嬰幼兒正常發育，健康成長

Biotic Jnr.™說明書

1. 這本小冊子包含什麼內容

本小冊子回答了關於 Biotic Jnr.™的一些常見問題。

這本小冊子並非包含所有資訊，您應該具體諮詢您的醫療保健專業人士。

所有藥物都有益處和風險。對於您服用 Biotic Jnr.™的預期效果，您的醫生已權衡其潛在風險。

如果您對服用此產品有任何疑問，請諮詢您的醫療保健專業人士。

請將此小冊子和產品放在一起。

您可能需要再讀一遍。

2. Biotic Jnr.™的用途

Biotic Jnr.™是多菌種益生菌配方產品，促進胃腸道和免疫系統發育成熟。

Biotic Jnr.™有助於改善過敏症狀，包括濕疹症狀；有助於促進健康的消化功能。

Biotic Jnr.™含有 Glycomax™乳鐵蛋白，此種蛋白存在于牛初乳和人乳中，它是先天性免疫系統的一部分，具有光譜抗細菌和抗病毒的活性。Biotic Jnr.™含有的益生菌菌種已證明有益嬰兒（早產或足月）健康，且安全有效。

Biotic Jnr.™含有的益生菌菌種已證明能誘導免疫耐受，改善腸道免疫屏障功能，促進消化道的健康發育。

您的醫療保健專業人士可能會由於其他的原因而建議您服用 Biotic Jnr.™。

如果您對服用 Biotic Jnr.™有任何疑問請諮詢您的醫療保健專業人士。

服用 Biotic Jnr.™不會上癮。

3. 在您服用 Biotic Jnr.™之前

3a) 什麼時候您不能服用 Biotic Jnr.™

以下情況您不能服用 Biotic Jnr.™：

1. 您對 Biotic Jnr.™含有的任何成分（列於本小冊子的 8b）過敏。

2. 安全封口已損壞或丟失，或有篡改的痕跡。

3. 已超過包裝瓶上所印有的有效期。如果過期或損壞，將產品返還藥劑師處理。

服用過期的產品，可能達不到原有的效果。

如果您不確定什麼時候開始服用 Biotic Jnr.™請與您的醫療保健專業人士聯繫。

3b) 在您服用 Biotic Jnr.™之前

您需要告知您的醫生以下情況：

1. 您對哪些藥物，食物，防腐劑，染料或添加劑過敏。

Biotic Jnr.™含有五種益生菌菌種和來源於乳清的乳鐵蛋白。Biotic Jnr.™含有少於 0.1% 的乳糖，不含有酪蛋白。

如果您的在服用 Biotic Jnr.™後產生任何過敏反應或其他副作用，應停止服用，並諮詢您的醫療保健專業人士。

2. 您有或曾經有過下列任何情況：

- 抗生素治療
- 絞痛
- 輪狀病毒
- 腹瀉和/或嘔吐
- 過敏性濕疹（過敏性皮炎）
- 壞死性小腸結腸炎

如果您還沒有向您的醫療保健專業人士提及上述任何情況，請在您服用 Biotic Jnr.™前告知他們。

3c) 正服用其他藥物

如果您正在服用其他任何藥物，包括任何從藥房，超市或保健品商店購買的藥物，請告知您的醫療保健專業人士。

您的醫療保健專業人士能提供更多關於如何正確服用 Biotic Jnr.™的信息。

4. 如何服用 Biotic Jnr.™

4a) 用量

遵照您的醫療保健專業人士的指示用藥。

用藥的劑量嚴格遵照您的醫療保健專業人士的指示。醫療保健專業人士指定的藥量可能與本手冊所建議的不同。

4b) 應該服用多少 Biotic Jnr.™

將 500 毫克（一勺）該產品混合於微溫的或涼的液體或固體食物中服用，一天一到兩次，或遵醫囑。

您的醫療保健專業人士會告知您 Biotic Jnr.™的每日用量。這取決於您所需治療的病症，以及是否正在使用任何其他藥物。

4c) 如何服用 Biotic Jnr.™

Biotic Jnr.™應混合於涼的或微溫的液體或固體食物中服用。

4d) 何時服用 Biotic Jnr.™

飯前服用，除非您的醫療保健專業人士建議其他時間。

4e) Biotic Jnr.™需服用多久

遵照您的醫療保健專業人士的指示完成療程。

4f) 如果您忘記服用 Biotic Jnr.™

不要補服過量劑量以彌補您錯過的劑量。

這可能會增加產生非預期副作用的可能性。

如果錯過的服藥時間已接近下一次服藥時間，只需按時服用下一次的藥量即可。

如果您不確定該怎麼做，請諮詢您的醫療保健專業人士。

4g) 如果您服用過量 Biotic Jnr.™

儘快尋求您的醫療保健專業人士的幫助。告訴他們您何時服用，服用了多少 Biotic Jnr.™，這樣他們可以決定採取什麼方式來保障您的健康。即使沒有任何不適或中毒的跡象，依然需要諮詢您的醫療保健專業人士。

5. 當您服用 Biotic Jnr.™時

5a) 您必須做的事情：

如果您即將開始服用一種新藥，告訴您的醫療保健專業人士您正在服用 Biotic Jnr.™。

務必仔細遵照您的醫療保健專業人士的指示。

5b) 您不應做的事情：

不可加熱 Biotic Jnr.™或將其加入到熱得食物中服用。

不要將 Biotic Jnr.™長時間地暴露在高溫環境。

5c) 您需要注意的事情：

因為 Biotic Jnr.™含有益生菌菌株，所以同時服用抗生素和該產品會降低其效果。為避免出現這種相互作用的情況，請在服用抗生素前或後兩小時服用 Biotic Jnr.™。

你應該向您的醫療保健專業人士進行諮詢。

6. 副作用

任何藥物都有可能產生副作用。有時候很嚴重，但大多數時候並不會產生嚴重副作用。

不必為所列的可能產生的副作用而擔憂。藥物對您也許並不會產生副作用。

向您的醫療保健專業人士諮詢任何疑慮。

如果您留意並擔心以下症狀，告訴您的醫療保健專業人士：

- 胃部痙攣或疼痛
- 便秘
- 腹瀉
- 糞便出現黏液
- 胃部腫脹
- 脹氣

這些副作用通常是輕微的並與服用劑量有關。減少 Biotic Jnr.™的服用劑量或停止服用，大部分的副作用會在幾天內完全消失。

如果以下症狀持續出現，請諮詢您的醫療保健專業人士。如果持續腹瀉，6 個月以下的嬰兒超過 6 小時；3 歲以下的兒童超過 12 小時；6 歲以下的兒童超過 24 小時；6 歲以上的兒童或少年超過 48 小時，請就醫。

7. 服用完 Biotic Jnr.™

儲藏

將 Biotic Jnr.™保存在原瓶中直到需要服用。從瓶中取出可能不易保存。

始終將產品保存在原包裝瓶中。儲存於 25 度以下。建議冷藏保存。不要冷凍。

不要將 Biotic Jnr.™或其他藥物存放在浴室或近水槽處。

不要將 Biotic Jnr.™留著車裏或窗臺上。

高溫或潮濕會損壞 Biotic Jnr.™。

將產品存放於兒童不能觸及的地方。

將 Biotic Jnr.™ 避光保存。

8. 產品說明

8a) Biotic Jnr.™外觀

Biotic Jnr.™是灰白色粉末。Biotic Jnr.™包裝於白色圓瓶裏。每瓶含 60 克粉末（120 劑量）。

8b) 成分

有效成分(每 500 毫克，一勺)：

嬰兒雙歧桿菌 (Med 14)：5 億

長雙歧桿菌 (Med 15)：5 億

鼠李糖乳桿菌 (Med 26)：5 億

嗜熱鏈球菌 (Med 51)：5 億

釀酒酵母菌 (Medlab 41)：5 億

Glycomax™乳鐵蛋白：50 毫克

其他成分：

菊粉

Biotic Jnr.™不含有工色素，香精和甜味劑。

Biotic Jnr.™適用於素食者。

Biotic Jnr.™不含穀蛋白和酪蛋白。

Biotic Jnr.™含有的乳鐵蛋白來源於乳清，含有少於 0.1%的乳糖。

Biotic Jnr.™適用於 0-3 歲的嬰幼兒。

Biotic Jnr.™適用於母乳餵養或配方奶粉餵養的嬰兒。

9. 翻譯

參看其他語言

www.medlab.co/translate

10. 生產商

Biotic Jnr.™澳大利亞總經銷商

Medlab Clinical Limited™

地址：66 McCauley Street

Alexandria NSW 2015

免費電話：1300 369 570

澳大利亞註冊編號：AUST L 239097

這本小冊子完成於 2015 年 5 月

最後更新於 2015 年 5 月

Medlab Clinical Limited™