Biotic Jnr.TM

有助于婴幼儿正常发育,健康成长

Biotic Jnr.™说明书

1. 这本小册子包含什么内容

本小册子回答了关于 Biotic Jnr.™的一些常见问题。

这本小册子并非包含所有信息,您应该具体咨 询您的医疗保健专业人士。

所有药物都有益处和风险。对于您服用 Biotic Jnr.TM的预期效果,您的医生已权衡其潜在风险。

如果您对服用此产品有任何疑问,请咨询您的 医疗保健专业人士。

请将此小册子和产品放在一起。

您可能需要再读一遍。

2. Biotic Jnr.™的用途

Biotic Jnr.TM是多菌种益生菌配方产品,促进胃肠道和免疫系统发育成熟。

Biotic Jnr. TM有助于改善过敏症状,包括湿疹症状;有助于促进健康的消化功能。

Biotic Jnr.™含有 Glycomax ™乳铁蛋白,此种蛋白存在于牛初乳和人乳中,它是先天性免疫系统的一部分,具有光谱抗细菌和抗病毒的活性。Biotic Jnr.™含有的益生菌菌种已证明有益婴儿(早产或足月)健康,且安全有效。

Biotic Jnr,™含有的益生菌菌种己证明能诱导免疫耐受,改善肠道免疫屏障功能,促进消化道的健康发育。

您的医疗保健专业人士可能会由于其他的原因而建议您服用 Biotic Jnr.™。

如果您对服用 Biotic Jnr.TM有任何疑问请咨询您的医疗保健专业人士。

服用 Biotic Jnr.TM不会上瘾。

3. 在您服用 Biotic Jnr.™之前

3a) 什么时候您不能服用 Biotic Jnr.TM

以下情况您不能服用 Biotic Jnr.TM:

- 1. 您对 Biotic Jnr.™ 含有的任何成分(列于 本小册子的 8b) 过敏。
- 2. 安全封口已损坏或丢失,或有篡改的痕迹。
- **3. 已超过包装瓶上所印有的有效期。**如果过期或损坏,将产品返还药剂师处理。

服用过期的产品,可能达不到原有的效果。

如果您不确定什么时候开始服用 Biotic Jnr.™请与您的医疗保健专业人士联系。

3b) 在您服用 Biotic Jnr.TM之前

您需要告知您的医生以下情况:

1. 您对哪些药物,食物,防腐剂,染料或添加剂过敏。

Biotic Jnr.TM含有五种益生菌菌种和来源于乳清 的乳铁蛋白。Biotic Jnr.TM含有少于 0.1% 的乳 糖,不含有酪蛋白。

如果您的在服用 Biotic Jnr.TM后产生任何过敏反应或其他副作用,应停止服用,并咨询您的医疗保健专业人士。

2. 您有或曾经有过下列任何情况:

- 抗生素治疗
- 绞痛
- 轮状病毒
- 腹泻和/或呕吐
- 过敏性湿疹(过敏性皮炎)
- 坏死性小肠结肠炎

如果您还没有向您的医疗保健专业人士提及 上述任何情况,请在您服用 Biotic Jnr.™前 告知他们。

3c) 正服用其他药物

如果您正在服用其他任何药物,包括任何从 药房,超市或保健品商店购买的药物,请告 知您的医疗保健专业人士。

您的医疗保健专业人士能提供更多关于如何正确服用 Biotic Jnr.™的信息。

4. 如何服用 Biotic Jnr.™

4a) 用量

遵照您的医疗保健专业人士的指示用药。

用药的剂量严格遵照您的医疗保健专业人士的捐示。医疗保健专业人士指定的药量可能与本手册所建议的不同。

4b)应该服用多少 Biotic Jnr.™

将 500 毫克(一勺)该产品混合于微温的或凉的液体或固体食物中服用,一天一到两次,或遵医嘱。

您的医疗保健专业人士会告知您 Biotic Jnr.TM 的每日用量。这取决于您所需治疗的病症,以 及是否正在使用任何其它药物。

4c) 如何服用 Biotic Jnr.TM

Biotic Jnr.TM应混合于凉的或微温的液体或固体食物中服用。

4d) 何时服用 Biotic Jnr.TM

饭前服用,除非您的医疗保健专业人士建议其 他时间。

4e) Biotic Jnr.™需服用多久

遵照您的医疗保健专业人士的指示完成疗程。

4f) 如果您忘记服用 Biotic Jnr.TM

不要补服过量剂量以弥补您错过的剂量。

这可能会增加产生非预期副作用的可能性。

如果错过的服药时间已接近下一次服药时间, 只需按时服用下一次的药量即可。 如果您不确定该怎么做,请咨询您的医疗保健 专业人士。

4g) 如果您服用过量 Biotic Jnr.TM

尽快寻求您的医疗保健专业人士的帮助。告诉他们您何时服用,服用了多少 Biotic Jnr.™,这样他们可以决定采取什么方式来保障您的健康。即使没有任何不适或中毒的迹象,依然需要咨询您的医疗保健专业人士。

5. 当您服用 Biotic Jnr.™时

5a) 您必须做的事情:

如果您即将开始服用一种新药,告诉您的医疗保健专业人士您正在服用 Biotic Jnr.TM.

务必仔细遵照您的医疗保健专业人士的指示。

5b) 然不应做的事情:

不可加热 Biotic Jnr.™ 或将其加入到热得食物中服用。

不要将 Biotic Jnr.TM长时间地暴露在高温环境。

5c) 您需要注意的事情:

因为 Biotic Jnr.TM含有益生菌菌株,所以同时服用抗生素和该产品会降低其效果。为避免出现这种相互作用的情况,请在服用抗生素前或后两小时服用 Biotic Jnr.TM。

你应该向您的医疗保健专业人士进行咨询。

6. 副作用

任何药物都有可能产生副作用。有时候很严重,但大多数时候并不会产生严重副作用。

不必为所列的可能产生的副作用而担忧。药物 对您也许并不会产生副作用。

向您的医疗保健专业人士咨询任何疑虑。

如果您留意并担心以下症状,告诉您的医疗 保健专业人士:

- 胃部痉挛或疼痛
- 便秘
- 腹泻
- 粪便出现黏液
- 胃部肿胀
- 胀气

这些副作用通常是轻微的并与服用剂量有关。减少 Biotic Jnr.™ 的服用剂量或停止服用,大部分的副作用会在几天内完全消失。

如果以下症状持续出现,请咨询您的**医疗**保健专业人士。如果持续腹泻,6个月以下的婴儿超过6小时;3岁以下的儿童超过12小时;6岁以下的儿童超过24小时;6岁以上的儿童或少年超过48小时,请就医。

7. 服用完 Biotic Jnr.™

储藏

将 Biotic Jnr.™ 保存在原瓶中直到需要服用。 从瓶中取出可能不易保存。 始终将产品保存在原包装瓶中。储存于 25 度以下。建议冷藏保存。不要冷冻。

不要将 Biotic Jnr.TM或其他药物存放在浴室或近水槽外。

不要将 Biotic Jnr.TM留着车里或窗台上。

高温或潮湿会损坏 Biotic Jnr.TM。

将产品存放于儿童不能触及的地方。

将 Biotic Jnr.™ 避光保存。

8.产品说明

8a) Biotic Jnr.TM 外观

Biotic Jnr.TM是灰白色粉末。Biotic Jnr.TM包装于白色圆瓶里。每瓶含 60 克粉末(120 剂量)。

86) 成分

有效成分(每 500 毫克, 一勺):

婴儿双歧杆菌(Med 14): 5 亿 长双歧杆菌(Med 15): 5 亿 鼠李糖乳杆菌(Med 26): 5 亿 嗜热链球菌(Med 51): 5 亿 酿酒酵母菌(Medlab 41): 5 亿 Glycomax™乳铁蛋白: 50 毫克

其他成分:

菊粉

Biotic Jnr.TM不含有人工色素,香精和甜味剂。

Biotic Jnr.TM适用于素食者。

Biotic Jnr.™不含谷蛋白和酪蛋白。

Biotic Jnr.™含有的乳铁蛋白来源于乳清,含有少于 0.1%的乳糖。

Biotic Jnr.™适用于 0-3 岁的婴幼儿。

Biotic Jnr.™适用于母乳喂养或配方奶粉喂养的婴儿。

9.翻译

参看其他语言

 $\underline{www.medlab.co/translate}$

10. 生产商

Biotic Jnr.™澳大利亚总经销商 Medlab Clinical Limited™ 地址: 66 McCauley Street Alexandria NSW 2015 免费电话: 1300 369 570

澳大利亚注册编号: AUST L 239097 这本小册子完成于 2015 年 5 月 最后更新于 2015 年 5 月

Medlab Clinical Limited™