ORSBiotic [オーアールエスビオティック]™

プロバイオティクスと組み合わせた経口補水液

消費者薬情報

1. この小冊子に記載の情報

この小冊子では、ORSBiotic [オーアールエスビオティック]™粉末についての一般的な疑問に対する回答を記載しています。

参照できる情報すべてを含むものではありません。 すなわち、担当医師や薬剤師への相談を優先し てください。

どんな医薬やサプリメントにも、効果とリスクがあ ります。担当医師はあなたがORSBiotic [オーア ールエスビオティック]™粉末を服用することにより 期待できる効果と、その一方でのリスクとを考慮 しています。

このサプリメントの服用について、何らかの懸念がある場合は、ご担当の医師または薬剤師におたずねください。

この小冊子は、サプリメントと一緒に保管してください。

必要に応じて読み返すようにしてください。

2. ORSBiotic [オーアールエスピオティック]™の用途

ORSBiotic [オーアールエスビオティック]™は、嘔吐、下痢、発熱、および激しい身体活動によって失われた水分を補給するための、経口補水液です

ORSBiotic [オーアールエスビオティック]™には、健康な胃腸恒常性と浸透性の維持を助ける、プロバイオティクス種が含まれています。サッカロミセス属、ラクトバチルス属、およびビフィドバクテリウム属から選択したプロバイオティクス種は、感染性物質、抗生物質、およびクロストリジウム・ディフィシレに起因するものを含む、下痢を引き起こす様々な要因について治療的支援をもたらし、下痢の回数と期間を低減するという、臨床上の証拠があります。亜鉛の補給は、小児性の下痢について、その持続期間と重症度を軽減することが見出されています。

担当の医師や薬剤師は、別の理由でORSBiotic [オーアールエスピオティック]™を処方している場合があります。

あなたに処方されたORSBiotic™ [オーアールエスピオティック]™について疑問があれば、担当の医師または薬剤師におたずねください。

ORSBiotic [オーアールエスビオティック]™に依存性はありません。

3. ORSBiotic [オーアールエスビオティック]™の服用前に、以下をご確認ください。

3a) 服用してはならない時

次の場合、ORSBiotic [オーアールエスビオティック]™を服用しないでください:

- 1. ORSBiotic [オーアールエスピオティック]™また はセクション8bに記載された任意の成分に対す るアレルギー反応を起こしたことがある
- 2. パッケージが不在であったり、破れや不正加 工の痕跡がある
- 3. パッケージに印刷された使用期限(EXP)が切れている有効期限が切れていたり、パッケージが破損したりしている場合、薬剤師に返却して処分してもらいます。

使用期限の過ぎたサプリメントは服用しても、効 果が出ないことがあります。

ORSBiotic [オーアールエスピオティック]™の服用を始めるべきか否かわからない場合は、担当の医師または薬剤師にお訊ねください。

36) 服用する前

以下の場合、担当医師に相談してください:

1. 何らかの医薬品、食品、防腐剤、染料または添加剤へのアレルギーがある

ORSBiotic [オーアールエスビオティック]™には、 塩化ナトリウム、クエン酸カリウム、無水クエン酸 無水グルコース、グルコン酸亜鉛、そして4種類 のプロバイオティクス菌を含んでいます。

ORSBiotic [オーアールエスビオティック]™を服用 してからアレルギー反応その他の副作用を引き 起こした場合、使用を中止し、医師または薬剤師 に相談してください。

- 2. 妊娠中または妊娠の予定がある
- 3. 授乳中または授乳の予定がある
- 4. 下記を含む、健康上の問題や困難を抱えているか、または抱えていたことがある:
- 胃腸の不調
- 免疫不全(HIV/AIDS、または化学療法中)
- 短陽症候群

上記いずれかの状態を、担当の医師や薬剤師に 伝えていない場合は、ORSBiotic [オーアールエ スピオティック]™の服用を開始する前に伝えるよ うにしてください。

3c) その他医薬品の服用

自然療法医、スーパーマーケット、健康食品店などから、処方箋なしに入手したものを含む、何らかの医薬品を服用している場合は、担当の医師または薬剤師にその旨を伝えてください。

服用している医薬品によっては、ORSBiotic [オーアールエスビオティック]™の影響、またはその効力に影響する恐れがあります。このため、すでに服用している医薬品の用量を変えたり、別の医薬品を服用しなければならなくなることがあります。詳細は、担当医師にご相談ください。

ご担当の医師または薬剤師は、ORSBiotic [オーアールエスビオティック]™の服用中に気をつけるべき、または避けるべき医薬品についての詳細情報を熟知しています。

4. ORSBiotic™の服用方法

4a) 服用すべき用量

担当の医師または薬剤師による指示には、すべて慎重に従うようにしてください。

担当の医師または薬剤師による処方に従って、 ORSBiotic [オーアールエスピオティック]™を服用 してください。

服用量は、この小冊子に記載された情報とは異なる場合があります。

4b) ORSBiotic [オーアールエスピオティック]™の 服用量は?

担当医師の指示に従うか、使用直前に粉末5g(1 さじ)を200mlの冷水に加え、よく混ぜて服用します。

毎日のORSBiotic™ [オーアールエスビオティック] ™粉末服用量は、担当の医師または薬剤師におたずねください。治療中の状態や、他に何らかの医薬品を使用しているかによります。

4c) ORSBiotic [オーアールエスピオティック]™の 服用方法

粉末は冷水に溶かし、少しずつ何度も摂取するようにしてください。作った溶液は冷蔵庫で保管してください。作ってから12時間以上経過した溶液は捨ててください。

4d) ORSBiotic [オーアールエスビオティック]™の 服用タイミング

推奨される用量は、3歳未満で90分ごとに100ml; 3~6歳で60分ごとに100ml; 6~12歳で30分ごとに100ml; 13歳以上で30分ごとに200mlとなっています。

4e) ORSBiotic [オーアールエスビオティック]™の 服用期間

ORSBiotic [オーアールエスビオティック]™は、医師または薬剤師の処方通りの期間、服用してください。

4f) ORSBiotic [オーアールエスピオティック]™を 飲み忘れた場合

飲み忘れた用量を一度に服用しようとしないでください。

予期せぬ副作用をもたらす恐れがあります。

次の服用時間が迫っている場合、服用し損ねた用量はそのまま省き、次の用量のみを服用してください。

判断に迷う場合は、担当の医師または薬剤師に 確認してください。

4g) ORSBiotic [オーアールエスビオティック]™を 服用しすぎた場合(過剰摂取)

できるだけ早く担当の医師または薬剤師を訪問し てください。その際、適切な処置を判断するため にも、ORSBiotic [オーアールエスビオティック]™を どのくらい摂取してしまったかを伝えてください。 不快感や中毒の症状が現れたら、医師または薬 剤師を訪問してください。

5. ORSBiotic [オーアールエスビオティック]™の服 用中

5a) 実施<u>すべき</u>こと:

ORSBiotic [オーアールエスピオティック]™の服用 中に妊娠が判明した場合、直ちに担当の医師ま たは薬剤師に伝えてください。

新たな医薬品の服用を開始することになりそうな 場合、担当の医師または薬剤師に、ORSBiotic [オーアールエスビオティック]™を服用しているこ とを伝えてください。

担当の医師または薬剤師の指示には、常に慎重 に従ってください。

5b) 実施すべきでないこと

ORSBiotic [オーアールエスビオティック]™を加熱 したり、また熱い液体や食品と混ぜたりしないでく ださい。

ORSBiotic [オーアールエスビオティック]™を極端 な熱に長時間さらさないでください。

5c) 気をつけるべきこと

ORSBiotic [オーアールエスビオティック]™にはプ ロバイオティクスが含まれているため、抗生物質 と一緒に服用すると、効力を弱めてしまうことがあ ります。この相互作用を避けるためには、ORSBio tic [オーアールエスビオティック]™を抗生物質を 服用する少なくとも2時間前または後に服用してく ださい。

詳細は、担当医師と相談してください。

6. 副作用

どんな医薬やサプリメントにも副作用があります。 重篤な症状を引き起こすものもありますが、ほと んどの場合は軽症で済みます。

これらはあくまで副作用の可能性であり、ほぼ心 配はありません。いずれの副作用も引き起こさな い場合もあります。

疑問があれば、担当の医師または薬剤師におた ずねください。

次のいずれかの症状が現れ、不安が残る場合は、 医師または薬剤師に相談してください。

- 胃部のけいれんまたは痛み
- 下痢
- 俥山壯汯
- 胃の膨満感
- ガス

これらの副作用は通常、軽度であり、用量により ます。こうした症状のほとんどが、ORSBiotic [オ

-アールエスビオティック]™の投与量が減るか、 投与が停止してから数日で消えていきます。

また含有成分に対する深刻なアレルギー反応が 引き起こされることもまれです。ただし、次のいず れかが発症した場合、ただちに担当の医師また は薬剤師に伝えてください:

- 皮膚の発疹
- 顔および/または口の腫れ
- 呼吸困難
- 皮膚のかゆみ

こうした症状が持続する場合、担当医師にご相 談ください。6ヶ月未満の乳児に6時間、3歳未満 の幼児に12時間、3~6歳の子供に24時間、7歳 以上の子供および大人に48時間を、それぞれ超 えて下痢が続く場合は、医師の診察を受けてくだ さい。

グルコース(糖)を含んでいます。この粉末には 亜鉛が含まれているため、大量に長期間摂取す ると身体に危険なことがあります。

7. ORSBiotic 「オーアールエスピオティック〕™の服 用後

7a) 保管

服用時まで、ORSBiotic [オーアールエスビオティ ック]™はボトルに保管しておきます。粉末をボトル から出すと、品質が保てなくなる恐れがあります。

ORSBiotic 「オーアールエスビオティック]™は、常 に元の容器にて保管してください。 摂氏25度未満 の環境で保管してください。冷蔵庫での保管を推 奨します。ただし、冷凍はしないでください。

ORSBiotic [オーアールエスビオティック]™はもち ろん、医薬品一般は、浴室やシンクのそばに保管 しないでください。

車内や窓辺に放置しないでください。

熱や湿気により、医薬品が使用不能になってしま うことがあります。

子供の手の届かないところに保管してください。

GastroDaily [ガストロデイリー] ™は光の当たらな いところに保管してください。

8. 製品の説明

8a) ORSBiotic [オーアールエスピオティック]™の 見た目

ORSBiotic [オーアールエスビオティック]™はオレ ンジ色の粉末です。粉末は、容量100g(20回分用 量)の、白色の円筒ボトルに充填されています。

86) 盾材料

5g(1さじ)用量当たり活性成分

サッカロマイセス・セレビシェ亜種ブラウディ (Saccharomyces cerevisiae ssp. boulardii: Med 4 2∩倍株 乳酸菌(Lactobacillus gasseri: Med 23)... 20億株 ラクトバチルス・プランタルム(Lactobacillus plantarum: Med 25)... ビフィドバクテリウム - ブレヴェ(Bifidobacterium breve: Med12)...

塩化ナトリウム(Sodium C	Chloride) 533.2mg
食塩相当量	209.7mg
塩化化合物相当量.	323.5mg
クエン酸カリウム	449.1mg
カリウム相当量	162.6mg
クエン酸塩相当量	261.8mg
無水グルコース	2.5g
無水クエン酸	890.5mg
グルコン酸亜鉛	44.8mg
	6.4mg

添加剤

シリカ ステビア タウマチン オレンジフレーバー キャロット粉末

ORSBiotic [オーアールエスビオティック]™には人 工色素、香味料、甘味料を含んでいません

ORSBiotic [オーアールエスビオティック]™は菜食 主義の方もご利用いただけます

ORSBiotic [オーアールエスピオティック]™にはグ ルテンや乳製品は含まれていません

9. 翻訳

To read this information in other languages go to www.medlab.co/translate

Para leer esta información en otros idiomas van a www.medlab.co/translate

Pour lire cette information dans d'autres langues allez à www medlab co/translate

لقراءة هذه المعلومات بلغات أخرى تذهب www.medlab.co/translate

この情報を別の言語でご参照になりたい場合、次 のURLにアクセスしてください:

Чтобы прочитать эту ин формацию в другие язык и пойти www.medlab.co/translate

要閱讀這些信息在其他語言中去 www.medlah.co/translate

要阅读这些信息在其他语言中去 www.medlab.co/translate

10. メーカー

ORSBiotic [オーアールエスビオティック]™のオー ストラリアにおける供給元: Medlab Clinical Limited™内部署 66 McCauley Street Alexandria NSW 2015 国内フリーダイアル: 1300 369 570

オーストラリア公開番号 AUST L 239102 この小冊子は2015年5月に作成されました 2015年5月最終更新

Medlab Clinical Limited™