

SB 5B™

Contiene 250 mg (5 miliardi UFC) di *Saccharomyces cerevisiae ssp. boulardii*

Consumer Medicine Information

1. Cosa c'è nel foglio illustrativo?

Questo foglio illustrativo fornisce le risposte ad alcune domande comuni su SB 5B™ capsule.

Non contiene tutte le informazioni disponibili. Non prendere il posto di parlare con il vostro professionista della salute sanitaria o al farmacista.

Tutti i medicinali hanno rischi e benefici. Il medico ha valutato i rischi di voi che hanno SB 5B™ capsule contro i benefici che si prevede sarà per lei.

Se si hanno dei dubbi a prendere questo farmaco, si rivolga al medico o al farmacista.

Conservi questo foglio con la medicina.

Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.

2. Il SB 5B™ è utilizzato per

Saccharomyces boulardii è evidenziato in probiotici benefici lievito. Ciò dimostra l'efficacia nell'alleviare la diarrea a causa di numerose cause e gestire i sintomi associati alla diagnosi medica sindrome del colon irritabile, dolori addominali e gonfiore addominale, flatulenza e alterato abitudini intestinali. S. boulardii supporta un sano funzionamento del sistema immunitario, favorisce una sana funzione gastrointestinale ed integrità e supporta benefici ottimale crescita microbica.

Ci sono molti diversi tipi di farmaci usati per migliorare i sintomi gastrointestinali.

Il vostro medico o farmacista può aver prescritto SB 5B™ per un altro motivo.

Chiedi al tuo medico o il farmacista se avete domande relative a SB 5B™ e perché è stato prescritto per lei.

SB 5B™ non è coinvolgente.

3. Prima di prendere SB 5B™

3A) quando non lo deve prendere

Non prendere SB 5B™ se:

1. Ha avuto una reazione allergica a SB 5B™ o qualsiasi ingrediente elencato nella sezione 8b.

2. L'imballaggio è lacerato o mostra segni di manomissione.

3. La data di scadenza (SCAD.) riportata sulla confezione è passata.

Se si prende il medicinale dopo la data di scadenza è passata, forse non funziona così bene.

Se non siete sicuri se si deve iniziare a prendere SB 5B™ contatto il vostro professionista della salute sanitaria o al farmacista.

3B) prima di iniziare a prendere il

Informi il suo medico se:

1. Eventuali allergie a qualsiasi altri farmaci, alimenti, conservanti, coloranti o additivi.

SB 5B™ contiene cellulosa, silice, magnesio stearato.

Se si verificano reazioni allergiche o altri effetti collaterali dopo aver consumato SB 5B™ è necessario interrompere l'uso e consultare il medico o il farmacista.

2. È incinta o sta pianificando una gravidanza

3. L'allattamento al seno o che si prevede di allattare al seno

4. Lei ha o ha avuto altri problemi di salute o problemi:

- Malattie dello stomaco o dell'intestino
- Compromissione del sistema immunitario (HIV/AIDS o durante trattamento del cancro)
- Infezioni fungine

Se non si è detto che il vostro professionista della salute sanitaria o farmacista di quanto sopra, dire loro prima di iniziare a prendere SB 5B™

3C) Assunzione di altri medicinali

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo altri medicinali, compresi quelli che si ottengono senza prescrizione di un naturopata, supermercato o negozio di alimentari salute.

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo uno dei seguenti:

- Farmaci immunosoppressori
- Antibiotici
- Antifungini

Alcuni medicinali possono essere affetti da SB 5B™, o può influenzare il modo in cui funziona. Potrebbe essere necessario assumere diverse quantità di medicine, o potrebbe essere necessario assumere farmaci diversi. Il vostro medico vi indicherà.

Il vostro medico o il farmacista ha più informazioni sui farmaci o evitare con attenzione tenendo SB 5B™.

Chiedi al tuo medico o al farmacista se non siete sicuri su questo elenco di medicinali.

4. Come prendere SB 5B™

4A) quanto a prendere

Seguire tutte le indicazioni fornite dal vostro medico o farmacista.

Prendere SB 5B™ esattamente come il vostro professionista della salute sanitaria o farmacista ha prescritto.

Essi possono essere diverse da quelle contenute nel presente foglio illustrativo.

4B) quanto SB 5B™ da prendere?

Uno (1) capsula, uno (1) e due (2) volte al giorno, o come diretto dal vostro professionista della salute sanitaria.

Il vostro medico o il farmacista vi dirà quanti SB 5B™ capsule di prendere ogni giorno. Questo dipende dalla condizione che viene trattata e la presenza di eventuali altri farmaci sono utilizzati.

4C) come SB 5B™

Le capsule devono essere deglutite intere con acqua al giorno prima dei pasti.

Le capsule possono essere aperti e piatti freddi. Consultare il medico o il farmacista se non siete sicuri.

Non prendere le capsule che sono danneggiate.

4D) Quando prendere SB 5B™

Prima dei pasti, salvo diversamente indicato dal vostro medico.

4E) per quanto tempo si SB 5B™

Prendere SB 5B™ per tutto il tempo che il medico o il farmacista.

4F) Se si dimentica di prendere SB 5B™

Non tentare di compensare le dosi saltate prendendo una dose supplementare.

Questo può aumentare la probabilità di ottenere un effetto collaterale indesiderato.

Se è quasi tempo per la dose successiva, salti la dose che avete perso e prendere la dose successiva quando preferisci.

Se non si è sicuri di cosa fare, controllare con il vostro medico o farmacista.

4G) se si è preso troppo SB 5B™ (overdose)

Visitare il vostro medico o il farmacista il più presto possibile. Dite loro quanto SB 5B™ hai preso e lui/lei può determinare qual è l'azione migliore per la vostra salute. La preghiamo di visitare il medico o il farmacista anche se non ci sono segni di disagio o avvelenamento.

5. Mentre sta prendendo SB 5B™

5A) Cosa deve fare:

Se diventate incinti mentre prendete, SB 5B™ informi il medico o il farmacista.

Se si sta per avviare un nuovo farmaco, informi il medico o il farmacista se sta assumendo SB 5B™.

Se si desidera avere la chirurgia, compresi quelli dentistici chirurgia, informi il medico o il farmacista se sta assumendo SB 5B™.

Seguire sempre il vostro medico o farmacista attentamente le istruzioni.

5B) Le cose non si deve fare

Non riscaldare SB 5B™ o aggiungere in piatti caldi.

Non esporre SB 5B™ a condizioni estreme per periodi di tempo prolungati.

5C) le cose a cui prestare attenzione

Come SB 5B™ contiene un lievito probiotico, antifungali lungo con questo probiotici possono ridurre l'efficacia.

Per evitare questa interazione prendere SB 5B™ almeno 2 ore prima o dopo un anti-fungine farmaci.

Si deve discutere di questo con il vostro professionista della salute sanitaria.

6. Effetti Collaterali

Tutti i medicinali possono avere effetti collaterali. A volte sono gravi, la maggior parte del tempo non sono.

Non è il caso di allarmarsi per questa lista di possibili effetti collaterali. Non si può sperimentare uno di essi.

Chiedi al tuo medico o il farmacista di rispondere alle vostre eventuali domande.

Informi il medico o il farmacista se nota uno qualsiasi dei seguenti e si preoccupano di:

- Crampi o dolori nella zona dello stomaco
- Stitichezza
- Diarrea
- Muco nelle feci
- Gonfio o area dello stomaco gonfio
- Gas

Questi effetti collaterali sono lievi e correlato alla dose. La maggior parte di essi scompare completamente nel giro di pochi giorni dopo che la dose di SB 5B™ viene abbassata o arrestato.

Gravi reazioni allergiche a questi ingredienti sono rari; tuttavia informi il medico o il farmacista immediatamente se si verifica uno dei seguenti:

- Eruzione cutanea
- Gonfiore del volto e/o della gola
- Difficoltà a respirare
- Prurito della pelle

Rivolgersi a un medico è la diarrea persiste per più di 6 ore per i bambini sotto i 6 mesi, 12 ore nei bambini di età inferiore ai 3 anni; 24 ore nei bambini di età compresa tra 3 - 6 anni e 48 bambini di età superiore ai 6 anni e adulti.

7. Dopo aver tenuto SB 5B™

7A) Deposito

Mantenere SB 5B™ in bottiglia fino a quando non è tempo di fare. Se si prendono le capsule fuori della bottiglia che non possono tenere bene.

Conservare sempre SB 5B™ solo nel suo contenitore originale.

Mantenere SB 5B™ refrigerato.
Non congelare.

Non conservare SB 5B™, o qualsiasi altro medicinale, in un bagno o in prossimità di un lavandino. Non lasciare in auto o sui davanzali.

Calore e umidità può distruggere la medicina.

Proteggere SB 5B™ dalla luce.

8. Descrizione del prodotto

8A) Che cosa SB 5B™ sembra

SB 5B™ è un granulato polvere di colore marrone chiaro in una capsula. SB 5B™ è confezionata in una bottiglia di plastica riciclabile con un sigillo di garanzia. SB 5B™ è disponibile in flaconi contenenti 60 capsule.

8B) gli ingredienti

Ingredienti attivi

Saccharomyces cerevisiae ssp. Boulardii da 250 mg.... Equiv. 5 Miliardi UFC

Ingredienti inattivi

- Cellulosa
- Silice
- Stearato di magnesio

SB 5B™ è adatto per vegetariani

SB 5B™ è senza latte e glutine

9. Traduzione

Per leggere questa informazione in altre lingue per www.medlab.co/translate

Para leer esta información en cardenete moreno f supermercados centros idiomas van www.medlab.co/tradurre

Pour lire cette information dans d'autres langues *allez à www.medlab.co/tradurre

لراءة هذه المعلومات بلغات أخرى تذهب إلى www.medlab.co/tradurre

他の言語はwww.medlab.co/tradurreに行くには、この情報を読み取るには

Чтобы прочитать эту информацию пойти в другие языки www.medlab.co/tradurre

要閱讀這些信息在其他語言中去www.medlab.co/tradurre

要阅读这些信息在其他语言中去www.medlab.co/tradurre

10. Produttore

SB 5B™ è fornito in Australia:
UNA divisione di Medlab Limited™ Clinica
66 McCauley Street
Alexandria NSW 2015
Numero verde: 1300 369 570

SB 5B™ è fornito in America del Nord: una divisione di InMed Technologies™ Suite 400, 29883 Santa Margarita Pkwy Rancho Santa Margarita CA 92688 Numero verde 1800 921 1710

Elenco numero Australiano
AUST L 268232

Questo foglio è stato preparato nel mese di Novembre 2015
Ultimo Aggiornamento Novembre 2015

Medlab Limited™ Clinica