

IMMUNE-5™

Soporte inmunológico

Información Médica para el Consumidor

1. ¿Qué contiene el folleto?

Este folleto responde algunas preguntas comunes sobre el producto Immune-5™.

No dispone de toda la información. No reemplaza a una conversación con un profesional de la salud.

Todas las medicinas tienen riesgos y beneficios. Su doctor ha comparado los riesgos del consumo de Immune-5™ con los beneficios esperados del producto.

Si tiene dudas sobre el consumo de esta medicina, pregunte a su profesional de la salud.

Guarde este folleto con el medicamento.

Probablemente requiera volver a leerlo.

2. El uso de Immune-5™

Immune-5™ es una combinación de moduladores inmunológicos que individualmente han demostrado propiedades terapéuticas,

ResistAid™ consiste en una fibra soluble Arabinogalactan y flavonoides bioactivos con propiedades inmuno-moduladoras que podrían ayudar a mantener una función inmunológica saludable mediante varios mecanismos. Arabinogalactan también funciona como un prebiótico ayudando al crecimiento de bacterias de la flora bacteriana intestinal requerido para el buen funcionamiento inmunológico. Lactoferrina es una proteína natural con actividad anti-microbiana y anti-viral de amplio espectro. Calostro y la fracción de la proteína de suero rica en IgG proveen soporte importante al sistema inmunológico innato manteniendo el efecto de algunas proteínas con propiedades antibacterianas.

Posiblemente su profesional de la salud le prescribió Immune-5™ por otra razón.

Consulte con su profesional de la salud si tiene dudas respecto a la prescripción de Immune-5™.

Immune-5™ no es adictivo.

3. Antes de consumir Immune-5™

3a) ¿Cuándo no debería consumirlo?

No consuma Immune-5™ si:

1. Tuvo una reacción alérgica a Immune-5™, fracción de la proteína de suero rica en IgG, u otros ingredientes de este producto detallados al final del folleto en la sección 8b.

2. El embalaje está roto o muestra signos de deterioro

3. La fecha de expiración impresa en la botella ha caducado.

Si consume esta medicina después de la fecha de expiración, podría no funcionar adecuadamente.

Si no está seguro de iniciar el consumo de Immune-5™ contacte a su profesional de la salud.

3b) Antes de iniciar el consumo de este producto

Usted debe dar a conocer a su doctor si:

1. Usted tiene alergias a otros medicamentos, alimentos, preservantes, colorantes o aditivos.

Las cápsulas de Immune-5™ contienen lactoferrina que se deriva de la proteína del suero.

Si experimenta alguna reacción alérgica u otro efecto secundario después del consumo de Immune-5™ usted debería dejar de consumirlo o consultar con su profesional de la salud.

2. Usted tiene o ha tenido otros problemas de salud incluyendo:

- Baja presión sanguínea
- Diabetes
- Diarrea o vomito

Si usted no le ha dicho a su profesional de la salud sobre las circunstancias arriba descritas, déselo a conocer antes de iniciar el consumo de Immune-5™

3c) Si usted está consumiendo otros medicamentos

Informe a su profesional de la salud si usted está tomando otros medicamentos, incluyendo aquellas obtenidas sin prescripción médica de una farmacia, supermercado o almacén de productos saludables

4. Cómo tomar Immune-5™

4a) ¿Cuánto tomar?

Siga cuidadosamente las indicaciones dadas por su profesional de la salud.

Consuma Immune-5™ exactamente como lo ha prescrito su profesional de la salud.

4b) ¿Cómo tomar Immune-5™?

Añadir una (1) medida a 200 mL de agua fría y mezclar apropiadamente.

4c) ¿Cuándo tomar Immune-5™?

Tomar una dosis una o dos veces al día o como lo recomiende su profesional de la salud.

4d) ¿Cuánto tiempo tomar Immune-5™?

Tomar Immune-5™ el tiempo que su profesional de la salud lo prescriba.

4e) Si usted olvida de tomar Immune-5™

No intente compensar la dosis consumiendo capsulas adicionales.

Esto podría incrementar la posibilidad de experimentar efectos secundarios. Si la hora de su siguiente dosis se acerca, tome la siguiente a la hora programada.

Si no está seguro de lo que debe hacer, contacte a su profesional de la salud.

4f) Si ha consumido demasiado Immune-5™ (sobredosis)

Visite a su profesional de la salud lo antes posible. Informe a su profesional de la salud la cantidad de Immune-5 que ingirió para que puedan determinar las acciones a tomar en beneficio a su salud. Por favor visite a su profesional de la salud aún si no tiene signos de envenenamiento.

5. Durante el consumo de Immune-5™

5a) Acciones que **DEBE** tomar:

Si queda embarazada durante el consumo de Immune-5™ informe inmediatamente a su profesional de la salud.

Si está por empezar a tomar otro medicamento, informe a su profesional de la salud que usted está tomando Immune-5™ EPA:DHA + CoQ10™.

Si usted planea una cirugía, incluyendo cirugía dental, informe a su profesional de la salud que usted está tomando Immune-5™.

Siempre siga cuidadosamente las instrucciones de su profesional de la salud.

5b) Acciones que **no debe** tomar

No caliente Immune-5™ o añada a alimentos calientes.

No exponga Immune-5™ a extremas temperaturas por largos periodos de tiempo.

6. Efectos secundarios

Todos los medicamentos podrían tener efectos secundarios. Algunas veces estos efectos son serios, sin embargo la mayoría de las veces no lo son.

No se alarme con la siguiente lista de efectos secundarios, usted probablemente no los experimente.

Pregunte a su profesional de la salud si posee más inquietudes.

Comuníquese a su profesional de la salud si nota los siguientes síntomas o si le preocupan:

- Calambres o dolor de estómago
- Constipación
- Diarrea
- Moco en heces
- Hinchazón estomacal
- Flatulencia

Estos efectos secundarios son usualmente moderados y dependientes de la dosis. La mayoría desaparece completamente en

algunos días después de que la dosis disminuya o cese el consumo de Immune-5™.

Informe inmediatamente a su profesional de la salud si ha experimentado:

- Erupciones cutáneas
- Hinchazón de cara y garganta
- Picazón
- Dificultad para respirar

7. Después de consumir Immune-5™

7a) Almacenamiento

Guarde las cápsulas de Immune-5™ en su botella hasta que sea hora de consumirlo. Si retira el polvo de la botella estas podrían no mantenerse adecuadamente.

Siempre almacene Immune-5™ únicamente en su recipiente original.

Mantenga Immune-5™ bajo 25°C. Se recomienda almacenarlo en la refrigeradora. No congelar.

No almacene Immune-5™, u otro medicamento, en el baño o cerca del fregadero.

No dejarlo en el carro o marcos de ventanas.

El calor y la humedad pueden destruir el medicamento.

Manténgalo alejado del alcance de los niños.

Proteja Immune-5™ de la luz.

8. Descripción del producto

8a) La apariencia de Immune-5™

Immune-5™ es un polvo rosado claro. Immune-5™ está empacado en botellas cilíndricas blancas y cada botella contiene 150 g (30 dosis).

Ingredientes

8b) Ingredientes Activos

Lactoferrina.....200mg
Fracción de proteína de suero rica en
IgG.....100mg
Calostro.....340mg
Arabinogalactan (ResistAid™).....2.25g

Ingredientes Inactivos

Maltodextrina
Sabor natural a vainilla
Dióxido de Silicio

Immune-5™ es libre de gluten.

Immune-5™ es apto para vegetarianos

9. Traducción

To read this information in other languages go to www.medlab.co/translate

Para leer esta información en otros idiomas ir a www.medlab.co/translate

Pour lire cette information dans d'autres langues vont www.medlab.co/translate/Italian

إلى تذهب أخرى ب لغات المعلومات هذه ل قراءة www.medlab.co/translate

他の言語はwww.medlab.co/translateに行くには、この情報を読み取るには

Чтобы прочитать эту информацию в другие языки пойти www.medlab.co/translate

要閱讀這些信息在其他語言中去www.medlab.co/translate

要阅读这些信息在其他语言中去www.medlab.co/translate

10. Fabricante

El proveedor de Immune-5™ EPA:DHA + CoQ10™ en Australia es:
Un departamento de Medlab Clinical Limited™
ABN
66 McCauley Street
Alexandria NSW 2015
Llame gratis al: 1300 369 570

El proveedor de Immune-5™ EPA:DHA + CoQ10™ en Norte America es:
InMed Technologies™
Un departamento InMed Technologies™
ABN
Suite 400, 29883 Santa Margarita Pkwy
Rancho Santa Margarita CA 92688
Llame gratis al: 1800 921 1710

Australian Listing Number
AUST L 227515

Este folleto fue realizado en Septiembre 2014
Última edición Septiembre 2014

Medlab Clinical Limited™