

GastroDaily [ガストロデイリー]™

健全な胃腸機能と自然免疫機能の支援

消費者薬情報

1.この小冊子に記載の情報

この小冊子では、GastroDaily [ガストロデイリー]™粉末についての一般的な疑問に対する回答を記載しています。

参照できる情報すべてを含むものではありません。すなわち、担当医師や薬剤師への相談を優先してください。

どんな医薬やサプリメントにも、効果とリスクがあります。担当医師はあなたがGastroDaily [ガストロデイリー]™粉末を服用することにより期待できる効果と、その一方でリスクとを考慮しています。

この医薬品の服用について、何らかの懸念がある場合は、ご担当の医師または薬剤師におたずねください。

この小冊子は、医薬品と一緒に保管してください。

必要に応じて読み返すようにしてください。

2.GastroDaily [ガストロデイリー]™の用途

GastroDaily [ガストロデイリー]™は、科学的根拠に基づく処方により、健全な胃腸および自然免疫機能を支援し、医学的に診断された過敏性腸症候群の症状緩和に役立ちます。

GastroDaily [ガストロデイリー]™は、有益な薬用酵母であるサッカロマイセス・セレビシエ亜種ブラウディを含有しているため、下痢の症状を原因を問わず緩和し、胃腸内の健康的な微生物の構成を保ちます。ResistAid [レジストエイド]™には、水溶性食物繊維であるアラビノガラクトンと生理活性フラボノイドを含んでおり、健康な免疫機能をサポートする免疫調節特性について、様々なメカニズムに臨床的証拠を有しています。アラビノガラクトンはプレバイオティクスとして機能し、健康な共生細菌の成長と活動をサポートします。ペパーミント (*Mentha piperita*: セイヨウハッカ) には、抗嘔吐、鎮痙性、および抗菌性の活性を帯びた、有効化学成分が含まれています。GastroDaily [ガストロデイリー]™は、体調や健康の全般的な維持に役立ちます。

担当の医師や薬剤師は、別の理由でGastroDaily [ガストロデイリー]™を処方している場合があります。

あなたに処方されたGastroDaily [ガストロデイリー]™について疑問があれば、担当の医師または薬剤師におたずねください。

GastroDaily [ガストロデイリー]™に依存性はありません。

3.GastroDaily [ガストロデイリー]™の服用前に、以下をご確認ください。

3a) 服用してはならない時

次の場合、GastroDaily [ガストロデイリー]™を服用しないでください:

1.GastroDaily [ガストロデイリー]™またはセクション8bに記載された任意の成分に対するアレルギー反応を起こしたことがある

2.パッケージが不在であったり、破れや不正加工の痕跡がある

3.パッケージに印刷された使用期限 (EXP) が切れている有効期限が切れていたり、パッケージが破損したりしている場合、薬剤師に返却して処分してもらいます。

使用期限の過ぎた医薬品は服用しても、効果が出ないことがあります。

GastroDaily [ガストロデイリー]™の服用を始めるべきか否かわからない場合は、担当の医師または薬剤師にお訊ねください。

3b) 服用する前

以下の場合、担当医師に相談してください:

1.何らかの医薬品、食品、防腐剤、染料または添加剤へのアレルギーがある

GastroDaily [ガストロデイリー]™には、サッカロマイセス・ブラウディ、グルタミン、アラビノガラクトン、およびペパーミントリーフ粉末を含みます。

GastroDaily [ガストロデイリー]™を服用してからアレルギー反応その他の副作用を引き起こした場合、使用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。

2.妊娠中または妊娠の予定がある

3.授乳中または授乳の予定がある

4.下記を含む、健康上の問題や困難を抱えているか、または抱えていたことがある:

- 胃腸の不調
- 免疫不全 (HIV/AIDS、またはガン治療中)
- 短腸症候群

上記いずれかの状態を、担当の医師や薬剤師に伝えていない場合は、GastroDaily [ガストロデイリー]™の服用を開始する前に伝えるようにしてください。

3c) その他医薬品の服用

自然療法医、スーパーマーケット、健康食品店などから、処方箋なしに入手したものを含む、何らかの医薬品を服用している場合は、担当の医師または薬剤師にその旨を伝えてください。

次のいずれかの医薬品を服用している場合は、医師または薬剤師に相談してください。

- 免疫抑制薬
- 抗生物質

服用している医薬品によっては、GastroDaily [ガストロデイリー]™の影響、またはその効力に影響

する恐れがあります。このため、すでに服用している医薬品の用量を変えたり、別の医薬品を服用しなければならなくなることがあります。詳細は、担当医師にご相談ください。

ご担当の医師または薬剤師は、GastroDaily [ガストロデイリー]™の服用中に気をつけるべき、または避けるべき医薬品についての詳細情報を熟知しています。

上記の医薬品について、よくわからない場合は、ご担当の医師または薬剤師におたずねください。

4.GastroDaily [ガストロデイリー]™の服用方法

4a) 服用すべき用量

担当の医師または薬剤師による指示には、すべて慎重に従うようにしてください。

担当の医師または薬剤師による処方に従って、GastroDaily [ガストロデイリー]™を服用してください。

服用量は、この小冊子に記載された情報とは異なる場合があります。

4b) GastroDaily [ガストロデイリー]™の服用量は?

1回の用量6g (1さじ) を水250mlに溶かし、すぐにお飲みください。1日1~2回、またはご担当の医師の指示に従って服用してください。

毎日のGastroDaily [ガストロデイリー]™粉末服用量は、担当の医師または薬剤師におたずねください。治療中の状態や、他に何らかの医薬品を使用しているかによります。

GastroDaily [ガストロデイリー]™の服用方法

粉末は冷水の中で攪拌しながら溶かし、ただちに摂取するようにしてください。

4d) GastroDaily [ガストロデイリー]™の服用タイミング

GastroDaily [ガストロデイリー]™は、ご担当の医師から特に指示がない限り、1日1~2回、食事の前に服用してください。

4e) GastroDaily [ガストロデイリー]™の服用期間

GastroDaily [ガストロデイリー]™は、医師または薬剤師の処方通りの期間、服用してください。

4f) GastroDaily [ガストロデイリー]™を飲み忘れた場合

飲み忘れた用量を一度に服用しようとしなくてください。

予期せぬ副作用をもたらす恐れがあります。

次の服用時間が迫っている場合、服用し損ねた用量はそのまま省き、次の用量を服用してください。

判断に迷う場合は、担当の医師または薬剤師に確認してください。

4g) GastroDaily [ガストロデイリー]™を服用しすぎた場合(過剰摂取)

できるだけ早く担当の医師または薬剤師を訪ねてください。その際、適切な処置を判断するためにも、GastroDaily [ガストロデイリー]™をどのくらい摂取してしまったかを伝えてください。不快感や中毒の症状が現れたら、医師または薬剤師を訪ねてください。

5. GastroDaily [ガストロデイリー]™の服用中

5a) 実施すべきこと:

GastroDaily [ガストロデイリー]™の服用中に妊娠が判明した場合、直ちに担当の医師または薬剤師に伝えてください。

新たな医薬品の服用を開始することになりそうな場合、担当の医師または薬剤師に、GastroDaily [ガストロデイリー]™を服用していることを伝えてください。

口腔外科を含む外科手術を予定している場合、担当の医師または薬剤師に、GastroDaily [ガストロデイリー]™を服用していることを伝えてください。

担当の医師または薬剤師の指示には、常に慎重に従ってください。

5b) 実施すべきでないこと

GastroDaily [ガストロデイリー]™を加熱したり、また熱い液体や食品と混ぜたりしないでください。

GastroDaily [ガストロデイリー]™を極端な熱に長時間さらさないでください。

5c) 気をつけるべきこと

GastroDaily [ガストロデイリー]™にはプロバイオティクスが含まれているため、抗生物質と一緒に服用すると、効力を弱めてしまうことがあります。この相互作用を避けるためには、GastroDaily [ガストロデイリー]™を抗生物質を服用する少なくとも2時間前または後に服用してください。

詳細は、担当医師と相談してください。

6. 副作用

どんな医薬やサプリメントにも副作用があります。重篤な症状を引き起こすものもありますが、ほとんどの場合は軽症で済みます。

これらはあくまで副作用の可能性であり、ほぼ心配はありません。いずれの副作用も引き起こさない場合もあります。

疑問があれば、担当の医師または薬剤師におたずねください。

次のいずれかの症状が現れ、不安な場合は、医師または薬剤師に相談してください。

- 胃部のけいれんまたは痛み
- 便秘
- 下痢
- 便中粘液
- 胃の膨満感
- ガス

これらの副作用は通常、軽度であり、用量によります。こうした症状のほとんどが、GastroDaily [ガストロデイリー]™の投与量が減るか、投与が停止してから数日で消えていきます。

また含有成分に対する深刻なアレルギー反応が引き起こされることもまれです。ただし、次のいずれかが発症した場合、ただちに担当の医師または薬剤師に伝えてください:

- 皮膚の発疹
- 顔および/または口の腫れ
- 呼吸困難
- 皮膚のかゆみ

こうした症状が持続する場合、担当医師にご相談ください。6ヶ月未満の乳児に6時間、3歳未満の幼児に12時間、3～6歳の子供に24時間、7歳以上の子供および大人に48時間を、それぞれ超えて下痢が続く場合は、医師の診察を受けてください。

7. GastroDaily [ガストロデイリー]™の服用後

7a) 保管

服用時まで、GastroDaily [ガストロデイリー]™はボトルに保管しておきます。粉末をボトルから出すと、品質が保てなくなる恐れがあります。

GastroDaily [ガストロデイリー]™は、常に元の容器にて保管してください。摂氏25度未満の環境で保管してください。冷蔵庫での保管を推奨します。ただし、冷凍はしないでください。

GastroDaily [ガストロデイリー]™はもちろん、医薬品一般は、浴室やシンクのそばに保管しないでください。

車内や窓辺に放置しないでください。

熱や湿気により、医薬品が使用不能になってしまうことがあります。

子供の手の届かないところに保管してください。

GastroDaily [ガストロデイリー]™は光の当たらないところに保管してください。

8. 製品の説明

8a) GastroDaily [ガストロデイリー]™の見た目

GastroDaily [ガストロデイリー]™はオフホワイト色の粉末です。粉末は、容量150 g(25回分用量)の、白色の円筒ボトルに充填されています。

8b) 原材料

6 g(1さじ) 用量当たり活性成分

サッカロマイセス・セレビシエ亜種ブラウディ (*Saccharomyces cerevisiae ssp. boulardii*: Med 4 1)..... 50億株
L-グルタミン(L-Glutamine) 2g
アラビノガラクトン(*Arabinogalactan*: ResistAid [レジストエイド]™) 2g
乾燥ペパーミントリーフ 100mg
乾燥ペパーミントリーフ相当量 500mg

添加剤

シリカ
ココア粉末
ステビア
チョコレートフレーバー
ペパーミントフレーバー

GastroDaily [ガストロデイリー]™には人工色素、香料、甘味料を含んでいません

GastroDaily [ガストロデイリー]™は 채식주의の方でもご利用いただけます

GastroDaily [ガストロデイリー]™にはグルテンや乳製品は含まれていません

9. 翻訳

To read this information in other languages go to www.medlab.co/translate

Para leer esta información en otros idiomas van a www.medlab.co/translate

Pour lire cette information dans d'autres langues allez à www.medlab.co/translate

لقراءة هذه المعلومات بلغات أخرى تذهب إلى www.medlab.co/translate

この情報を別の言語でご参照になりたい場合、次のURLにアクセスしてください:

Чтобы прочитать эту информацию в другие языки пойти www.medlab.co/translate

要閱讀這些信息在其他語言中去 www.medlab.co/translate

要阅读这些信息在其他语言中去 www.medlab.co/translate

10. メーカー

GastroDaily [ガストロデイリー]™のオーストラリアにおける供給元:
Medlab Clinical Limited™内部署
66 McCauley Street
Alexandria NSW 2015
国内フリーダイヤル:1300 369 570

オーストラリア公開番号
AUST L
この小冊子は2015年5月に作成されました
2015年5月最終更新

Medlab Clinical Limited™