

НаноЦелл™ D3 (NanoCelle™ D3)

Содержит мицеллизованный Витамин D3 | Холекальциферол

Инструкция по медицинскому применению препарата

1. Содержание инструкции

Данная инструкция содержит ответы на общие вопросы о НаноЦелл™ D3.

Инструкция не предоставляет всю существующую информацию о препарате. Кроме этого, она не заменяет консультации со специалистом.

Все медицинские препараты несут риски и пользу. Ваш врач рассчитал соотношение рисков и пользы для Вас при применении НаноЦелл™ D3.

В случае возникновения вопросов по применению данного препарата, следует обратиться к Вашему лечащему врачу.

Хранить инструкцию вместе с препаратом на случай необходимости повторного ознакомления.

2. Показания к применению

НаноЦелл™ D3 применяется для восполнения в организме недостатка Витамина D. Витамин D3 – жирорастворимый витамин, который синтезируется в организме естественным образом под воздействием солнца, и также поступает путем употребления в пищу таких продуктов, как рыбий жир, яичный желток и говяжья печень.

Витамин D3 способствует всасыванию пищевого кальция и фосфора, необходимых для сохранения минеральной плотности костной ткани. Витамин D3 применяется для лечения и предотвращения поражений костей, таких как рахит и остеопороз. Рецептор Витамина D (VDR) расположен в клетках тела, включая иммунные клетки, и отвечает за активацию экспрессии генов и, соответственно, клеточную функцию.

Витамин D3 воздействует на транскрипцию более, чем 900 генов.

Витамин D3 применяется для:

- Предотвращения потери плотности костной ткани
- Нормализации работы иммунной функции
- Нормализации работы нервной системы
- Нормализации работы сердечно-сосудистой системы
- Нормализации работы почек

Назначение препарата НаноЦелл™ D3 может быть вызвано другими показаниями.

Проконсультируйтесь с лечащим врачом по причинам назначения Вам НаноЦелл™ D3.

Что такое холекальциферол?

Холекальциферол является формой Витамина D3 и активным веществом в составе НаноЦелл™ D3. Он также известен как Витамин D3. Витамин D3 является жирорастворимым витамином.

НаноЦелл™ D3 не вызывает привыкания.

3. Перед применением НаноЦелл™ D3

В каких случаях нельзя применять препарат

Не следует применять НаноЦелл™ D3 при:

1. Появлении аллергической реакции на НаноЦелл™ D3, холекальциферол или любой другой компонент в составе НаноЦелл™ D3 Спрей (согласно перечня в разделе 8).

2. Нарушении упаковки или обнаружении видимых следов повреждения.

3. Истечении срока годности («Годен до»), указанного на упаковке.

В случае использования препарата с истекшим сроком годности, его эффективность может быть снижена.

Если Вы не уверены в применении НаноЦелл™ D3, следует проконсультироваться с Вашим лечащим врачом.

Избегать использования НаноЦелл™ D3 детьми.

Перед началом использования препарата

Следует сообщить Вашему лечащему врачу:

1. О наличии аллергии на любые другие препараты, пищевые продукты, консерванты, красители или добавки.

НаноЦелл™ D3 содержит модифицированный растительный жир, глицерин, мятное масло, лимонную кислоту, сорбат калия, стевииолы, гликозиды, маисовое масло и очищенную воду.

Если Вы испытываете любую аллергическую реакцию или другие побочные проявления при приеме НаноЦелл™ D3, немедленно прекратите использование препарата и проконсультируйтесь с лечащим врачом.

2. О наличии беременности или ее планировании.

3. О том, что вы - кормящая мать или планируете ею стать.

4. О наличии в настоящем или прошлом других нарушений здоровья, включая:

- Гиперкальциемию
- Гипервитаминоз D
- Синдром мальабсорбции
- Заболевание почек
- Заболевание печени

5. Об употреблении Вами большого количества алкоголя.

Следует сообщить Вашему лечащему врачу о вышеизложенном перед началом использования НаноЦелл™ D3.

Взаимодействие с другими препаратами

Следует сообщить лечащему врачу о приеме всех лекарственных препаратов, включая те, которые были приобретены без рецепта в аптеке, супермаркете или магазине диетических продуктов.

Некоторые препараты могут повлиять на действие НаноЦелл™ D3. Среди них:

- Стероидные препараты, в частности, Преднизон
- Средство для похудения Орлистат

- Гипохолестеринимические препараты, в частности, Холестерамин
- Противосудорожные средства, в частности, Фенобарбитал и Дилантин

Взаимодействие данных препаратов с НаноЦелл™ D3 может повлиять на их работу или на эффективность НаноЦелл™ D3. Возможно, Вам потребуется изменить дозировку приема данных лекарственных препаратов, либо полностью их заменить. Проконсультируйтесь со специалистом.

Ваш лечащий врач обладает более полной информацией о препаратах, которые можно или нельзя принимать одновременно с использованием НаноЦелл™ D3.

Обратитесь к Вашему лечащему врачу, если данный перечень препаратов вызывает у Вас сомнение.

4. Способ применения НаноЦелл™ D3

Дозировка

Необходимо четко следовать указаниям Вашего лечащего врача

Применять НаноЦелл™ D3 следует строго по рецепту Вашего врача.

Эта информация может отличаться от рекомендаций в настоящей инструкции.

Какова дозировка НаноЦелл™ D3?

Рекомендуемая доза для взрослого 0,3 мл (2 впрыскивания) ежедневно в область рта перед приемом пищи.

Ваш лечащий врач сообщит Вам о том, какова Ваша ежедневная дозировка НаноЦелл™ D3.

Дозировка зависит от показаний к применению и от того, используются ли в лечении другие препараты.

Как применять НаноЦелл™ D3

НаноЦелл™ D3 применяется путем прямого впрыскивания на слизистую оболочку полости рта (например, щеки) или под язык.

Проконсультируйтесь с лечащим врачом по вопросам применения.

Не использовать НаноЦелл™ D3, если упаковка повреждена.

Когда применять НаноЦелл™ D3

НаноЦелл™ D3 следует впрыскивать перед приемом пищи либо согласно указаниям Вашего врача.

Срок применения НаноЦелл™ D3

Срок применения НаноЦелл™ D3 определяется лечащим врачом.

Если Вы забыли использовать НаноЦелл™ D3

Не пытайтесь восполнить пропущенное применение за счет дополнительной дозы.

Это может увеличить вероятность появления нежелательного побочного действия.

Если подошло время следующего применения препарата, пропустите пропущенную дозу и используйте препарат согласно графика.

Если Вы затрудняетесь, как поступить, обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Если Вы превысили дозу НаноЦелл™ D3 (передозировка)

Следует немедленно обратиться к Вашему врачу, сообщив сколько НаноЦелл™ D3 Вы применили. После этого врачом будет принято оптимальное решение. Рекомендуется обратиться к медицинскому специалисту даже в том случае, если Вы не испытываете неприятных ощущений.

5. В ходе применения НаноЦелл™ D3

Вам СЛЕДУЕТ:

Если в ходе применения НаноЦелл™ D3 Вы забеременили, немедленно сообщите об этом Вашему о врачу.

Если Вы планируете принимать другой препарат, сообщите своему врачу, что Вы принимаете НаноЦелл™ D3.

Если у Вас ожидается хирургическая операция, в то числе в области стоматологии, сообщите врачу о том, что Вы принимаете НаноЦелл™ D3.

Всегда четко следуйте указаниям своего врача.

Категорически запрещено

Распылять НаноЦелл™ D3 в глаза.

Распылять НаноЦелл™ D3 на открытые и кровоточащие раны.

Нагревать или добавлять НаноЦелл™ D3 в горячую пищу.

Подвергать НаноЦелл™ D3 воздействию высокой температуры в течение длительного периода времени.

Особые указания

В состав НаноЦелл™ D3 входит жирорастворимый витамин. Некоторые средства для похудения могут вступить во взаимодействие с витамином D3 и сделать лечение неэффективным.

Необходимо обсудить этот вопрос со своим лечащим врачом.

6. Побочное действие

Все лекарственные препараты имеют побочные эффекты. Некоторые из них являются серьезными, но большинство – незначительны.

Обратитесь к своему врачу по вопросам побочного действия препарата.

Если Вы испытываете любые из следующих симптомов после приема дозы НаноЦелл™ D3, сообщите медицинскому специалисту. Такие симптомы могут быть вызваны аллергической реакцией:

- Затрудненное дыхание
- Отек лица и гортани
- Кожная сыпь
- Зуд

Сообщите Вашему лечащему врачу, если Вы заметили такие симптомы.

В случае возникновения каких-либо вопросов, обратитесь к медицинскому специалисту.

7. После применения НаноЦелл™ D3

Условия хранения

Хранить НаноЦелл™ D3 в оригинальном флаконе. При извлечении жидкости из флакона, препарат может прийти в негодность.

Хранить НаноЦелл™ D3 в прохладном, сухом месте при температуре не выше 25°C. Не охлаждать и не замораживать продукт.

Не рекомендуется хранить НаноЦелл™ D3 или любые другие лекарственные препараты в ванной комнате или возле раковины. Также не рекомендуется оставлять препарат в автомобиле или на подоконнике.

Жар и сырость могут вызвать порчу препарата.

Защищать НаноЦелл™ D3 от попадания прямых солнечных лучей

Хранить в недоступных для детей местах.

Утилизация

Обратитесь к своему фармацевту или врачу в целях безопасной утилизации остатков НаноЦелл™ D3.

8. Описание

Как выглядит НаноЦелл™ D3:

НаноЦелл™ D3 представляет собой прозрачную жидкость со вкусом перечной мяты. НаноЦелл™ D3 помещен в пластиковый флакон-спрей объемом 30 мл с пластиковым колпачком.

Каждый флакон помещен в коробку из перерабатываемого картона с защитной упаковкой.

Каждый флакон-спрей объемом 30 мл содержит 100 доз (200 впрыскиваний).

Состав

Активные вещества

Витамин D3 (Холекальциферол)

Вспомогательные вещества

Модифицированный растительный жир
Глицерин
Мятное масло
Лимонная кислота
Сорбат калия
Стевиоловые гликозиды
Маисовое масло
Вода очищенная

НаноЦелл™ D3 – растительный препарат, не содержащий молочных компонентов и глутена.

9. Перевод

Для прочтения данной информации на других языках, посетите www.medlab.co/translate

Para leer esta información en otros idiomas van a www.medlab.co/translate

Pour lire cette information dans d'autres langues allez à www.medlab.co/translate Italian

هذه المعلومات بلغات أخرى تذهب إلى www.medlab.co/translate

slate

他の言語はwww.medlab.co/translateに行く

には、この情報を読み取るには

To read this information in other languages go to www.medlab.co/translate

要閱讀這些信息在其他語言中去www.medlab.co/translate

要阅读这些信息在其他语言中去www.medlab.co/translate

10. Производитель

Производство НаноЦелл™ D3:
Фактор Лабораториз Лтд., Канада

Поставщик в Австралии:
Медлаб Клиникал Лимитед™

Представительство Медлаб Клиникал Лимитед™:
66 МакКолей Стрит, Александрия, Новый Южный Уэльс, 2015
Тел. (бесплатно): 1300 369 570

Поставщик НаноЦелл™ D3
в Северной Америке:
ИнМедТенолоджиз™

Представительство ИнМедТенолоджиз™:
29883 Санта Маргарита Парквей, офис 400,
Ранчо Санта Маргарита, 29688, Калифорния,
США
Тел. (бесплатно): 1800 921 1710

Регистрационный номер в реестре лекарственных средств Австралии:
AUSTL 232096

Настоящая инструкция была подготовлена в ноябре 2014 г.
Последнее обновление: декабрь 2014 г.

МедЛаб Клиникал Лимитед™