

NanoCelle™ B12

contient de la vitamine B12 activée, la Methylcobalamine

Notice d'information

1. Que contient ce feuillet ?

Ce feuillet répond aux questions fréquentes concernant NanoCelle™ Activated B12.

Ce feuillet ne contient pas tous les renseignements disponibles sur votre médicament et ne remplace pas l'avis de votre professionnel de la santé.

Tout médicament présente des risques et des bénéfices. Votre médecin a évalué les risques et les bénéfices que peuvent vous apporter la consommation de NanoCelle™ Activated B12.

Si vous avez des inquiétudes concernant ce médicament, parlez-en à votre médecin.

Conservez ce dépliant avec votre médicament.

Il vous faudra peut-être le relire.

2. Pourquoi utilisé NanoCelle™ Activated B12 ?

NanoCelle™ Activated B12 est utilisé en cas de carence en vitamine B12. La vitamine B12 est une vitamine hydrosoluble retrouvée principalement dans les aliments d'origine animale tels que les viandes rouges, la volaille, les fruits de mer, le lait, les fromages et les œufs. Les végétariens, végétaliens, les personnes âgées ou les personnes présentant une faible absorption intestinale peuvent avoir besoin d'un apport supplémentaire en vitamine B12.

La vitamine B12 joue un rôle important dans plusieurs processus physiologiques :

- Voies de méthylation
- Synthèse d'ADN
- Production d'énergie mitochondriale
- Synthèse de myéline et ainsi le bon fonctionnement du système nerveux
- Conversion de l'homocystéine en méthionine
- Production des cellules sanguines

Votre professionnel de la santé vous a peut être prescrit NanoCelle™ Activated B12 pour d'autres raisons.

Si vous avez des questions concernant les raisons pour lesquelles vous ont été prescrites NanoCelle™ Activated B12, consultez votre professionnel de la santé.

Qu'est ce que la Methylcobalamine ?

la Methylcobalamine est la forme active biologique de la vitamine B12

NanoCelle™ Activated B12 n'est pas addictif.

3. Avant de prendre NanoCelle™ Activated B12

Les cas où vous ne devez pas en prendre

Ne pas prendre Activated NanoCelle™ B12 si :

1. Vous êtes allergique à NanoCelle™ Activated B12, à d'autres suppléments de vitamine B12, à la vitamine E, au cobalt, ou à tout autre ingrédient contenu dans NanoCelle™ D12 (listés en section 8).

2. L'emballage est endommagé.

3. La date expiration (EXP) inscrite sur la boîte est dépassée.

Si vous prenez ce médicament après la date d'expiration, il est possible qu'il ne fonctionne pas aussi bien que prévu.

Si vous n'êtes pas sûr de devoir commencer à prendre NanoCelle™ Activated B12, consultez votre professionnel de la santé.

3b) Avant de le prendre

Vous devez avertir votre docteur si :

1. Vous êtes allergiques à d'autres médicaments, aliments, préservateurs, colorants ou additifs.

NanoCelle™ Activated B12 contient du glycérol, de l'huile de menthe, de l'acide citrique, du sorbate de potassium, des glycosides de steviol, l'alpha-tocophérol, l'huile de soja et eau purifiée.

Si vous présentez une réaction allergique ou des effets secondaires suite à la consommation de NanoCelle™ Activated B12, interrompez le traitement et consultez votre professionnel de la santé.

2. Si vous êtes enceinte ou si vous envisagez une future grossesse.

3. Vous allaitez ou envisagez d'allaiter.

4. Vous avez ou avez eu des problèmes de santé qui incluent :

- Maladies du foie (cirrhose ou hépatite)
- Syndromes myéloprolifératifs (polyglobulie primitive ou leucémie myélocitaire chronique)

Si aucun des ces points n'ont été évoqués avec votre professionnel de la santé, veuillez lui en parler avant de prendre NanoCelle™ Activated B12.

3c) Vous prenez d'autres médicaments

Avertissez votre professionnel de la santé si vous prenez d'autres médicaments, y compris ceux sans prescription provenant de pharmacies, supermarchés ou magasins d'aliments diététiques.

Certains médicaments peuvent interférer avec NanoCelle™ B12, tels que :

- Colchicine
- Metformine
- H2-bloquant
- Inhibiteurs de la pompe à protons

NanoCelle™ Activated B12 peut affecter l'efficacité de ces médicaments. Vous pourriez avoir besoin de prendre une quantité différente de votre médicament, ou encore de changer de médicament. Dans ce cas, demandez conseil à votre médecin.

Votre professionnel de la santé pourra vous donner plus d'informations concernant les médicaments à éviter pendant votre traitement.

Consultez votre professionnel de la santé si vous avez le moindre doute concernant cette liste de médicaments.

4. Comment prendre NanoCelle™ Activated B12 ?

4a) Combien prendre

Suivre avec attention les instructions données par votre professionnel de la santé.

Prendre NanoCelle™ Activated B12 exactement comme vous l'a prescrit votre professionnel de la santé.

Ses recommandations peuvent être différentes de celles présentes dans ce feuillet.

4b) Combien devez vous prendre de NanoCelle™ Activated B12 ?

La dose pour un adulte est 300 µL (2 pulvérisations) par jour, pulvérisée dans la a l'interieur de la joue avant le repas.

Votre professionnel de la santé vous avisera de la dose de NanoCelle™ Activated B12 à prendre par jour.

Ceci dépend des conditions du traitement et des autres médicaments administrés.

Comment prendre NanoCelle™ B12

NanoCelle™ Activated B12 peut être directement pulvérisé au niveau des muqueuses buccales (intérieur des joues).

Consultez votre professionnel de la santé si vous avez des doutes.

Ne pas consommer NanoCelle™ Activated B12 si l'emballage est endommagé.

Quand prendre NanoCelle™ Activated B12

Avant le repas, sauf si indiqué autrement par votre professionnel de la santé.

Combien de temps prendre NanoCelle™ Activated B12 ?

Prendre NanoCelle™ Activated B12 aussi longtemps que prescrit par votre professionnel de la santé.

Si vous avez oublié de prendre NanoCelle™ Activated B12

Ne pas prendre une dose supplémentaire en cas d'oubli.

Ceci peut augmenter les chances d'apparition d'effets indésirables.

Si le temps est presque venu de prendre votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et prenez votre prochaine dose en suivant votre horaire et dosage régulier.

Si vous n'êtes pas sûr de la marche à suivre, vérifiez avec votre professionnel de la santé.

Si vous avez pris trop de NanoCelle™ Activated B12 (surdosage)

Consultez votre professionnel de la santé aussi vite que possible. Avisez-le sur le nombre de capsules de NanoCelle™ Activated B12 prises. Veuillez consulter votre professionnel de la santé même si vous ne présentez aucun signe d'empoisonnement ou de malaise.

5. Pendant que vous prenez NanoCelle™ Activated B12

5a) Ce que vous devez faire :

Si vous devenez enceinte pendant que vous prenez NanoCelle™ Activated B12, avertissez votre professionnel de la santé immédiatement.

Si vous débutez un nouveau traitement, avertissez votre professionnel de la santé que vous prenez NanoCelle™ Activated B12.

Si vous envisagez de subir une opération, y compris une chirurgie dentaire, avertissez votre professionnel de la santé que vous prenez NanoCelle™ Activated B12.

Toujours suivre attentivement les consignes d'un professionnel.

5b) Ce que vous ne devez pas faire :

Évitez tout contact avec les yeux, toute peau entaillée ou qui saigne.

Ne pas chauffer NanoCelle™ Activated B12 ou l'ajouter à de la nourriture chaude.

Ne pas exposer NanoCelle™ Activated B12 à des températures extrêmes pendant des périodes prolongées.

6. Effets secondaires

Tout médicament peut présenter des effets secondaires. Certaines fois, ces derniers peuvent être sérieux, la plupart du temps, ils ne le sont pas.

Demandez à votre professionnel de la santé de répondre à toute question que vous pourriez avoir.

NanoCelle™ Activated B12 présente de faibles risques de provoquer des effets secondaires si les instructions sont respectées. Les excès de vitamine B12 sont excrétés naturellement via les urines par l'organisme.

Si vous présentez l'un des symptômes décrits après la consommation de NanoCelle™ Activated B12, avertissez votre professionnel de la santé. Ces symptômes peuvent être une réaction allergique :

- Difficulté à respirer
- Enflure du visage ou de la gorge
- Éruption cutanée
- Démangeaisons

Avertissez immédiatement votre professionnel de la santé si vous présentez l'un de ces symptômes.

Pour toute question, consultez votre professionnel de la santé.

7. Après la prise de NanoCelle™ Activated B12

Conservation

Conservez NanoCelle™ Activated B12 dans sa bouteille jusqu'au moment de la prise. La conservation peut être compromise si liquide est conservé hors de sa bouteille.

Toujours conserver NanoCelle™ Activated B12 dans sa bouteille d'origine.

Conservez NanoCelle™ Activated B12 dans un endroit où la température reste inférieure à 25°C. Ne pas congeler ou réfrigérer ce produit.

Ne pas conserver NanoCelle™ Activated B12 dans la salle de bain ou proche d'un évier. Ne pas laisser NanoCelle™ Activated B12 dans la voiture ou proche des fenêtres.

La chaleur et l'humidité peuvent endommager le médicament.

Protégez NanoCelle™ Activated B12 de la lumière.

Gardez hors de la portée des enfants.

8. Description du produit

A quoi ressemble NanoCelle™ Activated B12

NanoCelle™ Activated B12 est une solution avec un goût de menthe. NanoCelle™ Activated B12 est emballé dans une bouteille en plastique de 30mL avec pulvérisateur.

Chaque bouteille est emballée dans une boîte en carton recyclable avec un sceau de sécurité.

Chaque bouteille de 30mL contient 100 doses (200 pulvérisations).

Ingrédients

Ingrédients actifs

Vitamine B12 (Methylcobalamine)...1000µg

Ingrédients inactifs

Huile végétale modifiée
Glycérol
Huile de menthe
Acide citrique
Sorbate de potassium
Glycosides de steviol
d-alpha tocophérol
Huile de soja
Eau purifiée

NanoCelle™ Activated B12 convient aux végétariens.

NanoCelle™ Activated B12 ne contient ni produits laitiers ni gluten.

9. Traduction

Pour lire cette information dans d'autres langues allez à www.medlab.co/translate

Para leer esta información en otros idiomas van a www.medlab.co/translate

Pour lire cette information dans d'autres langues allez à www.medlab.co/translate

لقرءاءة هذه المعلومات بلغات أخرى تذهب إلى www.medlab.co/translate

他の言語はwww.medlab.co/translateに行くには、この情報を読み取るには

Чтобы прочитатъ эту информацию в другие языки пойти www.medlab.co/translate

要閱讀這些信息在其他語言中去www.medlab.co/translate

要阅读这些信息在其他语言中去www.medlab.co/translate

10. Distributeurs

NanoCelle™ Activated B12 est produit au Canada par Factors Laboratories Ltd. Il est distribué en Australie par: Medlab Clinical Limited™ sous division de Medlab Clinical Limited™ 66 McCauley Street Alexandria NSW 2015 Sans frais: 1300 369 570

NanoCelle™ Activated B12 est distribué en Amérique du Nord par: InMed Technologies™ une sous division de InMed Technologies™ Suite 400, 29883 Santa Margarita Pkwy Rancho Santa Margarita CA 92688 Sans frais : 1800 921 1710

Australian Listing Number AUST L 262637

Ce feuillet a été préparé en octobre 2015 Dernière modification en novembre 2015

Medlab Clinical Limited™