

NRGBiotic™

ユビデカレノン、マグネシウムオロチン酸、細菌株が含まれています

消費者医療情報

1. リーフレットの内容

このリーフレットは、NRGBiotic™カプセルに関する一般的な質問の一部に答えるものです。

これには、すべての情報が含まれているわけではありません。また、これは担当医の話を代弁するものではありません。

すべての薬にはリスクと有効性があります。担当医はあなたが NRGBiotic™カプセルを服用することで発生する有効性とリスクを予測・比較しています。

この薬の服用について懸念がある場合は、担当医にお尋ねください。

このリーフレットは薬とともに保管してください。

読み返す必要があることがあります。

2. NRGBiotic™の服用目的

NRGBiotic™は複数菌株のプロバイオティクス製剤で、成分にユビデカレノン（コエンザイム Q10）とマグネシウムオロチン酸も含まれています。

NRGBiotic™は、最適なミトコンドリアのエネルギー産生と筋細胞の機能を促進するために服用されます。

NRGBiotic™の各カプセルには、マグネシウム 25mg と同等のオロチン酸マグネシウム 400mg が含まれています。オロチン酸は、ウリジンとピリミジンの生合成に関与する重要な分子で、DNA と RNA の代謝回転およびグリコーゲンおよびリン脂質の合成に関与する成分です。コエンザイム Q10 とマグネシウムは、細胞内のエネルギー産生に不可欠なものです。

プロバイオティクスは、全体的な健康体の維持を支援し、健全な免疫系をサポートします。

担当医は別の理由で NRGBiotic™を処方している可能性もあります。

NRGBiotic™が処方された理由について質問がある場合は、担当医へ尋ねてください。

NRGBiotic™には、中毒性はありません。

3. NRGBiotic™の服用前に

3a) 服用してはいけない場合

次の場合は NRGBiotic™を服用しないでください。

1. NRGBiotic™、コエンザイム Q10、オロチン酸マグネシウムまたはセクション 8b に記載されている成分にアレルギー反応があった。

2. 安全シールが破れていたりなくなっているなど、改ざんの兆候がある。

3. ボトルに記載の使用期限（EXP）を過ぎた。

使用期限を過ぎた薬を服用した場合、効果が得られない可能性もあります。

NRGBiotic™の服用を開始するべきかわからない場合は、担当医に相談してください。

NRGBiotic™を子どもに与えないでください。

NRGBiotic™の子どもの服用に関しては情報が限られています。

3b) 服用を開始する前に

次の場合は担当医に相談してください。

1. 他の医薬品、食品、防腐剤、染料または添加剤に対するアレルギーを持っている。

NRGBiotic™カプセルには、ステアリン酸マグネシウム、マルトデキストリン、および二酸化ケイ素が含まれています。

NRGBiotic™の服用後にアレルギー反応やその他の副作用が発生した場合は、使用を中止し、担当医に相談してください。

2. ワルファリンを服用している

3. 妊娠している、または妊娠する予定がある

4. 授乳中、または授乳する予定がある

5. 次の健康上の問題がある、またはあった。

- 腎不全などの腎臓の問題
- 高血圧または低血圧
- 不整脈
- 心ブロック
- 胃または腸の疾患
- 免疫不全（HIV/AIDS、癌の治療中）
- 短腸症候群

上記の中で担当医に伝えていないものがある場合は、NRGBiotic™の服用を始める前に伝えてください

3c) 他の医薬品の服用

他の医薬品を服用している場合は、担当医に伝えてください。薬局、スーパーマーケット、健康食品店から処方箋なしで入手できるものも含みます。

医薬品によっては NRGBiotic™を阻害する可能性があります。例えば、次のものが該当します。

- ワルファリン
- カルシウム拮抗剤
- 免疫抑制剤
- 抗生物質

これらの医薬品は、NRGBiotic™から影響を受けたり、または NRGBiotic™の作用に影響を与える可能性があります。医薬品の服用量を変えたり、服用する医薬品を変える必要があるかもしれません。担当医に従ってください。

NRGBiotic™の服用中に注意したり避けるべき医薬品については、担当医が多くの情報を持っています。

上記の医薬品についてよくわからない場合は、担当医に尋ねてください。

4. NRGBiotic™の服用方法

4a) 服用量

担当医からのすべての指示を注意深く守ってください。

担当医が処方した通りに NRGBiotic™を服用してください。

これは、このリーフレットに記載されている情報と異なる場合があります。

4b) NRGBiotic™の服用量

成人の場合、1 日 2 回まで、毎日食前に水で 2 カプセルを服用してください。

NRGBiotic™カプセルの 1 日の服用量については担当医にお尋ねください。これは、治療中の症状や他の医薬品を使用しているかどうかによって異なります。

4c) NRGBiotic™の服用方法

カプセルは、毎日食前に水とともに丸ごと飲み込んでください。

カプセルは割れたり、冷たい食品にくっつくことがあります。わからないことがある場合は、担当医に相談してください。

カプセルが破損した場合は服用しないでください。

4d) NRGBiotic™を服用するタイミング

食前。ただし、担当医から指示があった場合はそれに従ってください。

4e) NRGBiotic™の服用期間

担当医が処方する間 NRGBiotic™を服用してください。

4f) NRGBiotic™の服用を忘れた場合

服用できなかった分を補うために余分に服用しようとししないでください。

望ましくない副作用が起こる可能性を高めることがあります。

次の服用が近いときは服用できなかった分は飛ばしてください。時間が来たら次の服用分のみを服用します。

どうすればいいかわからない場合は、担当医に確認してください。

4g) NRGBiotic™を服用し過ぎてしまった場合（過剰摂取）

直ちに担当医を訪ねてください。
NRGBiotic™を服用した量を担当医に伝え、それに基づく担当医の指示に従ってください。
不快感や中毒の兆候がない場合でも、担当医を訪ねてください。

5. NRGBiotic™の服用中

5a) 次のことを必ず行ってください。

NRGBiotic™服用中に妊娠した場合は、すぐに担当医に伝えてください。

新しい医薬品の服用を始める場合は、NRGBiotic™を服用していることを担当医に伝えてください。

手術（歯科手術を含む）を受ける予定がある場合は、NRGBiotic™を服用していることを担当医に伝えてください。

必ず担当医の指示を注意深く守ってください。

5b) 次のことは絶対に行わないでください。

NRGBiotic™を加熱したり、熱い食品に投入しないでください。

極端に暑い場所に NRGBiotic™を長時間放置しないでください。

5c) 留意事項

NRGBiotic™にはプロバイオティクス菌株が含まれています。プロバイオティクスと一緒に抗生物質を服用すると、その有効性が減少する可能性があります。この作用を避けるために、抗生物質と NRGBiotic™を服用する場合は間に2時間以上空けてください。

これについては担当医に相談してください。

6. 副作用

すべての医薬品には副作用を起こす可能性があります。重大な副作用もありますが、起こることはまれです。

発生する可能性のある副作用を次に列挙しますが、恐れる必要はありません。いずれも発生しない可能性もあります。

疑問がある場合は、担当医に尋ねてください。

次の症状のいずれかが発生し、懸念される場合は担当医に伝えてください。

- 腹部のけいれんや痛み
- 便秘
- 下痢
- 便中の粘液
- 腹部の腫れや肥大化
- おなら
- 腹上部の不快感

通常これらの副作用は軽度で服用量に関連します。NRGBiotic™の服用量を減らしたり服用を止めると、ほとんどの症状は数日後に完全になくなります。

NRGBiotic™の成分に対して深刻なアレルギー反応が起こることはまれですが、次のいずれかが発生した場合は、すぐに担当医に伝えてください。

- 皮膚発疹
- 顔や喉の腫れ
- 呼吸困難
- 皮膚のかゆみ

7. NRGBiotic™の服用後

7a) 保管

NRGBiotic™は服用時までボトルの中に保管しておいてください。カプセルをボトルの外に出しておく、品質が劣化する恐れがあります。

NRGBiotic™は必ず元の容器内のみ保管してください。

NRGBiotic™は冷蔵保管してください。NRGBiotic™やその他の医薬品を浴室や流し台の近くに保管しないでください。車内や窓枠の上に放置しないでください。

熱と湿気により薬が破損する恐れがあります。

NRGBiotic™を日光に当てないでください。

8. 製品の説明

8a) NRGBiotic™の外観

NRGBiotic™は、ハードクリアカプセルです。NRGBiotic™は、不正開封防止シールが貼られたリサイクル可能なプラスチックボトルに詰められています。ボトルごとに、カプセルが60個含まれています。

8b) 成分

カプセル当たり有効成分

ラクトバチルス・アシドフィルス (Med 27)
...25 億
ビフィドバクテリウム・ビフィドゥム (Med 11)10 億
ストレプトコッカス・サーモフィラス (Med 51)15 億
オロチン酸マグネシウム.....
400mg
相当するマグネシウム.....25.5mg
コエンザイム Q10 (ユビデカレノン)
...37.5mg

非活性成分

ポテトマルトデキストリン
ステアリン酸マグネシウム
シリカ

カプセルシェルには次が含まれています
野菜ヒドロキシプロピルメチルセルロース

NRGBiotic™は、菜食主義者に適しています

NRGBiotic™には、乳製品とグルテンが含まれていません

NRGBiotic™はコーシャ認定です

NRGBiotic™はハラール認定です

NRGBiotic™特許（番号）

9. 翻訳

この情報を他の言語で読むには、次にアクセスしてください www.medlab.co/translate

10. 製造者

NRGBiotic™のオーストラリアの供給元は次の通りです。
Medlab Clinical Limited™の担当部署
66 McCauley Street
Alexandria NSW 2015
フリーダイヤル：1300 369 570

NRGBiotic™の北米の供給元は次の通りです。
InMed Technologies™の担当部署
Suite 400, 29883 Santa Margarita Pkwy
Rancho Santa Margarita CA 92688
フリーダイヤル：1800 921 1710

オーストラリアのリスティング番号
AUST L 227515
このリーフレットは、2014 年 9 月に作成されました
最終更新 2014 年 9 月
Medlab Clinical Limited™