

NanoCelle™ 维生素 D3+K2 (纳米 D3+K2)

含纳米维生素 D3 和 K2

说明书

1. 这本小册子包含什么内容

本小册子回答了关于 NanoCelle™ 维生素 D3+K2 的一些常见问题。

这本小册子并非包含所有信息，您应该向您的医疗保健专业人士具体咨询。

所有药物都有益处和风险。对于您服用 NanoCelle™ 维生素 D3+K2 的预期效果，您的医生已权衡其潜在风险。

如果您对服用此药有任何疑问，请咨询您的医疗保健专业人士。

请将此小册子和药物放在一起。

您可能需要再读一遍。

2. NanoCelle™ 维生素 D3+K2 的用途

NanoCelle™ 维生素 D3 + K2 可用来协助维生素 D 缺乏的管理。维生素 D3 和 K2 在促进健康的骨代谢和矿化，骨密度方面起着重要作用。维生素 D3 有助于健康的免疫功能而维生素 K2 是健康的血液凝结途径所必须的。

您的医疗保健专业人士可能会由于其他的原因而建议您服用 NanoCelle™ 维生素 D3+K2。

如果您对建议您服用 NanoCelle™ 维生素 D3+K2 有任何疑问请咨询您的医疗保健专业人士。
88
服用 NanoCelle™ 维生素 D3+K2 不会上瘾。

3. 在您服用 NanoCelle™ 维生素之前

3a) 什么时候您不能服用

以下情况您不能服用：

1. 您对 NanoCelle™ 维生素 D3+K2, 胆钙化醇或 NanoCelle™ 维生素 D3+K2 含有的任何其他成分 (列于本小册子的 8b) 过敏。

2. 安全封口已损坏或丢失，或有篡改的痕迹。

3. 已超过包装瓶上所印的有效期。如果已过期返回到您的药剂师进行处置。

如果您服用已过有效期的药物，可能达不到原有的效果。

如果您不确定是否应该开始服用 NanoCelle™ 维生素 D3+K2 请与您的医疗保健专业人士联系。

3b) 在您服用之前

您需要告诉您的医生以下情况：

1. 您是否对哪些药物，食物，防腐剂，染料或添加剂过敏。

如果您在服用 NanoCelle™ 维生素 D3 后产生任何过敏反应或其他副作用，你应该停止服用，并咨询您的医疗保健专业人士。

2. 您是孕妇或正计划怀孕。

3. 您正在哺乳或打算母乳喂养。

4. 您有或曾经有过其他任何健康问题例如：

- 高钙血症
- 维生素 D 过多症
- 血栓形成 (高凝状态)
- 出血性疾病 (血友病，血管性血友病疾病)
- 吸收不良综合征
- 肾病
- 肝病

如果您还没有向您的医疗保健专业人士提及上述任何情况，请在您开始服用 NanoCelle™ 维生素 D3+K2 前告知他们。

3c) 正服用其他药物

如果您正在服用任何其他药物，包括任何从药房，超市或保健品商店买的药物，请告知您的医疗保健专业人士。

抗凝血药物与维生素 K 相互作用。维生素 K 有帮助机体凝血的作用。华法林 (香豆素) 是用来减慢血液凝固。通过帮助血液凝固，维生素 K 可能会降低华法林 (香豆素) 的药效。

告诉您的医疗专业人士，如果您正在服用以下任何药物：

- 华法林 (香豆素)

您的医生或药剂师会给您建议。

如果你不确定以上药物信息，请咨询您的医疗保健专业人士。

4. 如何服用 NanoCelle™ 维生素 D3+K2

4a) 用量

遵照您的医疗保健专业人士的指示用药。

用药的剂量严格遵照您的医疗保健专业人士的指示。

医疗保健专业人士指定的药量可能与本手册所建议的不同。

4b) 应该服用多少 NanoCelle™ 维生素 D3+K2

成人剂量为 300 微升一天 (喷 2 次)，饭前喷于口腔颊膜 (内颊)。

您的医疗保健专业人士会告诉您 NanoCelle™ 维生素 D3+K2 的每日用量。这取决于您所治疗的病症，以及是否正在使用任何其它药物。

4c) 如何服用 NanoCelle™ 维生素 D3+K2

直接喷于口腔颊膜 (内颊)。

如果您不能确定如何服用请向您的保健医生咨询。

4d) 何时服用 NanoCelle™ 维生素 D3+K2

饭前，除非您的保健医生建议其他时间。

4e) NanoCelle™ 维生素 D3+K2 需服用多久

遵照您的保健医生的指示完成疗程。

4f) 如果您忘记服用 NanoCelle™ 维生素 D3+K2

不要服用额外的剂量以弥补错过的剂量。

这可能会增加产生非预期副作用的可能性。

如果已接近下次剂量的时间，直接跳过你错过的剂量，服用下一个您应该服用的剂量。

如果您不确定该怎么做，请咨询您的医疗保健专业人士。

4g) 如果您服用过量 NanoCelle™ 维生素 D3+K2

尽快寻求您的医疗保健专业人士的帮助。告诉他们您何时服用，服用了多少 NanoCelle™ 维生素 D3+K2，这样他们可以决定采取什么方式来保障您的健康。即使没有任何不适或中毒的迹象，依然需要咨询您的医疗保健专业人士。

5. 当您服用 NanoCelle™ 维生素 D3+K2 时

5a) 您必须做的事情：

如果您在服用 NanoCelle™ 维生素 D3+K2 时怀孕，请立刻告知您的医疗保健专业人士。

如果您即将开始服用一种新药，告诉您的医疗保健专业人士您正在服用 NanoCelle™ 维生素 D3+K2。

如果您计划进行手术，包括牙科手术，告诉您的医疗保健专业人士您正在服用 NanoCelle™ 维生素 D3+K2。

务必仔细阅读您的医疗保健专业人士的指示。

5b) 您不能做的事情：

不要将 NanoCelle™ 维生素 D3+K2 喷入眼睛。
不要将 NanoCelle™ 维生素 D3+K2 喷到皮肤上的伤口或出血处。

不可加热 NanoCelle™ 维生素 D3+K2。

你应该向您的医疗保健专业人士进行咨询。

5c) 您需要注意的事情：

NanoCelle™ D3 + K2 含有维生素 D3，一种脂溶性维生素。一些减肥药物可结合维生素 D3 和使治疗失败。维生素 K 是一种脂溶性维生素，在促进血液凝固，防止出血过多方面有重要作用。如果你正在服用抗凝血药物，您应该与医疗专业人士讨论这个问题。

6. 副作用

任何药物都可能会产生副作用。有时候很严重，但大多数时候并不会产生严重副作用。

如果你在服用 NanoCelle™ 维生素 D3+K2 后出现以下任何症状，告知您的医疗保健专业人士。这些症状可能是由过敏引起的：

- 呼吸困难
- 面部和喉咙肿胀
- 皮疹
- 瘙痒

如果您有任何疑问，请咨询您的医疗保健专业人士。

7. 服用完 NanoCelle™ 维生素 D3+K2

7a) 储藏

将 NanoCelle™ 维生素 D3+K2 保存于原瓶中直到需要服用。从瓶中取出可能不易保存。

将 NanoCelle™ 维生素 D3+K2 保存在 25°C 以下的阴凉，干燥的地方。不要冷藏或冷冻的产品。

不要将 NanoCelle™ 维生素 D3+K2 或其他药物存放在浴室或近水槽处。

不要将 NanoCelle™ 维生素 D3+K2 留着车中或放在窗台上。

将 NanoCelle™ 维生素 D3+K2 存放在儿童接触不到的地方。

8. 产品说明

8a) 外观

NanoCelle™ 维生素 D3+K2 为薄荷味透明液体乳剂。NanoCelle™ 维生素 D3+K2 包装于 30 毫升的带塑料盖的塑料喷雾瓶中。

每个瓶子包装于带安全封口的可回收纸盒内。

每瓶（300 毫升）含 100 个剂量（200 次喷雾）。

8b) 成分

有效成分

维生素 D3（以胆钙化醇形式存在）

维生素 K2（以甲萘醌-7 形式存在）

其他成分

改良植物油

甘油

薄荷油

柠檬酸

山梨酸钾

甜菊糖甙

纯净水

NanoCelle™ 维生素 D3+K2 是素食的

NanoCelle™ 维生素 D3+K2 不含有乳制品成分和麸质。

9. 翻译

参看其他语言请访问

www.medlab.co/translate

10. 生产商

Medlab Clinical Limited™

地址：66 McCauley Street

Alexandria NSW 2015

免费电话：1300 369 570

澳大利亚注册编号：AUST L 273824

这本小册子完成于 2016 年 4 月

最后更新于 2016 年 4 月