

NanoCelle™Activated B12

活性型ビタミン B12(メチルコバラミン)が含まれています

消費者医薬品情報

1. 本説明書の記載内容

本説明書では、NanoCelle™Activated B12 に関するいくつかの一般的な質問に答えます。

すべての情報が記載されているわけではありません。また、医師や薬剤師のアドバイスに取って代わるものではありません。

すべての薬やサプリメントはリスクと利点を持っています。医師は NanoCelle™Activated B12 の有益性に対するリスクについて重点を置いて見えています。

この薬を服用についてご不明な点がある場合は、医師や薬剤師にご相談下さい。

この説明書は、本剤と一緒に保管して下さい。

改めて読み返さなければならないことがあるかもしれません。

2. NanoCelle™Activated B12 は何のために服用されるのでしょうか

NanoCelle™Activated B12 は、食餌ビタミン B12 欠乏を防ぐために使用されます。ビタミン B12 は、鶏肉、魚介類、牛乳、チーズ、卵に多く含まれる水溶性ビタミンです。特に 菜食主義者、ビーガン、高齢者や腸管吸収に障害がある方は、ビタミン B12 の補充が必要な場合があります。

ビタミン B12 は、次の重要な役割を果たしています：

- メチル化経路
- DNA 合成
- ミトコンドリアのエネルギー生産
- ミエリンと健康的なミエリン/神経機能の合成
- ホモシステインのメチオニンへの変換
- 赤血球生成

医師や薬剤師は、別の理由で NanoCelle™Activated B12 を処方する場合があります。

処方された NanoCelle™Activated B12 について質問や不明な点があれば、医師や薬剤師にご相談下さい。

メチルコバラミンとは何か？

メチルコバラミンは、ビタミン B12 が生物学的に活性化されたものです。

NanoCelle™Activated B12 に中毒性はありません。

3. 服用前

3a) 禁忌

次の場合には NanoCelle™Activated B12 を服用しないでください：

1. これまでに NanoCelle™Activated B12、他のビタミン B12 サプリメント、ビタミン E、または 8b で挙げられている含有成分によってアレルギー反応を起こしたことのある方。

2. パッケージが破れていたり改ざんされている場合

3. 消費期限が切れている場合。消費期限が切れているものは、薬剤師に持って行き、処分してもらってください。

消費期限が過ぎた後に本剤を服用すると、効果が発現しない場合があります。

NanoCelle™Activated B12 を服用すべきか分からない場合は、医師や薬剤師にご相談下さい。

3b) 服用前の注意点

以下に当てはまる場合には医師にご相談下さい：

1. 他の医薬品、食品、防腐剤、染料または添加剤にアレルギーがある場合。

NanoCelle™Activated B12 には、グリセロール、ペパーミントオイル、クエン酸、ソルビン酸カリウム、ステビオール配糖体、D-α-トコフェロール、大豆油および精製水が含まれています。

NanoCelle™Activated B12 服用後に何らかのアレルギー反応や副作用が現れた場合にはただちに服用を中止し、いしや薬剤師にご相談下さい。

2. 妊娠中、または妊娠を予定されている場合

3. 授乳中、または授乳を予定されている場合

4. 現在、または過去に次の健康上の問題がある場合：

- 肝疾患（肝硬変や肝炎）
- 骨髄増殖性疾患（多血ベラと慢性骨髄性白血病）

上記について、医師や薬剤師に伝えていない場合は、NanoCelle™Activated B12 を服用する前にその旨をお伝え下さい。

3c) 他剤との併用

自然療法医やスーパーマーケット、または健康食品店からの処方箋なしで購入できる他剤を服用している場合には、本剤服用前に医師や薬剤師にご相談下さい。

次のいずれかを服用している場合には、必ず医師や薬剤師にその旨を伝えて下さい：

- クロラムフェニコール
- メトホルミン
- H2 ブロッカー
- プロトンポンプ阻害剤

他剤との併用によって、効果が出現しない場合があります。現在服用している薬を増量したり、薬の変更の必要が出てくるかもしれません。医師の指示に従ってください。

医師や薬剤師は、NanoCelle™Activated B12 服用中の他剤との併用に関する十分な知識を持っています。

上記の薬について分からないものがあれば、医師や薬剤師にお尋ね下さい。

4. 服用方法

4a) 服用量

必ず医師や薬剤師の指示に従ってください。

NanoCelle™Activated B12 は、医師や薬剤師が処方した通りに服用して下さい。

医師や薬剤師の指示は、本説明書の記載内容と異なる場合もあります。

4b) 服用量

成人の用量は、食前に頬の内側に 300 µL（2 スプレー）します。

医師や薬剤師が、1 日の服用量を指示してくれます。現在の健康状態や他剤の服薬量によって、1 日の服用量が変わってきます。

4c) 服用方法

NanoCelle™ Activated B12 を頬の内側に噴霧します。

不明な場合は、医師に相談して下さい。

4d) 服用のタイミング

食前または医師や薬剤師の指示通りに服用して下さい。

4e) 服用期間

本剤が処方されている間は、服用を続けて下さい。

4f) 服用を忘れてしまった場合

次の服用時に、前回忘れた分を追加して服用しないで下さい。

副作用が生じる場合があります。

次の服用時間が近ければ、前回忘れた分は追加せず、規定通りに服用して下さい。

どうしてよいか分からない場合は、医師や薬剤師にお尋ね下さい。

4g) 大量に服用してしまった場合（過剰摂取）

できるだけ早く医師や薬剤師の診察を受けて下さい。どのくらいの量 NanoCelle™ Activated B12 を服用してしまったかについて正確に伝えることで、適切な処置をしてもらえます。不快な兆候がある場合は、医師や薬剤師にご相談下さい。

5. 服用期間中

5a) 必ず守ること:

服用中に妊娠した場合は、医師や薬剤師にただちにその旨を伝えて下さい。

新しい薬の服用を始める場合には、医師や薬剤師に NanoCelle™ Activated B12 を服用している旨を伝えて下さい。

歯科手術を含むいかなる手術を受ける場合にも、医師や薬剤師に NanoCelle™ Activated B12 を服用している旨を伝えて下さい。

常に慎重に医師や薬剤師の指示に従って下さい。

5b) してはならない事

NanoCelle™ Activated B12 を目に噴霧しないで下さい。切り傷または出血している皮膚に、NanoCelle™ Activated B12 を噴霧しないで下さい。

長時間高温の場所で保管しないで下さい。

何かあれば医師や薬剤師に相談して下さい。

6. 副作用

すべての薬剤には、副作用がある可能性があります。深刻な副作用もあれば、そうでないものもあります。

含有成分による深刻なアレルギー反応はまれです。但し、次のような症状が現れた場合には、ただちに医師や薬剤師にご相談下さい:

- 皮膚の発疹
- 顔および/または喉の腫れ
- 呼吸困難
- 皮膚のかゆみ

7. 服用後

7a) 保管方法

服用時間になるまで、元の容器に保管しておいて下さい。ボトルから出してしまうと、十分な効果が得られない場合があります。

使用後は必ず元の容器に戻して下さい。25℃以下で保管して下さい。冷蔵での保存が望ましいです。凍らせしないで下さい。

浴室内やシンクの近く、または他の薬と一緒に保管しないで下さい。車の中や窓辺に放置しないで下さい。

子どもの手の届かないところに保管してください。

8. 製品説明

8a) NanoCelle™ Activated B12 の形状

NanoCelle™ Activated B12™は、ペパーミント風味の液体エマルジョンです。NanoCelle™ Activated B12 は、30ml のプラスチックスプレーボトルで、透明なプラスチック製のキャップが付いています。

各ボトルは、安全シールとリサイクル可能な段ボール箱に梱包されています。

各 30ml のスプレーボトルには、100 回分（200 スプレー）が入っています。

8b) 含有成分

有効成分

ビタミン B12（メチルコバラミン）
.....1000µg

非活性成分

変性植物油
グリセロール
ペパーミントオイル
クエン酸
ソルビン酸カリウム
ステビオール配糖体
D-α-トコフェロール
大豆油
精製水

NanoCelle™ Activated B12 は菜食主義者に適しています

NanoCelle™ Activated B12 は、乳製品とグルテンフリーです

9. 翻訳

他の言語での説明は、次のサイトをご参照下さい。 www.medlab.co/translate

Para leer esta información en otros idiomas van a www.medlab.co/translate

Pour lire cette information dans d'autres langues allez à www.medlab.co/translate

www.medlab.co/translate
www.medlab.co/translate

他の言語での説明は、
www.medlab.co/translate にアクセスして下さい。

Чтобы прочитать эту информацию в других языках перейти www.medlab.co/translate

要閱讀這些信息在其他語言中去
www.medlab.co/translate

要阅读这些信息在其他语言中去
www.medlab.co/translate

10. メーカー

NanoCelle™ Activated B12 は、オーストラリアの次の会社によって供給されています:

Medlab Clinical Limited™
66 McCauley Street McCauley Street
Alexandria NSW 2015
フリーダイヤル: 1300 369 570

NanoCelle™ Activated B12 は、北米では次の会社によって供給されています:
InMed Technologies™
Suite 400, 29883 Santa Margarita Pkwy
Rancho Santa Margarita CA 92688
フリーダイヤル: 1800 921 1710

オーストラリアのリスティングナンバー
AUST L 262637
この説明書は、2015 年 10 月に作成されました。
最終更新 2015 年 11 月

Medlab Clinical Limited™