Fixed held-out pair: complete unrepaired answer pages

a Complete question inputs

Question 1

资料：四线天竺鲷（学名：），为辐鳍鱼纲鲈形目鲈亚目天竺鲷科天竺鲷属的一种。本鱼分布于印度西太平洋区，包括马达加斯加、留尼旺、塞席尔群岛、斯里兰卡、台湾、泰国、越南、印度、日本、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾以及中国南海及东海、澳洲、斐济等海域。该物种的模式产地在印度Pondicherry。水深0至80公尺。本鱼体延长而侧扁，眼大，口大略下位。鱼体黄褐色，腹部银白色，体侧具4条深色细纵带，其中一条从吻部穿过眼睛延伸至尾鳍底。背鳍硬棘8枚；背鳍软条9枚；臀鳍硬棘2枚；臀鳍软条8枚，体长可达13公分。本鱼栖息于珊瑚礁或岩礁区，白天躲藏于岩架下或岩洞中，夜间出来觅食。繁殖期时，雄鱼具有口孵习性，卵约7日化成仔鱼，由雄鱼吐出，具短暂的仔鱼飘浮期。不具经济价值。
问题：四线天竺鲷一般分布在什么地方？
回答：

Question 2

资料：四线天竺鲷（学名：），为辐鳍鱼纲鲈形目鲈亚目天竺鲷科天竺鲷属的一种。本鱼分布于印度西太平洋区，包括马达加斯加、留尼旺、塞席尔群岛、斯里兰卡、台湾、泰国、越南、印度、日本、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾以及中国南海及东海、澳洲、斐济等海域。该物种的模式产地在印度Pondicherry。水深0至80公尺。本鱼体延长而侧扁，眼大，口大略下位。鱼体黄褐色，腹部银白色，体侧具4条深色细纵带，其中一条从吻部穿过眼睛延伸至尾鳍底。背鳍硬棘8枚；背鳍软条9枚；臀鳍硬棘2枚；臀鳍软条8枚，体长可达13公分。本鱼栖息于珊瑚礁或岩礁区，白天躲藏于岩架下或岩洞中，夜间出来觅食。繁殖期时，雄鱼具有口孵习性，卵约7日化成仔鱼，由雄鱼吐出，具短暂的仔鱼飘浮期。不具经济价值。
问题：四线天竺鲷的模式产地是哪里？
回答：

b Original answer pages

Q1 reference (whitespace cropped)

印度西太平洋区

Q2 reference (whitespace cropped)

印度Pondicherry


Initial

Final

Initial

Final

Normal



Q1: source question inset (display only)

问题：四线天竺鲷一般分布在什么地方？
回答：

Question erased



Q2: source question inset (display only)

问题：四线天竺鲷的模式产地是哪里？
回答：

Passage erased



First registered held-out pair, not selected by appearance. All 12 model pages are complete; only input/question and reference display insets are cropped.