

Zbierka úloh z kombinatorickej analýzy (1)

(upravené 3. júna 2012 o 18:05)

Časť 0. Úvod

V zbierke sú použité nasledovné symboly:

\mathbb{N}	množina prirodzených čísel $\{1, 2, 3 \dots\}$
\mathbb{N}_0	množina prirodzených čísel s nulou $\{0, 1, 2, \dots\}$
\mathbb{Z}	množina celých čísel $\{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots\}$
$\lg x$	dvojkový logaritmus x
$/\dots/$	substitúcia, poznámka vysvetľujúca úpravu

Časť 1. Example

Príklad 1.1. Vypočítajte sumu $\sum_{k=0}^n k$.

Riešenie: (*autor*)

$$\sum_{k=0}^n k = \sum_{k=0}^n (n - k) = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Príklad 1.2. ďalší príklad

Riešenie: (*iny autor*) ďalšie riešenie

Časť 2. Celé časti

Príklad 2.1. Vypočítajte: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k+1} \left\lfloor \frac{k}{2} \right\rfloor$.

Príklad 2.2. Majme postupnosť $\{1, 2, 2, 3, 3, 3, \dots, n-1, \underbrace{n, \dots, n}_{n\text{-krát}}, n+1, \dots\} = \{a_n\}_{n \geq 1}$. Dokážte, že

$$a_n = \left\lfloor \sqrt{2n} + \frac{1}{2} \right\rfloor.$$

Príklad 2.3. Určte všetky $n \in \mathbb{N}_0$, pre ktoré neplatí vzťah $\lfloor \sqrt{n} \rfloor + \lfloor \sqrt{n+1} \rfloor = \lfloor \sqrt{4n+2} \rfloor$.

Príklad 2.4. Pre $x \in \mathbb{R}$ riešte rovnicu $\lfloor x \rfloor^2 = \lceil x \rceil^2$.

Príklad 2.5. Pre $x \in \mathbb{R}$ riešte rovnicu $\lceil \frac{1}{2} \lceil x \rceil \rceil = \lfloor x \rfloor$.

Príklad 2.6. Dokážte: $\forall x, y \in \mathbb{R} : \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + \lfloor x+y \rfloor \leq \lfloor 2x \rfloor + \lfloor 2y \rfloor$.

Príklad 2.7. Pre ktoré $x \geq 3, x \in \mathbb{R}$ platí $\lceil \log_3(x-1) \rceil \neq \lceil \log_3 \lfloor x \rfloor \rceil$?

Príklad 2.8. Charakterizujte dvojice $x, y \in (0, 1) : \lfloor x + \frac{2}{3} \rfloor + \lfloor y + \frac{1}{3} \rfloor + \lfloor x+y \rfloor > 3 \lfloor x+y + \frac{1}{3} \rfloor$.

Príklad 2.9. Vypočítajte: $\sum_{k=1}^n \lfloor \lg k \rfloor$.

Príklad 2.10. Vypočítajte: $\sum_{k=1}^{3n+2} \left\lfloor \frac{k+1}{3} \right\rfloor \left\lceil \frac{k}{3} \right\rceil$.

Príklad 2.11. Vypočítajte: $\sum_{k=1}^n \left\lfloor \lg \sqrt{4k} \right\rfloor$.

Príklad 2.12. Vypočítajte: $\sum_{k=1}^{2nm} k^2 (-1)^{\lfloor \frac{k}{m} \rfloor}, n, m \in \mathbb{N}, m \geq 2$.

Časť 3. Binomické koeficienty

Príklad 3.1. Vypočítajte: $\sum_{k \geq 0} \binom{n}{k} \frac{k!}{(n+1+k)!}$, $n \in \mathbb{N}_0$.

Riešenie: (Stanek)

$$\begin{aligned} \sum_{k \geq 0} \binom{n}{k} \frac{k!}{(n+1+k)!} &= \sum_{k \geq 0} \frac{n!}{k! (n-k)!} \frac{k!}{(n+1+k)!} = \sum_{k \geq 0} \frac{n!}{(n-k)! (n+1+k)!} = \\ &= \sum_{k \geq 0} \frac{n!}{(n-k)! (n+1+k)!} \frac{(2n+1)!}{(2n+1)!} = \frac{n!}{(2n+1)!} \sum_{k \geq 0} \binom{2n+1}{n-k} = \\ &= \frac{n!}{(2n+1)!} \sum_{k=0}^n \binom{2n+1}{k} = \frac{n!}{(2n+1)!} \left(\frac{1}{2} 2^{2n+1} \right) = \frac{n!}{(2n+1)!} 2^{2n} \end{aligned}$$

Príklad 3.2. Vypočítajte: $\sum_{k \leq n} \binom{n}{k} 2^{k-n}$, $n \in \mathbb{Z}$.

Riešenie: (Laco) Ak $n < 0$, potom aj $k < 0$ a všetky kombinačné čísla sú nulové, takže aj výsledná suma je nulová. Ak $n = 0$, tak jedine pre $k = 0$ obsahuje suma nenulový člen a je rovná 1. Ak $n > 0$, môžeme použiť binomickú vetu:

$$\sum_{k \leq n} \binom{n}{k} 2^{k-n} = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^k = \frac{1}{2^n} (1+2)^n = \left(\frac{3}{2} \right)^n.$$

Príklad 3.3. Vypočítajte: $\sum_{k \geq n} \binom{k}{n} 2^{n-k}$, $n \in \mathbb{Z}$.

Riešenie: (Stanek) Ak $n < 0$, dolný index v každom kombinačnom čísle je záporný a teda hodnota celej sumy je nula. Ďalej budeme predpokladať, že $n \geq 0$.

$$\begin{aligned} \sum_{k \geq n} \binom{k}{n} 2^{n-k} &= \sum_{n \leq k} \binom{k-n-k-1}{k-n} (-1)^{k-n} 2^{n-k} = \sum_{n \leq k} \binom{-n-1}{k-n} (-2)^{n-k} = \\ &= \left/ \begin{matrix} l = k-n \\ k = n+l \end{matrix} \right/ = \sum_{n \leq n+l} \binom{-n-1}{l+n-n} (-2)^{n-l-n} = \sum_{0 \leq l} \binom{-n-1}{l} (-2)^{-l} = \\ &= \sum_{0 \leq l} \binom{-n-1}{l} \left(-\frac{1}{2} \right)^l = \left(1 - \frac{1}{2} \right)^{-n-1} = 2^{n+1} \end{aligned}$$

Príklad 3.4. Vypočítajte: $\sum_k \binom{-\frac{1}{2}}{k} \left(\frac{1}{2} \right)^k k$.

Riešenie: (Laco)

$$\begin{aligned} \sum_k \binom{-\frac{1}{2}}{k} \left(\frac{1}{2} \right)^k k &= \sum_k \frac{-\frac{1}{2}}{k} \binom{-\frac{3}{2}}{k-1} \left(\frac{1}{2} \right)^k k = -\frac{1}{4} \sum_k \binom{-\frac{3}{2}}{k-1} \left(\frac{1}{2} \right)^{k-1} = \\ &= -\frac{1}{4} \sum_{k=1} \binom{-\frac{3}{2}}{k-1} \left(\frac{1}{2} \right)^{k-1} = -\frac{1}{4} \left(1 + \frac{1}{2} \right)^{-\frac{3}{2}} = -\frac{1}{6} \sqrt{\frac{2}{3}} \end{aligned}$$

Príklad 3.5. Vypočítajte: $\sum_{l \geq 2} (-1)^l \binom{\lfloor e^m \rfloor}{m-l}$, $m \in \mathbb{Z}$.

Riešenie: (Laco) Aby v sume bol aspoň jeden dolný index v $\binom{\lfloor e^m \rfloor}{m-l}$ nezáporný, tak $m \geq 2$, inak je hodnota sumy 0. Pre dané $m \geq 2$ označme $\lfloor e^m \rfloor = c$, pričom vieme, že $c \geq \lfloor e^2 \rfloor \geq \lfloor 2^2 \rfloor \geq 4$. Zároveň v sume nám stačí uvažovať iba $m-l \geq 0$, teda $2 \leq l \leq m$.

$$\begin{aligned} \sum_{l=2}^m (-1)^l \binom{c}{m-l} &= \left/ k = m-l \right/ = \sum_{k=0}^{m-2} (-1)^{m-k} \binom{c}{k} = (-1)^m \sum_{k=0}^{m-2} (-1)^k \left(\binom{c-1}{k-1} + \binom{c-1}{k} \right) = \\ &= (-1)^m \left[\binom{c-1}{-1} + \binom{c-1}{0} - \binom{c-1}{0} - \dots + (-1)^{m-2} \left(\binom{c-1}{m-3} + \binom{c-1}{m-2} \right) \right] = \\ &= (-1)^{2m-2} \binom{c-1}{m-2} = \binom{\lfloor e^m \rfloor - 1}{m-2} \end{aligned}$$

Príklad 3.6. Vypočítajte: $\sum_{k=0}^{2n} \binom{n}{k} \frac{1}{k+2}$, $n \in \mathbb{N}_0$.

Riešenie: (Stanek)

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=0}^{2n} \binom{n}{k} \frac{1}{k+2} &= \sum_{k=0}^{2n} \binom{n}{k} \frac{1}{k+2} \frac{(k+1)(n+1)(n+2)}{(n+1)(n+2)} = \frac{1}{(n+1)(n+2)} \sum_{k=0}^{2n} \binom{n+2}{k+2} (k+1) = \\
 &= \frac{1}{(n+1)(n+2)} \left(\sum_{k=0}^{2n} \binom{n+2}{k+2} (k+2) - \sum_{k=0}^{2n} \binom{n+2}{k+2} \right) = \\
 &= \frac{1}{(n+1)(n+2)} \left((n+2) \sum_{k=0}^{2n} \binom{n+1}{k+1} - \sum_{k=0}^{2n} \binom{n+2}{k+2} \right) = \\
 &= \frac{1}{(n+1)(n+2)} \left((n+2) \sum_{k=1}^{2n+1} \binom{n+1}{k} - \sum_{k=2}^{2n+2} \binom{n+2}{k} \right) = \\
 &= \frac{1}{(n+1)(n+2)} \left((n+2) \left(2^{n+1} - \binom{n+1}{0} \right) - \left(2^{n+2} - \binom{n+2}{0} - \binom{n+2}{1} \right) \right) = \\
 &= \frac{2^{n+1} - 1}{n+1} - \frac{2^{n+2} - n - 3}{(n+1)(n+2)}
 \end{aligned}$$

Príklad 3.7. Vypočítajte: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k k^2$, $n \in \mathbb{N}_0$.

Riešenie: (Stanek)

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k k^2 &= n \sum_{k=0}^n \binom{n-1}{k-1} k (-1)^k = n \left(\sum_{k=0}^n \binom{n-1}{k-1} (k-1) (-1)^k + \sum_{k=0}^n \binom{n-1}{k-1} (-1)^k \right) = \\
 &= \left/ \sum_{k=0}^n \binom{n-1}{k-1} (-1)^k = 0 \text{ pre } n \geq 2 \right/ = n(n-1) \sum_{k=0}^n \binom{n-2}{k-2} (-1)^k = 0 \text{ pre } n \geq 3
 \end{aligned}$$

Pre $n \geq 3$ je suma rovná 0, pre $n \in \{0, 1, 2\}$ jej hodnotu spočítame dosadením.

Príklad 3.8. Vypočítajte: $\sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k} \left(\frac{n+1}{m} \right)^k (-1)^{n+k}$, $n, m \in \mathbb{N}_0$.

Riešenie: (Laco) Najprv upravím podmienku, m nemôže byť 0, inak by zlomok v sume nebol definovaný, takže ďalej už uvažujem len $m > 0$.

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k} \left(\frac{n+1}{m} \right)^k (-1)^{n+k} &= \left/ x = \frac{n+1}{m} \right/ = (-1)^n \sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k} x^k (-1)^k = \\
 &= (-1)^n \left(\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} x^k (-1)^k - \binom{n+1}{n+1} x^{n+1} (-1)^{n+1} \right) = \\
 &= (-1)^n (1-x)^{n+1} - (-1)^{2n+1} x^{n+1} = (-1)^n (1-x)^{n+1} + x^{n+1} = \\
 &= (-1)^n \left(\frac{m-n-1}{m} \right)^{n+1} + \left(\frac{n+1}{m} \right)^{n+1}
 \end{aligned}$$

Príklad 3.9. Vypočítajte: $\sum_{k \geq 1} \frac{n+1}{k} \binom{n+1}{2k-1}$, $n \in \mathbb{N}$.

Príklad 3.10. Vypočítajte: $\sum_k \binom{n}{2n-k} \binom{-n+k}{k+2n+p} \binom{k-3p}{2m+k} (-1)^k$, $m, n, p \in \mathbb{Z}$, $m \geq n \geq 0$.

Riešenie: (Stanek)

$$\begin{aligned}
 \sum_k \binom{n}{2n-k} \binom{-n+k}{k+2n+p} \binom{k-3p}{2m+k} (-1)^k &= \left/ \binom{n}{p} \binom{p}{2n-k} = \binom{n}{2n-k} \binom{-n+k}{k-2n+p} \right/ = \\
 &= \binom{n}{p} \sum_k \binom{p}{2n-k} \binom{2m+k-k+3p-1}{2m+k} = \text{/konvolúcia/} \\
 &= \binom{n}{p} \binom{2m+4p-1}{2n+2m}
 \end{aligned}$$

Časť 4. Binomické koeficienty 2

Príklad 4.1. Vypočítajte: $\sum_{k=n}^{n^2} H_{k-1} \binom{k}{n}$, $n \in \mathbb{N}$.

Príklad 4.2. Vypočítajte: $\sum_{1 \leq k, j \leq n} \binom{k+j+2007}{n}$, $n \in \mathbb{N}$.

Príklad 4.3. Vypočítajte: $\sum_{k \geq 0} (-1)^k \binom{\frac{1}{2}}{n-k} (k+1)$.

Časť 5. Midterm 12.4.2012

Príklad 5.1. Vypočítajte: $\sum_{1 \leq k \leq n} \sum_{1 \leq j \leq k} \binom{j-k}{j}$.

Riešenie: (Stanek) Ak je $n \leq 0$, výsledok je 0. Ak $n > 0$, potom

$$\sum_{1 \leq k \leq n} \sum_{1 \leq j \leq k} \binom{j-k}{j} = \sum_{1 \leq k \leq n} \left(\binom{k-k+1}{k} - \binom{0-k+1}{0} \right) = \sum_{1 \leq k \leq n} \binom{1}{k} - \sum_{1 \leq k \leq n} \binom{1-k}{0} = 1 - n$$

Príklad 5.2. Vypočítajte: $\sum_{0 \leq k \leq n^2} \lfloor \sqrt{k} \rfloor \cdot \lceil \sqrt{k} \rceil$, $n \in \mathbb{N}$.

Príklad 5.3. Vypočítajte: $\sum_{1 \leq k \leq n} H_k^{(2)} k$, $n \in \mathbb{N}$.

Príklad 5.4. Vyriešte rekurentný vzťah

$$\begin{aligned} g_0 &= 1 \\ 2g_n &= \alpha g_{n-1} + \frac{n}{2}, \quad n \in \mathbb{N}, \alpha \neq 2 \end{aligned}$$

Príklad 5.5. Vypočítajte: $\sum_{k \geq -1} (-1)^{k+1} \binom{n}{2012-k}$, $n \in \mathbb{Z}$.

Riešenie: (Stanek)

$$\begin{aligned} \sum_{k \geq -1} (-1)^{k+1} \binom{n}{2012-k} &= \left/ \begin{matrix} 2012-k=l \\ k=2012-l \end{matrix} \right/ = \sum_{2012-l \geq -1} (-1)^{2012-l+1} \binom{n}{l} = - \sum_{l \leq 2013} (-1)^l \binom{n}{l} = \\ &= - \sum_{l \leq 2013} \binom{l-n-1}{l} = - \binom{2013-n-1+1}{2013} = - \binom{2013-n}{2013} \end{aligned}$$

Iné riešenie: (Stanek)

$$\sum_{k \geq -1} (-1)^{k+1} \binom{n}{2012-k} = \sum_{k \geq -1} \binom{-1}{k+1} \binom{n}{2012-k} = \text{/konvolúcia/} = \binom{n-1}{2013}$$