COLEÇÃO / MATERIAL 09

O que fazer numa crise de pânico?

Entenda a resposta de alarme e organize um plano de cuidado seguro.

UMA IDEIA PARA LEVAR COM VOCÊ

Os sintomas podem ser intensos. Identificá-los com ajuda profissional permite construir respostas mais seguras.

POR QUE ESTE MATERIAL EXISTE

Palpitações, falta de ar, tontura e medo de morrer podem surgir de forma abrupta numa crise de pânico. Como esses sintomas também podem ocorrer em problemas físicos, especialmente se forem novos ou diferentes do habitual, não devem ser automaticamente atribuídos à ansiedade.

Você pode ler aos poucos. Não precisa fazer todas as atividades e não existe pontuação para acertar.

Uma dificuldade • Uma ideia • Uma pequena experiência

01 / ENTENDER

O que pode estar acontecendo?

No pânico, a pessoa pode interpretar sensações corporais como sinais de perigo imediato. O medo aumenta o estado de alerta e intensifica as sensações. A TCC tem evidência para tratar o transtorno do pânico; este cartão é apenas um recurso complementar para pessoas avaliadas.

Como o ciclo pode se manter

- Uma sensação corporal chama a atenção.
- Surge interpretação de ameaça e aumento do medo.
- O corpo acelera, a pessoa monitora mais e o círculo se intensifica.

Três estratégias para experimentar

01 Reconheça o padrão conhecido

Se você já foi avaliado(a) e tem um plano clínico, lembre-se de que a sensação é intensa, mas pode passar.

Exemplo: "Estou percebendo sinais parecidos com minhas crises anteriores".

02 Oriente a atenção para o ambiente

Sinta o contato dos pés com o chão e descreva objetos ao redor. Não precisa fazer tudo perfeitamente.

Exemplo: notar a cadeira, a luz da sala e três sons presentes.

03 Respire com conforto, sem forçar

Evite hiperventilar ou prender o ar para "consertar" o sintoma; procure uma respiração suave e confortável.

Exemplo: soltar o ar lentamente, sem contar de maneira rígida.

02 / COLOCAR EM PRÁTICA

Meu plano de enfrentamento

Escolha esse experimento somente se fizer sentido para você. Ele pode ser adaptado, interrompido ou feito com apoio.

01 Se os sintomas forem novos, muito diferentes ou preocupantes, priorize avaliação médica.

02 Se reconhecer uma crise já avaliada, retome a orientação combinada com seu profissional.

03 Após o episódio, anote somente o que pode ajudar no acompanhamento: contexto, sintomas e impacto.

Na vida real

EXEMPLO

“Tive palpitação semelhante à de crises anteriores. Sentei em local seguro, senti os pés no chão e segui meu plano de tratamento”.

Plano B: se estiver difícil

Se focar na respiração piorar a sensação, mude para uma âncora externa: olhar ao redor, ouvir sons ou sentir os pés. Técnicas não devem substituir avaliação de sinais de alerta.

Quando pedir ajuda

Dor torácica nova ou intensa, desmaio, dificuldade respiratória importante, alteração neurológica, sintomas diferentes do padrão habitual ou dúvida sobre a causa exigem avaliação urgente. No Brasil, SAMU 192. Crises recorrentes ou evitação por medo de novas crises merecem tratamento.

03 / ESCOLHER, NÃO SE COBRAR

Checklist opcional

Este checklist é um cardápio de possibilidades, não uma lista de obrigações. Marque só o que fez sentido — ou não marque nada.

☐ Conheço os sinais de alerta que exigem atendimento.

☐ Tenho ou pretendo construir um plano com profissional.

☐ Identifiquei uma estratégia de ancoragem tolerável.

☐ Evitei interpretar automaticamente todo sintoma como pânico.

☐ Considerei tratamento se as crises estão se repetindo.

Uma estratégia que quero testar

Minha dificuldade principal é:

_____

O menor passo que consigo imaginar é:

_____

O que poderia facilitar esse passo:

_____

Leituras e referências

• NICE. Ansiedade generalizada e transtorno do pânico: CG113.
https://www.nice.org.uk/guidance/cg113/chapter/recommendations

• NHS. Panic disorder: sintomas, apoio e autocuidado.
https://www.nhs.uk/mental-health/conditions/panic-disorder/

• Ministério da Saúde. SAMU 192: quando acionar.
https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/samu-192

Material educativo para adultos; não substitui avaliação, diagnóstico, prescrição ou cuidado individualizado. Reproduza com responsabilidade e revise para seu público.