Einführung in MATLAB

Dr. J. Schulz Einheit 1

Hinweis: Alle Aufgaben (bis auf Aufgabe 6) sollen ohne Verwendung von Schleifen gelöst werden.

Aufgabe 1:

Starten Sie das Programm plot_poly. Der Graph welchen Polynoms wird dargestellt? Erklären Sie das Programm ausw_poly2.

Aufgabe 2:

Stellen Sie das Polynom

$$p(x) = x^5 - 4x^4 - 10x^3 + 40x^2 + 9x - 36$$

grafisch dar. Wo sind die Nullstellen?

Hinweis: Benutzen sie die Eigenwerte (eig) der Begleitmatrix

$$\left(\begin{array}{cccccc}
0 & 0 & 0 & 0 & 36 \\
1 & 0 & 0 & 0 & -9 \\
0 & 1 & 0 & 0 & -40 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 10 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 4
\end{array}\right)$$

Aufgabe 3:

Geben Sie die folgende Zeile ein:

$$x=1e-15; ((1+x)-1)/x$$

Wie interpretieren Sie das Ergebnis? (Testen Sie auch x=1e-16!)

Aufgabe 4:

Berechnen Sie $\sum_{j=2}^{1000} \frac{1}{\log(j)j}$ und $\sum_{j=1}^{1000} \frac{1}{j}.$

Aufgabe 5:

Welchen Grenzwert hat $\frac{1}{\pi^2} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j^2}$?

Aufgabe 6:

Betrachten Sie die Mandelbrot-Menge in $[-1, -0.4] \times [-0.6, 0]!$

Aufgabe 7:

Interpretieren Sie das Ergebnis der Eingabe

a=100:2:200; b=[1 4 10]; a(b)

Aufgabe 8:

Erzeugen Sie die (100×100) - Matrix

$$\begin{pmatrix}
2 & -1 & & & 0 \\
-1 & 2 & -1 & & & \\
& \ddots & \ddots & \ddots & \\
& & -1 & 2 & -1 \\
0 & & & -1 & 2
\end{pmatrix}$$

und berechnen Sie ihre Determinante.

Aufgabe 9:

Erzeugen Sie eine Hilbert Matrix der Größe 50. (Befehl hilb) Addieren Sie die Einträge der dritten Spalte!

Aufgabe 10:

Schreiben Sie eine Funktion, die zu einem gegebenen Vektor dessen Durchschnitt berechnet und zurückgibt.

Aufgabe 11:

Schreiben Sie eine Funktion, die zu einem gegebenen Vektor $x = (x_1, \dots, x_n)$ die Vandermonde-Matrix

$$V := \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

berechnet und zurückgibt.

Hinweis: V=A.^B. mit

$$A := \begin{pmatrix} x_1 & x_1 & x_1 & \dots & x_1 \\ x_2 & x_2 & x_2 & \dots & x_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n & x_n & x_n & \dots & x_n \end{pmatrix}, \quad B := \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \dots & n-1 \\ 0 & 1 & 2 & \dots & n-1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & 2 & \dots & n-1 \end{pmatrix}$$