

# LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES

N°49-78

14 -16, rue Victor Hugo 49460 MONTREUIL-JUIGNE Téléphone : 02 41 42 30 70 - Fax : 02 41 42 46 55

SELARL BIOSITES (Membres associés - N°49.10)

#### DR ENNOUCHI FRANCK

Pharmacien Biologiste D.E.S de Biologie Médicale

DR CRESPEL CYRIL
MAISON MEDICALE
8 RUE PIERRE MENDES FRANCE
49460 MONTREUIL JUIGNE

Monsieur LAISNE GAUTIER
9 IMPASSE CHARLES DE GAULLE

49460 MONTREUIL-JUIGNE

Dossier n° **09/07/20-A-0016** - **-HARMU-TP** 

Enregistré à 08H31 Edité le 09/07/20 à 17:03 Né(e) le 23/12/1996 Examens prescrits par le DR CRESPEL CYRIL Copie au Prélevé le 09/07/20 à 08H38 Le jeudi 9 juillet 2020

# **Immunologie**

Valeurs de référence Antériorités

### Sérologie bactérienne

Sérodiagnostic de la Treponematose (Syphilis)

Anticorps anti treponema pallidum (TPHA): Négatif

EIA - Architect Plus i2000SR - ABBOTT

Conformément à la NABM applicable au 29 juin 2018 (JO n°0130 DU 08/06/18), seule la recheche des Ig Totales par EIA

est réalisée dans le cadre d'un dépistage systématique de la syphilis. Un test non tréponémique type VDRL ou RPR ne sera effectué qu'en cas de positivité du test tréponémique.

Le suivi sérologique après traitement (précisé sur les prescriptions) des sujets atteints de syphilis est limité à la réalisation d'un test non tréponémique (VDRL ou RPR) en cas de:- syphilis précoce à des contrôles à 3, 6 et 12 mois,
- syphilis tardive à des contrôles à 6, 12 et 24 mois.

# Sérologie virale

✓ Dépistage des anticorps anti-HIV 1 et 2 Test HIV Combo Anticorps/AgP24 ...... Négatif EIA - Architect Plus i2000 - ABBOTT

Conformément à l'arrêté du 28 mai du 2010 du J.O., une seule technique de dépistage est nécessaire pour les tests couplant la détection des anticorps anti HIV1 et anti HIV2 et la détection de l'antigène p24, la limite de détection de l'antigène p24 du test HIV Anticorps/AgP24 Combo d'Abbott est de 6 pg/ml.

Un résultat négatif du test de dépistage ELISA combiné, 6 semaines après l'exposition supposée, pourra être considéré comme signant l'absence d'infection par le VIH (Dépistage de l'infection par le VIH en France, HAS, octobre 2008).

En cas de TPE, une nouvelle sérologie 12 semaines après l'exposition supposée devra être réalisée (*Prise en charge des accidents d'exposition sexuelle et au sang chez l'adulte et l'enfant, CNS et ANRS, septembre 2017*)

Validé le 09/07/20

F. Ernouchi &

FRANCK ENNOUCHI





# LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES

N°49-78

14 -16, rue Victor Hugo 49460 MONTREUIL-JUIGNE Téléphone : 02 41 42 30 70 - Fax : 02 41 42 46 55

SELARL BIOSITES (Membres associés - N°49.10)

#### DR ENNOUCHI FRANCK

Pharmacien Biologiste D.E.S de Biologie Médicale

DR CRESPEL CYRIL

**Monsieur LAISNE GAUTIER** 

Dossier n° 09/07/20-A-0016 - -HARMU-TP

Le jeudi 9 juillet 2020

# Sérologie hépatite B

✓ Recherche d'Antigène Hbs ...... Négative EIA- Architect Plus i2000SR - ABBOTT

Recherche d'anticorps anti-HBC

Totaux .....

EIA - Architect Plus i2000SR - ABBOTT

Négative

 $< 10 \, \text{mUI/mL}$ 

Anticorps anti-HBS (titrage)\* .....

EIA - Architect Plus i2000SR - ABBOTT

Titre (mUI/mL)	Interprétation
< 10	Négatif
≥ 10	Positif

Interprétation :

Patient(e) non immunisé(e)

# Sérologie hépatite C

✓ Recherche des anticorps anti VHC ..... Négative EIA - Architect Plus i2000SR - ABBOTT

Validé le 09/07/20

F. Ernouchi &

FRANCK ENNOUCHI

