

EM Algorithm

Machine Learning Techniques

Karthik Thiagarajan

MLE

$$l(\boldsymbol{\theta}; D) = \log \prod_{i=1}^n f_X(x_i; \boldsymbol{\theta})$$

$$= \sum_{i=1}^n \log f_X(x_i; \boldsymbol{\theta})$$

$$= \sum_{i=1}^n \log \left[\sum_{k=1}^K \pi_k \cdot \mathcal{N}(x_i; \mu_k, \sigma_k^2) \right]$$


$$\max_{\boldsymbol{\theta}} l(\boldsymbol{\theta}; D)$$

Jensen's Inequality

$$\log\left(\frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 5\right) \geq \frac{1}{2} \log 2 + \frac{1}{2} \log 5$$


Jensen's Inequality

$$\log\left(\frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 5\right) \geq \frac{1}{2} \log 2 + \frac{1}{2} \log 5$$



Jensen's Inequality

$$\log\left(\frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 5\right) \geq \frac{1}{2} \log 2 + \frac{1}{2} \log 5$$




Jensen's Inequality

$$\log\left(\frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 5\right) \geq \frac{1}{2} \log 2 + \frac{1}{2} \log 5$$

$$\log(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) \geq \lambda_1 \log x_1 + \lambda_2 \log x_2$$

with $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$




Jensen's Inequality

$$\log\left(\frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 5\right) \geq \frac{1}{2} \log 2 + \frac{1}{2} \log 5$$

$$\log(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) \geq \lambda_1 \log x_1 + \lambda_2 \log x_2$$

with $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$

Concave \rightarrow Dome



$$\lambda_k^i$$

$$l(\boldsymbol{\theta};\; D) = \sum_{i=1}^n \log \left[\sum_{k=1}^K \pi_k \cdot \mathcal{N} \left(x_i; \; \mu_k, \sigma_k^2 \right) \right]$$

$$\lambda_k^i$$

$$\begin{aligned} l(\boldsymbol{\theta}; \; D) &= \sum_{i=1}^n \log \left[\sum_{k=1}^K \pi_k \cdot \mathcal{N}\left(x_i; \; \mu_k, \sigma_k^2\right) \right] \\ &= \sum_{i=1}^n \log \left[\sum_{k=1}^K \lambda_k^i \cdot \frac{\pi_k \cdot \mathcal{N}\left(x_i; \; \mu_k, \sigma_k^2\right)}{\lambda_k^i} \right] \end{aligned}$$

$$\lambda_k^i$$

$$\begin{aligned} l(\boldsymbol{\theta}; \ D) &= \sum_{i=1}^n \log \left[\sum_{k=1}^K \pi_k \cdot \mathcal{N}(x_i; \ \mu_k, \sigma_k^2) \right] \\ &= \sum_{i=1}^n \log \left[\sum_{k=1}^K \lambda_k^i \cdot \frac{\pi_k \cdot \mathcal{N}(x_i; \ \mu_k, \sigma_k^2)}{\lambda_k^i} \right] \\ &\geq \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^K \lambda_k^i \cdot \log \left[\frac{\pi_k \cdot \mathcal{N}(x_i; \ \mu_k, \sigma_k^2)}{\lambda_k^i} \right] \end{aligned}$$

$$\lambda_k^i$$

$$\begin{aligned} l(\boldsymbol{\theta}; \ D) &= \sum_{i=1}^n \log \left[\sum_{k=1}^K \pi_k \cdot \mathcal{N}(x_i; \ \mu_k, \sigma_k^2) \right] \\ &= \sum_{i=1}^n \log \left[\sum_{k=1}^K \lambda_k^i \cdot \frac{\pi_k \cdot \mathcal{N}(x_i; \ \mu_k, \sigma_k^2)}{\lambda_k^i} \right] \\ &\geq \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^K \lambda_k^i \cdot \log \left[\frac{\pi_k \cdot \mathcal{N}(x_i; \ \mu_k, \sigma_k^2)}{\lambda_k^i} \right] \\ &= \sum_{i=1}^n E_{\lambda^i} \left[\log \left[\frac{\pi_k \cdot \mathcal{N}(x_i; \ \mu_k, \sigma_k^2)}{\lambda_k^i} \right] \right] \end{aligned}$$

$$\lambda_k^i$$

$$\begin{aligned} l(\boldsymbol{\theta}; \; D) &= \sum_{i=1}^n \log \left[\sum_{k=1}^K \pi_k \cdot \mathcal{N} \left(x_i; \; \mu_k, \sigma_k^2 \right) \right] \\ &= \sum_{i=1}^n \log \left[\sum_{k=1}^K \lambda_k^i \cdot \frac{\pi_k \cdot \mathcal{N} \left(x_i; \; \mu_k, \sigma_k^2 \right)}{\lambda_k^i} \right] \\ &\geq \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^K \lambda_k^i \cdot \log \left[\frac{\pi_k \cdot \mathcal{N} \left(x_i; \; \mu_k, \sigma_k^2 \right)}{\lambda_k^i} \right] \\ &= \sum_{i=1}^n E_{\lambda^i} \left[\log \left[\frac{\pi_k \cdot \mathcal{N} \left(x_i; \; \mu_k, \sigma_k^2 \right)}{\lambda_k^i} \right] \right] \end{aligned}$$

$$\sum_{k=1}^K \lambda_k^i = 1$$

$$\lambda_k^i$$

$$\begin{aligned} l(\boldsymbol{\theta}; \; D) &= \sum_{i=1}^n \log \left[\sum_{k=1}^K \pi_k \cdot \mathcal{N}\left(x_i; \; \mu_k, \sigma_k^2\right) \right] \\ &= \sum_{i=1}^n \log \left[\sum_{k=1}^K \lambda_k^i \cdot \frac{\pi_k \cdot \mathcal{N}\left(x_i; \; \mu_k, \sigma_k^2\right)}{\lambda_k^i} \right] \\ &\geq \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^K \lambda_k^i \cdot \log \left[\frac{\pi_k \cdot \mathcal{N}\left(x_i; \; \mu_k, \sigma_k^2\right)}{\lambda_k^i} \right] \\ &= \sum_{i=1}^n E_{\lambda^i} \left[\log \left[\frac{\pi_k \cdot \mathcal{N}\left(x_i; \; \mu_k, \sigma_k^2\right)}{\lambda_k^i} \right] \right] \end{aligned}$$

$$\sum_{k=1}^K \lambda_k^i = 1$$

\downarrow
 k

	λ	1	2	3	4	5
	1	λ_1^1	λ_1^2	λ_1^3	λ_1^4	λ_1^5
	2	λ_2^1	λ_2^2	λ_2^3	λ_2^4	λ_2^5
	3	λ_3^1	λ_3^2	λ_3^3	λ_3^4	λ_3^5

$\xrightarrow{\quad\quad\quad}$
 i

$$\lambda_k^i$$

$$\begin{aligned} l(\boldsymbol{\theta}; \; D) &= \sum_{i=1}^n \log \left[\sum_{k=1}^K \pi_k \cdot \mathcal{N}\left(x_i; \; \mu_k, \sigma_k^2\right) \right] \\ &= \sum_{i=1}^n \log \left[\sum_{k=1}^K \lambda_k^i \cdot \frac{\pi_k \cdot \mathcal{N}\left(x_i; \; \mu_k, \sigma_k^2\right)}{\lambda_k^i} \right] \\ &\geq \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^K \lambda_k^i \cdot \log \left[\frac{\pi_k \cdot \mathcal{N}\left(x_i; \; \mu_k, \sigma_k^2\right)}{\lambda_k^i} \right] \\ &= \sum_{i=1}^n E_{\lambda^i} \left[\log \left[\frac{\pi_k \cdot \mathcal{N}\left(x_i; \; \mu_k, \sigma_k^2\right)}{\lambda_k^i} \right] \right] \end{aligned}$$

$$\sum_{k=1}^K \lambda_k^i = 1$$

\downarrow
 k

i
 \longrightarrow

	λ	1	2	3	4	5
1	λ_1^1	λ_1^2	λ_1^3	λ_1^4	λ_1^5	
2	λ_2^1	λ_2^2	λ_2^3	λ_2^4	λ_2^5	
3	λ_3^1	λ_3^2	λ_3^3	λ_3^4	λ_3^5	

i

	λ	1	2	3	4	5
1		0.2	0.5	0.8	0.5	0.3
2		0.7	0.5	0.1	0.3	0.3
3		0.1	0	0.1	0.2	0.4

k

EM Algorithm

Initialization

$$\boldsymbol{\theta}^{(0)} = \begin{cases} \mu_1^{(0)}, \dots, \mu_K^{(0)} \\ (\sigma_1^2)^{(0)}, \dots, (\sigma_K^2)^{(0)} \\ \pi_1^{(0)}, \dots, \pi_K^{(0)} \end{cases}$$

$$\boldsymbol{\theta}^t = \begin{cases} \mu_1^{(t)}, \dots, \mu_K^{(t)} \\ (\sigma_1^2)^{(t)}, \dots, (\sigma_K^2)^{(t)} \\ \pi_1^{(t)}, \dots, \pi_K^{(t)} \end{cases}$$

EM Algorithm

Initialization

$$\boldsymbol{\theta}^{(0)} = \begin{cases} \mu_1^{(0)}, \dots, \mu_K^{(0)} \\ (\sigma_1^2)^{(0)}, \dots, (\sigma_K^2)^{(0)} \\ \pi_1^{(0)}, \dots, \pi_K^{(0)} \end{cases}$$

$$\boldsymbol{\theta}^t = \begin{cases} \mu_1^{(t)}, \dots, \mu_K^{(t)} \\ (\sigma_1^2)^{(t)}, \dots, (\sigma_K^2)^{(t)} \\ \pi_1^{(t)}, \dots, \pi_K^{(t)} \end{cases}$$

Repeat until convergence:

E-Step:

$$\lambda_k^i = f_{Z|X}(k \mid x_i) = \frac{f_Z(k) \cdot f_{X|Z}(x_i \mid k)}{\sum_{l=1}^K f_Z(l) \cdot f_{X|Z}(x_i \mid l)}$$

EM Algorithm

Initialization

$$\boldsymbol{\theta}^{(0)} = \begin{cases} \mu_1^{(0)}, \dots, \mu_K^{(0)} \\ (\sigma_1^2)^{(0)}, \dots, (\sigma_K^2)^{(0)} \\ \pi_1^{(0)}, \dots, \pi_K^{(0)} \end{cases}$$

$$\boldsymbol{\theta}^t = \begin{cases} \mu_1^{(t)}, \dots, \mu_K^{(t)} \\ (\sigma_1^2)^{(t)}, \dots, (\sigma_K^2)^{(t)} \\ \pi_1^{(t)}, \dots, \pi_K^{(t)} \end{cases}$$

Repeat until convergence:


E-Step:

$$\lambda_k^i = f_{Z|X}(k \mid x_i) = \frac{f_Z(k) \cdot f_{X|Z}(x_i \mid k)}{\sum_{l=1}^K f_Z(l) \cdot f_{X|Z}(x_i \mid l)}$$


M-Step:

$$\mu_k^{(t)} = \frac{\sum_{i=1}^n \lambda_k^i x_i}{\sum_{i=1}^n \lambda_k^i} \quad (\sigma_k^2)^{(t)} = \frac{\sum_{i=1}^n \lambda_k^i (x_i - \mu_k^{(t)})^2}{\sum_{i=1}^n \lambda_k^i} \quad \pi_k^{(t)} = \frac{\sum_{i=1}^n \lambda_k^i}{n}$$

EM Algorithm




EM Algorithm



$$l(\boldsymbol{\theta}^{(t)}; D) = \sum_{i=1}^n \log \left[\sum_{k=1}^K \pi_k^{(t)} \cdot \mathcal{N}(x_i; \mu_k^{(t)}, (\sigma_k^2)^{(t)}) \right]$$


EM Algorithm



$$l(\boldsymbol{\theta}^{(t)}; D) = \sum_{i=1}^n \log \left[\sum_{k=1}^K \pi_k^{(t)} \cdot \mathcal{N}(x_i; \mu_k^{(t)}, (\sigma_k^2)^{(t)}) \right]$$

$$l_B(\boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\lambda}; D) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^K \lambda_k^i \cdot \log \left[\frac{\pi_k \cdot \mathcal{N}(x_i; \mu_k, \sigma_k^2)}{\lambda_k^i} \right]$$

EM Algorithm




$$l(\boldsymbol{\theta}^{(t)}; D) = \sum_{i=1}^n \log \left[\sum_{k=1}^K \pi_k^{(t)} \cdot \mathcal{N}(x_i; \mu_k^{(t)}, (\sigma_k^2)^{(t)}) \right]$$

$$l_B(\boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\lambda}; D) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^K \lambda_k^i \cdot \log \left[\frac{\pi_k \cdot \mathcal{N}(x_i; \mu_k, \sigma_k^2)}{\lambda_k^i} \right]$$

$$\text{E-step: } \boldsymbol{\lambda}^{(t+1)} = \arg \max_{\boldsymbol{\lambda}} l_B(\boldsymbol{\theta}^{(t)}, \boldsymbol{\lambda}; D)$$

EM Algorithm




$$l(\boldsymbol{\theta}^{(t)}; D) = \sum_{i=1}^n \log \left[\sum_{k=1}^K \pi_k^{(t)} \cdot \mathcal{N}(x_i; \mu_k^{(t)}, (\sigma_k^2)^{(t)}) \right]$$

$$l_B(\boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\lambda}; D) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^K \lambda_k^i \cdot \log \left[\frac{\pi_k \cdot \mathcal{N}(x_i; \mu_k, \sigma_k^2)}{\lambda_k^i} \right]$$

$$\text{E-step: } \boldsymbol{\lambda}^{(t+1)} = \arg \max_{\boldsymbol{\lambda}} l_B(\boldsymbol{\theta}^{(t)}, \boldsymbol{\lambda}; D)$$

$$l(\boldsymbol{\theta}^{(t)}; D) = l_B(\boldsymbol{\theta}^{(t)}, \boldsymbol{\lambda}^{(t+1)}; D)$$

EM Algorithm



$$l(\boldsymbol{\theta}^{(t)}; D) = \sum_{i=1}^n \log \left[\sum_{k=1}^K \pi_k^{(t)} \cdot \mathcal{N}(x_i; \mu_k^{(t)}, (\sigma_k^2)^{(t)}) \right]$$

$$l_B(\boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\lambda}; D) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^K \lambda_k^i \cdot \log \left[\frac{\pi_k \cdot \mathcal{N}(x_i; \mu_k, \sigma_k^2)}{\lambda_k^i} \right]$$

$$\text{E-step: } \boldsymbol{\lambda}^{(t+1)} = \arg \max_{\boldsymbol{\lambda}} l_B(\boldsymbol{\theta}^{(t)}, \boldsymbol{\lambda}; D)$$

$$l(\boldsymbol{\theta}^{(t)}; D) = l_B(\boldsymbol{\theta}^{(t)}, \boldsymbol{\lambda}^{(t+1)}; D)$$

$$\text{M-step: } \boldsymbol{\theta}^{(t+1)} = \arg \max_{\boldsymbol{\theta}} l_B(\boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\lambda}^{(t+1)}; D)$$

EM Algorithm

K-Means

E-step: $\lambda_k^i = f_{Z|X}(k | x_i)$

EM Algorithm

E-step: $\lambda_k^i = f_{Z|X}(k | x_i)$

K-Means

Reassignment-step: $\lambda_k^i = \begin{cases} 1 & x_i \text{ is closest to } \mu_k \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$

EM Algorithm

E-step: $\lambda_k^i = f_{Z|X}(k | x_i)$

M-step:

$$\mu_k = \frac{\sum_{i=1}^n \lambda_k^i x_i}{\sum_{i=1}^n \lambda_k^i}$$

$$\sigma_k^2 = \frac{\sum_{i=1}^n \lambda_k^i (x_i - \mu_k)^2}{\sum_{i=1}^n \lambda_k^i}$$
$$\pi_k = \frac{\sum_{i=1}^n \lambda_k^i}{n}$$

K-Means

Reassignment-step: $\lambda_k^i = \begin{cases} 1 & x_i \text{ is closest to } \mu_k \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$

EM Algorithm

E-step: $\lambda_k^i = f_{Z|X}(k | x_i)$

M-step:

$$\mu_k = \frac{\sum_{i=1}^n \lambda_k^i x_i}{\sum_{i=1}^n \lambda_k^i}$$

$$\sigma_k^2 = \frac{\sum_{i=1}^n \lambda_k^i (x_i - \mu_k)^2}{\sum_{i=1}^n \lambda_k^i} \quad \pi_k = \frac{\sum_{i=1}^n \lambda_k^i}{n}$$

K-Means

Reassignment-step: $\lambda_k^i = \begin{cases} 1 & x_i \text{ is closest to } \mu_k \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$

Compute mean: $\mu_k = \frac{\sum_{i=1}^n \lambda_k^i \cdot x_i}{\sum_{i=1}^n \lambda_k^i}$

