เครื่องมือคัดกรองภาวะเซพซิสสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในชุมชน (สำหรับผู้วิจัย)

รหัสผู้เข้าร่วมวิจัย……..

คำชี้แจง: โปรดเริ่มทำแบบประเมินนี้เมื่อผู้ป่วยรู้สึกไม่สบาย มีอาการผิดปกติ หรือพบว่าสัญญาณชีพผิดปกติ

1. ผู้ป่วยมีปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะเซพซิสหรือไม่?

☐ 1. อายุเกิน 75 ปี

☐ 2. ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น มีโรคเบาหวาน มีการใช้ยาประเภทสเตียรอยด์ หรือรับการรักษาด้วยเคมีบำบัด

พิจารณาคำสั่งล่วงหน้าเกี่ยวกับการรักษา/แผนการดูแลผู้ป่วย

☐ 3. มีสายสวนหรือสายต่าง ๆ ค้างอยู่ในร่างกาย / มีประวัติการใช้ยาเสพติดโดยการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ (IVDU) / มีผิวหนังแตกหรือมีบาดแผล

☐ 4. มีประวัติได้รับบาดเจ็บ / การผ่าตัด / การทำหัตถการที่มีการสอดใส่เครื่องมือทางการแพทย์เข้าสู่ร่างกายเมื่อไม่นานมานี้

☐ 5. ไม่มีปัจจัยเสี่ยง

หากตอบว่ามีปัจจัยเสี่ยง ให้ประเมินข้อที่ 2 ต่อ

2. อาการดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อหรือไม่ แหล่งที่มาของการติดเชื้อที่น่าจะเป็น

☐ 1. ระบบหายใจ

☐ 2. ระบบปัสสาวะ

☐ 3. ระบบทางเดินอาหาร

☐ 4. ระบบไหลเวียนโลหิต

☐ 5. ผิวหนัง / ข้อต่อ / บาดแผล

☐ 6. วัตถุที่ค้างอยู่ในร่างกาย เช่น สายสวนปัสสาวะ สายให้อาหาร ท่อเจาะคอ หรือสายสวนหลอดเลือดส่วนกลาง

☐ 7. สมอง

☐ 8. การผ่าตัด

☐ 9. อื่น ๆ (ระบุ) .....

☐ 10. ไม่มีสาเหตุของติดเชื้อ

หากตอบว่าไม่มี มีโอกาสน้อยที่จะเป็นภาวะเซพซิส ควรพิจารณาการวินิจฉัยโรคอื่น

หากตอบว่ามี ให้ประเมินข้อที่ 3 ต่อ

3. พบสัญญาณเตือนระดับสีแดง (Red Flags) ใด ๆ หรือไม่

☐ 1. มีหลักฐานบ่งชี้ว่ามีสภาพจิตใจที่เปลี่ยนแปลงหรือเกิดขึ้นใหม่

☐ 2. อัตราการหายใจมากกว่าหรือเท่ากับ 25 ครั้งต่อนาที

☐ 3.จำเป็นต้องให้ออกซิเจนใหม่ (40% หรือมากกว่า) เพื่อรักษาระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO_2) ให้มากกว่า 92% (มากกว่า 88% ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง)

☐ 4. ความดันโลหิตตัวบน (Systolic BP) ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 90 มม.ปรอท (หรือลดลงมากกว่า 40 จากระดับปกติ)

☐ 5. อัตราการเต้นของหัวใจมากกว่า 130 ครั้งต่อนาที

☐ 6. ไม่มีปัสสาวะออกเป็นเวลา 18 ชั่วโมง (< 0.5 มล./กก./ชม. ในกรณีที่ใส่สายสวนปัสสาวะ)

☐ 7. มีผื่นที่กดแล้วสีไม่จาง / ผิวหนังมีลักษณะด่างเป็นปื้น / ผิวซีดเทาหรือมีสีคล้ำผิดปกติ / มีอาการเขียวคล้ำ ที่เปลี่ยนไปจากเดิมหรือรอยโรคเดิม

☐ 8. ไม่พบอาการของสัญญาณเตือน

หากตอบว่าใช่ ให้เริ่มชุดการดูแลผู้ป่วยภาวะเซพซิสที่มีสัญญานเตือนระดับสีแดง

หากตอบว่าไม่ใช่

4. พบสัญญาณเตือนระดับสีเหลือง (Amber Flags) ใด ๆ หรือไม่

☐ 1. ครอบครัวรายงานพฤติกรรมหรือสภาพจิตใจที่ผิดปกติ

☐ 2. ความสามารถในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ลดลง

☐ 3. อัตราการหายใจอยู่ระหว่าง 21-24 ครั้งต่อนาที

☐ 4. ความดันโลหิตตัวบน (Systolic BP) อยู่ระหว่าง 91-100 มม.ปรอท

☐ 5. อัตราการเต้นของหัวใจอยู่ระหว่าง 91–120 ครั้งต่อนาที หรือมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เกิดขึ้นใหม่

☐ 6. ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO_2) ต่ำกว่า 92% ขณะหายใจอากาศปกติ หรือมีความต้องการออกซิเจนเพิ่มขึ้น

☐ 7. ไม่ได้ปัสสาวะออกเป็นเวลา 12-18 ชั่วโมง (0.5 มล./กก./ชม. ในกรณีที่ใส่สายสวนปัสสาวะ)

☐ 8. มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง

☐ 9. มีสัญญาณของการติดเชื้อ รวมถึงการติดเชื้อบริเวณบาดแผล

☐ 10. มีอุณหภูมิร่างกายน้อยกว่า 36 องศาเซลเซียส

☐ 11. ไม่พบอาการของสัญญาณเตือน

หากตอบว่าใช่

1. รับการประเมินภายในวันเดียวกันโดยแพทย์ทั่วไปหรือหัวหน้าทีมแพทย์
2. จำเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลโดยเร่งด่วนหรือไม่
3. เห็นชอบและบันทึกแผนการดูแลรักษาต่อเนื่อง (รวมถึงความถี่ในการติดตามสังเกตอาการและแผนการประเมินซ้ำครั้งที่สอง)

หากไม่พบสัญญาณเตือนระดับสีเหลือง ให้การดูแลตามปกติ พร้อมให้คำแนะนำด้านความปลอดภัย โดยแนะนำให้โทร 1669 หากอาการหรือภาวะของผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงหรือแย่ลง และแนะนำแหล่งข้อมูลหรือบริการที่มีอยู่ตามความเหมาะสม

โทร 1669 หากมีอาการใด ๆ ต่อไปนี้

พูดไม่ชัดหรือมีอาการสับสน

ซึมลง หมดสติ หรือไม่รู้สึกตัว

หนาวสั่นอย่างรุนแรงหรือมีอาการปวดกล้ามเนื้อ

ไม่มีปัสสาวะออกเลย (ตลอดทั้งวัน)

หายใจลำบากอย่างรุนแรง

“รู้สึกเหมือนกำลังจะตาย”

ผิวหนังเปลี่ยนไปจากเดิม มีลายด่าง สีเทาซีด มีสีเขียวคล้ำ/น้ำเงิน หรือซีดมาก

ชุดการดูแลผู้ป่วยภาวะเซพซิสที่มีสัญญาณเตือนระดับสีแดง

โทร 1669 และประสานการส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลโดยรถพยาบาลที่มีไฟและเสียงสัญญาณฉุกเฉิน หากมีผู้จ่ายยาได้อยู่ด้วยและต้องใช้เวลาในการเดินทางเกิน 1 ชั่วโมง ให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แจ้งทีมรถพยาบาลถึงภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดที่มีสัญญาณเตือนระดับสีแดง แจ้งทีมรถพยาบาลให้แจ้งเตือนโรงพยาบาลล่วงหน้าว่าเป็นผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดที่มีสัญญาณเตือนระดับสีแดง หากเป็นไปได้ แนะนำให้จัดทำข้อมูลส่งต่อผู้ป่วยเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุผลการประเมินสัญญาณชีพและข้อมูลการแพ้ยาปฏิชีวนะ