582206 Laskennan mallit, syksy 2012

- 7. harjoitusten malliratkaisut Juhana Laurinharju ja Jani Rahkola
 - 1. Esitä pinoautomaatti seuraaville kielille.
 - (a) Kaikki palindromit aakkostosta $\Sigma = \{a, b, c\}.$
 - (b) $\{a^ib^j \mid 0 \le i \le j\}$ missä $\Sigma = \{a, b, c\}$
 - (c) $\{a^ib^jc^k\mid j=i+k\}$ missä $\Sigma=\{a,b,c\}$
 - (d) Kaikki aakkoston $\Sigma = \{0,1\}$ merkkijonot joissa nollia on kaksi kertaa niin paljon kuin ykkösiä.
 - 2. Tarkastellaan kielioppia

$$S \to S + T \mid T$$
$$T \to T * F \mid F$$
$$F \to (S) \mid a$$

Muodosta merkkijonon s = (a + a) * a jäsennyspuu tämän kieliopin mukaisesti.

Etsi jäsennyspuusta jokin juuresta lehteen johtava polku, jolla sama muuttuja esiintyy kahdessa solmussa. Muodosta tämän perusteella toistuvuusominaisuuden todistuksen ideaa mukaillen jokin merkkijonon s jako osiin s = uvxyz, joilla merkkijono uv^ixy^iz kuuluu tarkasteltavaan kieleen kaikilla $i \in N$.

3. Olkoon A aakkoston $\{0,1\}$ kieli, joka koostuu niistä merkkijonoista, joissa on sama määrä nollia ja ykkösiä. Tällä kielellä on kontekstiton kielioppi

$$S \rightarrow SS \mid 0S1 \mid 1S0 \mid \varepsilon$$

- (a) Kielen A eräs toistuvuuspituus on 4. Esitä kieleen A kuuluvalle merkkijonolle s = 001101 kaikki eri tavat jakaa se osiin s = uvxyz toistuvuusominaisuuden ehdot toteuttavalla tavalla (lause 2.30; Sipser Theorem 2.34; tässä siis p = 4).
- (b) Onko kielellä A pienempiä toistuvuuspituuksia kuin 4? Perustele.
- 4. (a) Koostukoon aakkoston $\{a,b,c\}$ kieli A merkkijonoista, joissa on yhtä monta a-, b- ja c-merkkiä. Osoita, että A ei ole yhteydetön.
 - (b) Osoita, että kieli $\{0^n1^n0^n1^n \mid n \in N\}$ ei ole yhteydetön.
- 5. Anna yhteydetön kielioppi, joka tuottaa kielen $\{a^ib^jc^k\mid i=2j \text{ tai }j=2k\}$. Muodosta apulauseen 2.21 mukaisesti kieliopistasi pinoautomaatti, joka tunnistaa saman kielen.
- 6. Tee alla olevasta pinoautomaatista Apulauseen 2.27 mukaisesti kielioppi.

