

582206 Laskennan mallit, syksy 2012

6. harjoitusten malliratkaisut

Juhana Laurinharju ja Jani Rahkola

Säännölliset kielet

1. Osoita seuraavat kielet epäsäännöllisiksi käyttäen pumppauslemmaa (tai jollain muulla halua-mallasi tavalla):

(a)

$$A = \{a^m b^n c^n \mid n, m \geq 1\}$$

Ensinnäkin huomataan, että A on säännöllinen täsmälleen silloin, kun $A^{\mathcal{R}}$ on säännöllinen, sillä aikaisemmin ollaan laskuharjoituksissa näytetty, että säännölliset kielet ovat suljettu kääntämisen suhteen. Riittää siis näyttää kieli $A^{\mathcal{R}}$ epäsäännölliseksi, missä

$$A^{\mathcal{R}} = \{c^n b^n a^m \mid n, m \geq 1\}.$$

Tehdään vastaoletus. Oletetaan, että kieli $A^{\mathcal{R}}$ on säännöllinen. Tällöin sillä on jokin pumppauspituus p . Nyt voidaan valita merkkijono

$$s = c^p b^p a \in A^{\mathcal{R}},$$

jolla pätee $|s| \geq p$. Säännöllisten kielten pumppauslemman nojalla s voidaan nyt jakaa kolmeen osaan siten, että

$$\begin{aligned} s &= xyz, \\ |xy| &\leq p \text{ ja} \\ |y| &> 0 \end{aligned}$$

joten

$$\begin{aligned} xy &= c^k && \text{jollain } k \leq p, \\ z &= c^{p-k} b^p a \text{ ja erityisesti} \\ y &= c^n && \text{jollain } n > 0. \end{aligned}$$

Nyt pumppauslemman nojalla myös merkkijonon

$$xz = c^{k-n} c^{p-k} b^p a = c^{p-n} b^p a$$

tulisi kuulua kieleen $A^{\mathcal{R}}$. Nyt kuitenkin $n > 0$, joten

$$xz = c^{p-n} b^p a \notin A.$$

Tämä on ristiriidassa säännöllisten kielten pumppauslemman kanssa, joten kielellä $A^{\mathcal{R}}$ ei ole pumppausominaisuutta, eikä se siten voi olla säännöllinen, joten myöskään kieli A ei ole säännöllinen.

(b) aakkoston $\{a, b, c\}$ palindromit

(c)

Väite. Kieli $A = \{0^n 10^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ on säännöllinen.

Todistus. Oletetaan vastoin, että A on säännöllinen. Nyt on olemassa pumppauspituus $p \in \mathbb{N}$. Valitaan A :n merkkijono

$$s = 0^p 10^p$$

jolla selvästi $|s| \geq p$. Nyt jos

$$s = xyz, |xy| \leq p \text{ ja } |y| > 0,$$

niin $xy = 0^k$ jollain $0 < k \leq p$ ja erityisesti $y = 0^n$ jollain $n \geq 1$. Kuitenkin

$$xz = 0^{k-n}0^{p-k}10^p = 0^{p-n}10^p \notin A$$

sillä $p - n \neq p$, mikä on ristiriidassa pumppauslemman kanssa. Siis A ei voi olla säännöllinen. \square

2. Mitkä seuraavista kielistä ovat säännöllisiä, mitkä eivät (kielillä A_1 ja A_2 aakkostona $\{0, 1\}$, muilla $\{a, b, c\}$):

$$A_1 = \{0^n 1^m 0^n \mid n, m \in \mathbb{N}\}$$

$$A_2 = \{0^n 0^n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

$$A_3 = \{ww^R \mid w \in \Sigma^*\}$$

$$A_4 = \{www^R \mid w, u \in \Sigma^+\}.$$

$$A_5 = \{wxw^R \mid w \in \Sigma^*, x \in \Sigma\}$$

$$A_6 = \{abca^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

Perustelee. Voit käyttää hyväksi kaikkia tunnettuja säännöllisiä kieliä koskevia ominaisuuksia, etenkin edellisen tehtävän tuloksia.

Kontekstittomat kielet

3. Esitä kontekstittomat kielioipit, jotka tuottavat seuraavat aakkoston $\Sigma = \{0, 1\}$ kielet:

- (a) parittoman mittaiset merkkijonot

$$S \rightarrow MT$$

$$T \rightarrow MMT \mid \varepsilon$$

$$M \rightarrow 0 \mid 1$$

- (b) merkkijonot, joilla on osamerkkijono 111

$$S \rightarrow H111H$$

$$H \rightarrow MH \mid \varepsilon$$

$$M \rightarrow 0 \mid 1$$

- (c) merkkijonot, joissa on ainakin kaksi merkkiä ja joiden ensimmäinen ja viimeinen merkki ovat samat

$$S \rightarrow 1H1 \mid 0H0$$

$$H \rightarrow MH \mid \varepsilon$$

$$M \rightarrow 0 \mid 1$$

- (d) parittoman mittaiset merkkijonot, joiden ensimmäinen ja keskimäinen merkki ovat samat.

$$S \rightarrow 1T_1M \mid 0T_0M$$

$$T_1 \rightarrow MT_1M \mid 1$$

$$T_0 \rightarrow MT_0M \mid 0$$

$$M \rightarrow 0 \mid 1$$

4. Esitä kontekstittomat kielioipit seuraaville kielille:

- (a) $01^* \cup 10^*$

$$S \rightarrow 0T_1 \mid 1T_0$$

$$T_1 \rightarrow 1T_1 \mid \varepsilon$$

$$T_0 \rightarrow 0T_0 \mid \varepsilon$$

(b) $\{0^n 1^m \mid m, n \in N \text{ ja } m \geq n\}$

$$\begin{aligned} S &\rightarrow T_{01}T_1 \\ T_{01} &\rightarrow 0T_{01}1 \mid \varepsilon \\ T_1 &\rightarrow 1T_1 \mid \varepsilon \end{aligned}$$

(c) $\{0^n 1^k 0^m \mid m, n, k \in N \text{ ja } k = n + m\}$

$$\begin{aligned} S &\rightarrow T_{01}T_{10} \\ T_{01} &\rightarrow 0T_{01}1 \mid \varepsilon \\ T_{10} &\rightarrow 1T_{10}0 \mid \varepsilon \end{aligned}$$

(d) $\{a^n b^m c^m \mid m, n \in N\}$

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AT_{bc} \\ A &\rightarrow aA \mid \varepsilon \\ T_{bc} &\rightarrow bT_{bc}c \end{aligned}$$

(e) aakkoston $\{0, 1\}$ merkkijonot, joissa on yhtä paljon nollia ja ykkösiä.

$$S \rightarrow 0S1S \mid 1S0S \mid \varepsilon$$

5. Täydennä Jyrkin luentojen lauseen 2.3 todistus (s. 140) osoittamalla, että kontekstiton kielten luokka on suljettu myös konkatenation ja tähtioperaation suhteen. Esitä todistus samalla tarkkuustasolla kuin luentomuistiinpanoissa esitetty yhdisteen tapaus.

Olkoon A ja B aakkoston Σ yhteydettömiä kieliä ja $A = L(G_A)$ ja $B = L(G_B)$ kielioppeilla $G_A = (V_A, \Sigma, R_A, S_A)$ ja $G_B = (V_B, \Sigma, R_B, S_B)$. Oletetaan $V_A \cap V_B = \emptyset$.

Väite. *Kieli $A \circ B$ on yhteydetön.*

Todistus. Luodaan uusi kielioppi, jossa on uusi lähtösymboli $S \notin V_A \cup V_B$, ja sääntö $S \rightarrow S_A S_B$ jolla tästä uudesta lähtösymbolista voi tuottaa alkuperäisten kielten lähtösymbolien katenaation.

$$\begin{aligned} G_{A \circ B} &= (V_{A \circ B}, \Sigma, R_{A \circ B}, S) \\ V_{A \circ B} &= V_A \cup V_B \cup \{S\} \\ R_{A \circ B} &= R_A \cup R_B \cup \{S \rightarrow S_A S_B\} \end{aligned}$$

□

Väite. *Kieli A^* on yhteydetön.*

Todistus. Luodaan uusi kielioppi, jossa on uusi lähtösymboli $S \notin V_A \cup V_B$, ja sääntö $S \rightarrow S_A S \mid \varepsilon$ joka mahdollistaa A :n merkkijonojen toistamisen.

$$\begin{aligned} G_{A^*} &= (V_{A^*}, \Sigma, R_{A^*}, S) \\ V_{A^*} &= V_A \cup \{S\} \\ R_{A^*} &= R_A \cup \{S \rightarrow S_A S \mid \varepsilon\} \end{aligned}$$

□

6. Voidaan osoittaa, että kieli $A = \{a^n b^n c^n \mid n \in N\}$ ei ole kontekstiton. (Tähän palataan myöhemmin kurssilla.) Käyttäen tätä tietoa hyväksi osoita, että kontekstiton kielten luokka ei ole suljettu leikkauksen suhteen. (*Vihje:* esitä A kahden kontekstittoman kielen leikkauksena.) Päättele edelleen, että kontekstittomien kielten luokka ei ole suljettu komplementoinnin suhteen.

Väite. *Yhteydettömien kielten luokka ei ole suljettu leikkauksen suhteen.*

Todistus. Tehtävässä 3 osoitimme antamalla kieliopin, että kieli $A = \{a^n b^m c^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}$ on yhteydetön. Vastaavasti voidaan osoittaa yhteydettömäksi kieli $B = \{a^n b^n c^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}$. Kieli A on siis merkkijonot joissa b ja c merkkejä on yhtämonta. Vastaavasti kieli B on merkkijonot joissa a ja b merkkejä on yhtämonta. Nyt leikkauskieli $A \cap B = \{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ josta tiedämme ettei se ole yhteydetön. Siispä yhteydettömien kielten luokka ei ole suljettu leikkauksen suhteen. \square

Väite. *Yhteydettömien kielten luokka ei ole suljettu komplementin suhteen.*

Todistus. Oletetaan vastoin, että yhteydettömät kielet ovat suljettu komplementin suhteen. Olkoon nyt A ja B yhteydettömiä kieliä. Tällöin

$$\begin{aligned} A \cup B \text{ yhteydetön} &\Rightarrow \overline{(A \cup B)} \text{ yhteydetön} \\ &\Rightarrow \overline{A} \cap \overline{B} \text{ yhteydetön} \\ &\Rightarrow A \cap B \text{ yhteydetön} \end{aligned}$$

mikä on ristiriita edellä osoitetun kanssa. Siispä yhteydettömien kielten luokka ei voi olla suljettu komplementin suhteen. \square

7. Osoita, että seuraavien aakkoston $\{a, b, c\}$ kielten komplementit ovat kontekstittomia:

- (a) $A_1 = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$
- (b) $A_2 = \{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\}$

Vihje: Voit tietysti yksinkertaisesti kirjoittaa kontekstittomat kieliopit komplementeille $\overline{A_1}$ ja $\overline{A_2}$. Voi kuitenkin olla helpompaa esittää $\overline{A_1}$ ja $\overline{A_2}$ yhdisteinä yksinkertaisemmista kielistä, jotka on suoraviivaisempaa nähdä kontekstittomiksi.