

Содержание

1	Обозначения	2
2	Чебышёвские планы	3
2.1	Ищем веса в чебышёвских планах	3
2.2	Ограничение на x от весов	4
2.3	Ищем узлы в чебышёвских планах	4
3	Получебышёвские планы	8
3.1	Ищем веса в получебышёвских планах	8
3.2	Ограничение на x от весов	9
3.3	А теперь ищем узлы	10
3.4	Ограничение на x от узлов	14
3.5	Ограничение на x от узлов	19
4	Два узла на границе	20
4.1	Веса	20
4.2	Ограничение на x от весов	20
4.3	Узлы	20
5	Решение системы	20
5.1	Исходная система	20
5.2	Система по компонентам	21
5.3	Выражение ω_3 и ω_4	21
5.4	Исключение λ^*	22
5.5	Базисные многочлены Лагранжа	22
5.6	Выражение весов через u и v	23
5.7	Подстановка весов в систему	24
5.8	Условие $x_3 - x_2 = \alpha$	24
5.9	Подстановка $v = u + \alpha$	24
5.10	Введение A, B, C	25
5.11	Восстановление весов	26
5.12	Восстановление λ^*	26
5.13	Итоговая схема решения	27

1 Обозначения

Фиксируем $x \in \mathbb{R}$

Пусть $f(x) = (1, x, \dots, x^m)^T$, $c = f'(x)$

Рассмотрим план

$$\xi = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ \omega_1 & \omega_2 & \dots & \omega_n \end{pmatrix}$$

Та самая система для плана с n узлами имеет вид:

$$c = hM(\xi)p = h \sum_{k=1}^n \omega_k < p, f(x_k) > f(x_k)$$

или, с учётом $h = (\lambda^*)^{-1}$ и чередования знаков т.е. $< p, f(x_k) > = (-1)^{k+1}$

$$\lambda^* \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ mx^{m-1} \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^n a_k \begin{pmatrix} 1 \\ x_k \\ \vdots \\ x_k^m \end{pmatrix}, \quad a_k = \omega_k < p, f(x_k) >$$

Введём линейные операторы $A_1, A_2, A : \mathbb{P}_m \rightarrow \mathbb{R}$:

$$A_1(p) := \lambda^* p'(x)$$

$$A_2(p) := \sum_{k=1}^n a_k p(x_k)$$

$$A(p) := A_1(p) - A_2(p)$$

Нетрудно видеть, что наша система эквивалентна вот такому:

$$\{1, x, \dots, x^m\} \subset \ker A$$

Т.к A линейно, то это в свою очередь эквивалентно

$$\mathbb{P}_m \subset \ker A \tag{1}$$

2 Чебышёвские планы

2.1 Ищем веса в чебышёвских планах

(в этом разделе $n = m + 1$)

Вспоминаем, что $(??) \forall p \in \mathbb{P}_m$ даёт нам

$$p(t) = \sum_{k=1}^{m+1} p(x_k) L_k(t), \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Дифференцируя это равенство по t и подставляя $t = x$ получаем

$$p'(x) = \sum_{k=1}^{m+1} p(x_k) L'_k(x)$$

Получили, что $\forall p \in \mathbb{P}_m$

$$\lambda^* p'(x) = \sum_{k=1}^{m+1} p(x_k) (\lambda^* L'_k(x)) \quad (2)$$

Но из условия (1)

$$A(p) = 0, \quad \forall p \in \mathbb{P}_m$$

То есть $\forall p \in \mathbb{P}_m$

$$\lambda^* p'(x) = \sum_{k=1}^{m+1} p(x_k) (a_k) \quad (3)$$

Из (2) и (3) получаем $\forall p \in \mathbb{P}_m$

$$\sum_{k=1}^{m+1} p(x_k) (a_k) = \sum_{k=1}^{m+1} p(x_k) (\lambda^* L'_k(x))$$

Выбирая в качестве p штуки которые равны 1 и 0 где надо $(L_k(x)???)$, делаем вывод

$$a_k = \lambda^* L'_k(x), \quad \forall k \in 1 \dots m + 1$$

$$\omega_k (-1)^{k+1} = \lambda^* L'_k(x), \quad \forall k \in 1 \dots m + 1$$

$$\omega_k = (-1)^{k+1} \lambda^* L'_k(x), \quad \forall k \in 1 \dots m + 1$$

Юзая условие на веса $\sum_{k=1}^{m+1} \omega_k = 1$ ищем лямбду:

$$1 = \sum_{k=1}^{m+1} \omega_k = \sum_{k=1}^{m+1} (-1)^{k+1} \lambda^* L'_k(x) = \lambda^* \sum_{k=1}^{m+1} (-1)^{k+1} L'_k(x)$$

получаем

$$\lambda^* = \left(\sum_{k=1}^{m+1} (-1)^{k+1} L'_k(x) \right)^{-1}$$

финальное выражение для весов

$$\omega_k = \frac{(-1)^{k+1} L'_k(x)}{\sum_{i=1}^{m+1} (-1)^{i+1} L'_i(x)}, \quad \forall k \in 1 \dots m + 1$$

$$L_k(x) = \prod_{\substack{j=1 \\ k \neq j}}^{m+1} \frac{x - x_j}{x_k - x_j}, \quad k \in 1 \dots m + 1$$

2.2 Ограничение на x от весов

Мы требуем $\forall k \in 1 \dots m+1 \ \omega_k > 0$

То есть нужно решить систему неравенств относительно x :

$$\omega_k = (-1)^{k+1} \lambda^* L'_k(x) > 0, \ \forall k \in 1 \dots m+1$$

2.3 Ищем узлы в чебышёвских планах

А узлы это просто точки альтернанса полинома Чебышёва 1-го рода

$$T_m(x) = \cos(m \arccos(x))$$

Они имеют вид

$$x_{k+1} = \cos\left(\frac{(m-k)\pi}{m}\right), \ k \in 0 \dots m$$

Для $m = 4$ многочлен Чебышёва выглядит вот так:

$$T_4(x) = \cos(4 \arccos(x)) = 8x^4 - 8x^2 + 1$$

А его точки альтернанса:

$$\begin{aligned} x_1 &= \cos\left(\frac{4\pi}{4}\right) = -1 \\ x_2 &= \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ x_3 &= \cos\left(\frac{2\pi}{4}\right) = 0 \\ x_4 &= \cos\left(\frac{1\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ x_5 &= \cos\left(\frac{0\pi}{4}\right) = 1 \end{aligned}$$

Теперь найдем веса, для этого сначала выпишем базисные многочлены и их производные

$$\begin{aligned} L_1(x) &= \frac{\left(x + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) x \left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) (x-1)}{\left(-1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) (-1) \left(-1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) (-2)} \\ &= \left(x + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) x \left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) (x-1) \\ &= x^4 - x^3 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x \end{aligned}$$

$$L'_1(x) = 4x^3 - 3x^2 - x + \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned}
L_2(x) &= \frac{(x+1)x\left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)(x-1)}{\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + 1\right)\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)(-\sqrt{2})\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - 1\right)} \\
&= -2(x+1)x\left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)(x-1) \\
&= -2x^4 + \sqrt{2}x^3 + 2x^2 - \sqrt{2}x
\end{aligned}$$

$$L_2'(x) = -8x^3 + 3\sqrt{2}x^2 + 4x - \sqrt{2}$$

$$\begin{aligned}
L_3(x) &= \frac{(x+1)\left(x + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)(x-1)}{(1)\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)(-1)} \\
&= 2(x+1)\left(x + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)(x-1) \\
&= 2x^4 - 3x^2 + 1,
\end{aligned}$$

$$L_3'(x) = 8x^3 - 6x$$

$$\begin{aligned}
L_4(x) &= \frac{(x+1)\left(x + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)x(x-1)}{\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(-1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)} \\
&= -2(x+1)\left(x + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)x(x-1) \\
&= -2x^4 - \sqrt{2}x^3 + 2x^2 + \sqrt{2}x,
\end{aligned}$$

$$L_4'(x) = -8x^3 - 3\sqrt{2}x^2 + 4x + \sqrt{2}$$

$$\begin{aligned}
L_5(x) &= \frac{(x+1)\left(x + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)x\left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)}{(2)\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)(1)\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)} \\
&= (x+1)\left(x + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)x\left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \\
&= x^4 + x^3 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x
\end{aligned}$$

$$L_5'(x) = 4x^3 + 3x^2 - x - \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^5 (-1)^{k+1} L'_k(x) &= L'_1(x) - L'_2(x) + L'_3(x) - L'_4(x) + L'_5(x) = \\
&= (4x^3 - 3x^2 - x + \frac{1}{2}) \\
&\quad - (-8x^3 + 3\sqrt{2}x^2 + 4x - \sqrt{2}) \\
&\quad + (8x^3 - 6x) \\
&\quad - (-8x^3 - 3\sqrt{2}x^2 + 4x + \sqrt{2}) \\
&\quad + (4x^3 + 3x^2 - x - \frac{1}{2}) = \\
&= 32x^3 - 16x \\
&= 16x(2x^2 - 1)
\end{aligned}$$

Отсюда лямбда равна

$$\lambda^* = \left(\sum_{k=1}^{m+1} (-1)^{k+1} L'_k(x) \right)^{-1} = \frac{1}{16x(2x^2 - 1)}$$

Теперь находим веса из формулы

$$\omega_k = (-1)^{k+1} \lambda^* L'_k(x), \quad \forall k \in 1 \dots m+1$$

$$\begin{aligned}
\omega_1 &= (-1)^{1+1} \lambda^* L'_1(x) = \frac{(4x^3 - 3x^2 - x + \frac{1}{2})}{16x(2x^2 - 1)} \\
\omega_2 &= (-1)^{2+1} \lambda^* L'_2(x) = \frac{-(-8x^3 + 3\sqrt{2}x^2 + 4x - \sqrt{2})}{16x(2x^2 - 1)} \\
\omega_3 &= (-1)^{3+1} \lambda^* L'_3(x) = \frac{(8x^3 - 6x)}{16x(2x^2 - 1)} \\
\omega_4 &= (-1)^{4+1} \lambda^* L'_4(x) = \frac{-(-8x^3 - 3\sqrt{2}x^2 + 4x + \sqrt{2})}{16x(2x^2 - 1)} \\
\omega_5 &= (-1)^{5+1} \lambda^* L'_5(x) = \frac{(4x^3 + 3x^2 - x - \frac{1}{2})}{16x(2x^2 - 1)}
\end{aligned}$$

В конце концов получаем что план имеет вид

$$\begin{pmatrix} -1 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 1 \\ \frac{(4x^3-3x^2-x+\frac{1}{2})}{16x(2x^2-1)} & \frac{-(-8x^3+3\sqrt{2}x^2+4x-\sqrt{2})}{16x(2x^2-1)} & \frac{(8x^3-6x)}{16x(2x^2-1)} & \frac{-(-8x^3-3\sqrt{2}x^2+4x+\sqrt{2})}{16x(2x^2-1)} & \frac{(4x^3+3x^2-x-\frac{1}{2})}{16x(2x^2-1)} \end{pmatrix}$$

Условие положительности весов можно записать как

(По факту в секции с растяжкой решены уравнения 1,5 и уравнения 2,4 имеют симметричные корни. а уравнения 3 и 6 ваще квадраты), так что найти корни второго

$$\begin{cases} \lambda^*(4x^3 - 3x^2 - x + \frac{1}{2}) > 0 \\ -\lambda^*(-8x^3 + 3\sqrt{2}x^2 + 4x - \sqrt{2}) > 0 \\ \lambda^*(8x^3 - 6x) > 0 \\ -\lambda^*(-8x^3 - 3\sqrt{2}x^2 + 4x + \sqrt{2}) > 0 \\ \lambda^*(4x^3 + 3x^2 - x - \frac{1}{2}) > 0 \\ \lambda^* = \frac{1}{16x(2x^2-1)} \end{cases}$$

3 Получебышёвские планы

3.1 Ищем веса в получебышёвских планах

(А теперь $n = m$)

Теперь рассмотрим

$$p_0(x) = \prod_{k=1}^m (x - x_k)$$

Для него

$$A(p_0) = 0$$

И, также

$$A_2(p_0) = 0$$

Отсюда

$$A_1(p_0) = \lambda^* p'_0(x) = 0$$

При фиксированном x получаем условие на $x_k, k \in 1 \dots m$ (лямбда не ноль)

$$p'_0(x) = \frac{d}{dt} \left[\prod_{k=1}^m (t - x_k) \right]_{t=x} = 0$$

Вспоминаем, что $(??) \forall p \in \mathbb{P}_m$ даёт нам

$$p(t) = \sum_{k=1}^m p(x_k) L_k(t) + a_m(p) \prod_{k=1}^m (t - x_k) = \sum_{k=1}^m p(x_k) L_k(t) + a_m(p) p_0(t)$$

Дифференцируя это равенство по t получаем

$$p'(t) = \sum_{k=1}^m p(x_k) L'_k(t) + a_m(p) p'_0(t)$$

Подставляя $t = x$ убиваем остаток

$$p'(x) = \sum_{k=1}^m p(x_k) L'_k(x)$$

Получили, что $\forall p \in \mathbb{P}_m$

$$\lambda^* p'(x) = \sum_{k=1}^m p(x_k) (\lambda^* L'_k(x)) \quad (4)$$

Но из условия (1)

$$A(p) = 0, \quad \forall p \in \mathbb{P}_m$$

То есть $\forall p \in \mathbb{P}_m$

$$\lambda^* p'(x) = \sum_{k=1}^m p(x_k) (a_k) \quad (5)$$

Из (4) и (5) получаем $\forall p \in \mathbb{P}_m$

$$\sum_{k=1}^m p(x_k) (a_k) = \sum_{k=1}^m p(x_k) (\lambda^* L'_k(x))$$

Выбирая в качестве p штуки которые равны 1 и 0 где надо, делаем вывод

$$a_k = \lambda^* L'_k(x), \quad \forall k \in 1 \dots m$$

$$\omega_k (-1)^{k+1} = \lambda^* L'_k(x), \quad \forall k \in 1 \dots m$$

$$\omega_k = (-1)^{k+1} \lambda^* L'_k(x), \quad \forall k \in 1 \dots m$$

Юзая условие на веса $\sum_{k=1}^m \omega_k = 1$ ищем лямбду:

$$1 = \sum_{k=1}^m \omega_k = \sum_{k=1}^m (-1)^{k+1} \lambda^* L'_k(x) = \lambda^* \sum_{k=1}^m (-1)^{k+1} L'_k(x)$$

получаем

$$\lambda^* = \left(\sum_{k=1}^m (-1)^{k+1} L'_k(x) \right)^{-1}$$

финальное выражение для весов

$$\omega_k = \frac{(-1)^{k+1} L'_k(x)}{\sum_{i=1}^m (-1)^{i+1} L'_i(x)}, \quad \forall k \in 1 \dots m$$

$$L_k(x) = \prod_{\substack{j=1 \\ k \neq j}}^m \frac{x - x_j}{x_k - x_j}, \quad k \in 1 \dots m$$

3.2 Ограничение на x от весов

Мы требуем $\forall k \in 1 \dots m \quad \omega_k > 0$

То есть нужно решить систему неравенств относительно x :

$$\omega_k = (-1)^{k+1} \lambda^* L'_k(x) > 0, \quad \forall k \in 1 \dots m$$

3.3 А теперь ищем узлы

Если растяжка вправо

В таком сетапе считаем

$$-1 = x_1 < x_2 < \dots < x_m < 1 < z$$

где $x_k = at_{k-1} + b, k \in 1, \dots, m$

и $z = at_m + b$ (её игнорим)

для неких $a, b \in \mathbb{R}$, где $a > 0$ (мы их не знаем, но они явно и не нужны, главное что какое-то линейное преобразование)

а $t_k, k \in 0, \dots, m$ есть точки альтернанса полинома Чебышёва 1-го рода

$$T_m(x) = \cos(m \arccos(x))$$

Они имеют вид

$$t_k = \cos\left(\frac{(m-k)\pi}{m}\right), k \in 0 \dots m$$

Уравнения описывающие растяжение (отношение длин интервалов между точками альтернанса сохраняется)

$$\begin{aligned} \frac{x_3 - x_2}{x_2 - x_1} &= \frac{t_3 - t_2}{t_2 - t_1} \\ \frac{x_4 - x_3}{x_2 - x_1} &= \frac{t_4 - t_3}{t_2 - t_1} \\ &\dots \\ \frac{x_m - x_{m-1}}{x_2 - x_1} &= \frac{t_m - t_{m-1}}{t_2 - t_1} \end{aligned}$$

уже известно, что $x_1 = -1$, значит из первого уравнения x_3 линейно выражается через x_2 .

из второго x_4 линейно выражается через x_2 и x_3 то есть линейно через x_2

в конце концов все $x_k, k \in 1 \dots m$ линейно выражаются через x_2

Для окончательного нахождения плана достаточно найти x_2 **ИЛИ** найти a и b .

Заметим, что узлы удовлетворяют

$$p'_0(x) = \frac{d}{dt} \left[\prod_{k=1}^m (t - x_k) \right]_{t=x} = \frac{d}{dt} \left[\prod_{k=1}^m (t - (at_{k-1} + b)) \right]_{t=x} = 0$$

Введём новую переменную $s = \frac{t-b}{a}$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left[\prod_{k=1}^m (t - (at_{k-1} + b)) \right] &= \frac{1}{a} \frac{d}{dt} \left[\prod_{k=1}^m \left(\frac{t-b}{a} - t_{k-1} \right) \right] \\ \frac{d}{dt} \left[\prod_{k=1}^m \left(\frac{t-b}{a} - t_{k-1} \right) \right] &= 0 \iff \frac{d}{ds} \left[\prod_{k=1}^m (s - t_{k-1}) \right] = 0 \end{aligned}$$

В $x_k = at_{k-1} + b, k \in 1, \dots, m$ подставляем $k = 1$ и получаем

$$\begin{aligned}x_1 &= at_0 + b \\-1 &= a(-1) + b \\a &= b + 1\end{aligned}$$

Когда мы найдем значения s из

$$\frac{d}{ds} \left[\prod_{k=1}^m (s - t_{k-1}) \right] = \frac{d}{ds} \left[\prod_{k=0}^{m-1} (s - t_k) \right] = 0$$

Мы воспользуемся тем, что

$$s|_{t=x} = \frac{x-b}{a} = \frac{x-b}{b+1}$$

И отсюда найдём b , затем a

после этого можно явно выписать выражения для $x_k, k \in 1 \dots m$

Если обратиться к полиномам Чебышёва 2-го рода то можно переписать уравнение на s в виде:

$$\frac{d}{ds} \left[(s - t_0) \prod_{k=1}^{m-1} (s - t_k) \right] = \frac{d}{ds} \left[(s + 1) \prod_{k=1}^{m-1} (s - t_k) \right] = C \frac{d}{ds} [(s + 1)U_{m-1}(s)] = 0$$

Где

$$U_{m-1}(s) = \frac{\sin(m \arccos(s))}{\sin(\arccos(s))}$$

Положим $m = 4$ и в лоб решим уравнение на s

$$\frac{d}{ds} \left[\prod_{k=0}^{m-1} (s - t_k) \right] = 0$$

Явно выпишем то что дифференцируется

$$\begin{aligned}\prod_{k=0}^{m-1} (s - t_k) &= \\&= (s + 1) \left(s + \frac{1}{\sqrt{2}} \right) (s) \left(s - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \\&= (s^2 + s) \left(s^2 - \frac{1}{2} \right) \\&= s^4 + s^3 - \frac{1}{2}s^2 - \frac{1}{2}s\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{d}{ds} \left[\prod_{k=0}^{m-1} (s - t_k) \right] &= \\&= \frac{d}{ds} \left[s^4 + s^3 - \frac{1}{2}s^2 - \frac{1}{2}s \right] = \\&= 4s^3 + 3s^2 - s - \frac{1}{2} = 0\end{aligned}$$

Пытаемся решить кубическое...

Разделим уравнение на 4:

$$s^3 + \frac{3}{4}s^2 - \frac{1}{4}s - \frac{1}{8} = 0.$$

Для приведения кубического уравнения к нормальной форме сделаем замену

$$s = y - \frac{1}{4}.$$

Подставляя это выражение в исходное уравнение, получаем

$$\left(y - \frac{1}{4}\right)^3 + \frac{3}{4}\left(y - \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{1}{4}\left(y - \frac{1}{4}\right) - \frac{1}{8} = 0.$$

Раскрывая скобки, имеем

$$y^3 - \frac{3}{4}y^2 + \frac{3}{16}y - \frac{1}{64} + \frac{3}{4}\left(y^2 - \frac{1}{2}y + \frac{1}{16}\right) - \frac{1}{4}y + \frac{1}{16} - \frac{1}{8} = 0.$$

После приведения подобных слагаемых квадратичный член сокращается:

$$y^3 - \frac{7}{16}y - \frac{1}{32} = 0.$$

Таким образом, получили нормальную форму кубического уравнения

$$\boxed{y^3 - \frac{7}{16}y - \frac{1}{32} = 0.}$$

Для решения воспользуемся тригонометрической формой решения приведённого кубического уравнения

$$y^3 + py + q = 0.$$

В нашем случае

$$p = -\frac{7}{16}, \quad q = -\frac{1}{32}.$$

Поскольку $p < 0$, положим

$$y = 2\sqrt{-\frac{p}{3}} \cos \theta.$$

Имеем

$$2\sqrt{-\frac{p}{3}} = 2\sqrt{\frac{7}{48}} = \sqrt{\frac{7}{12}},$$

поэтому

$$y = \sqrt{\frac{7}{12}} \cos \theta.$$

После подстановки в уравнение $y^3 + py + q = 0$ и использования формулы

$$4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta = \cos(3\theta)$$

получаем

$$\cos(3\theta) = \frac{3q}{2p} \sqrt{-\frac{3}{p}}.$$

Вычислим правую часть:

$$\frac{3q}{2p} = \frac{3(-1/32)}{2(-7/16)} = \frac{3}{28},$$

а

$$\sqrt{-\frac{3}{p}} = \sqrt{\frac{48}{7}} = 4\sqrt{\frac{3}{7}}.$$

Следовательно,

$$\cos(3\theta) = \frac{3}{28} 4\sqrt{\frac{3}{7}} = \frac{3}{7} \sqrt{\frac{3}{7}} = \frac{3\sqrt{21}}{49}.$$

Таким образом,

$$\boxed{\cos(3\theta) = \frac{3\sqrt{21}}{49}}.$$

Обозначим

$$\varphi = \arccos\left(\frac{3\sqrt{21}}{49}\right).$$

Тогда три значения угла имеют вид

$$\theta_k = \frac{\varphi + 2\pi k}{3}, \quad k = 0, 1, 2.$$

Следовательно, три корня уравнения для y равны

$$y_k = \sqrt{\frac{7}{12}} \cos\left(\frac{1}{3} \arccos\left(\frac{3\sqrt{21}}{49}\right) + \frac{2\pi k}{3}\right), \quad k = 0, 1, 2.$$

Возвращаясь к переменной s , поскольку

$$s = y - \frac{1}{4},$$

получаем

$$\boxed{s_k = -\frac{1}{4} + \sqrt{\frac{7}{12}} \cos\left(\frac{1}{3} \arccos\left(\frac{3\sqrt{21}}{49}\right) + \frac{2\pi k}{3}\right), \quad k = 0, 1, 2.}$$

Численные значения корней:

$$\boxed{s_1 \approx -0.8723, \quad s_2 \approx -0.3222, \quad s_0 \approx 0.4446.}$$

Выражаем параметры растяжения через s

$$\begin{aligned} s|_{t=x} &= \frac{x-b}{a} = \frac{x-b}{b+1} \\ s(b+1) &= x-b \\ b &= \frac{x-s}{s+1} \\ a = b+1 &= \frac{x-s}{s+1} + 1 = \frac{x+1}{s+1} \end{aligned}$$

Узлы получаем через

$$x_k = at_{k-1} + b = \frac{(x+1)t_{k-1} + x - s}{s+1} = \frac{x(1+t_{k-1}) + (t_{k-1} - s)}{s+1}, \quad k \in 1, \dots, m$$

3.4 Ограничение на x от узлов

Вспоминаем геометрию узлов:

$$-1 = x_1 < x_2 < \dots < x_m < 1 < z$$

Отсюда, с учетом растяжения вправо ограничение на x :

$$x_m = x_m(x) \in (t_{m-1}, 1)$$

Хотим растяжение с положительным коэффициентом

$$a = \frac{x+1}{s+1} > 0$$

С учетом того что все корни $s > -1$ получаем условие

$$x > -1$$

Остается условие

$$\begin{aligned} t_{m-1} &< x_m < 1 \\ t_{m-1} &< at_{m-1} + b < 1 \\ t_{m-1} &< \frac{x+1}{s+1}t_{m-1} + \frac{x-s}{s+1} < 1 \\ t_{m-1}(s+1) &< (x+1)t_{m-1} + x - s < s+1 \\ s(1+t_{m-1}) &< x(1+t_{m-1}) < 2s+1-t_{m-1} \\ s &< x < \frac{2s+1-t_{m-1}}{(1+t_{m-1})} \end{aligned}$$

Итого

$$x \in \left(s, \frac{2s+1-t_{m-1}}{(1+t_{m-1})} \right) = \left\{ \begin{pmatrix} s_1, & \frac{2s_1+1-t_{m-1}}{(1+t_{m-1})} \\ s_2, & \frac{2s_2+1-t_{m-1}}{(1+t_{m-1})} \\ s_0, & \frac{2s_0+1-t_{m-1}}{(1+t_{m-1})} \end{pmatrix} \right\} \approx \left\{ \begin{pmatrix} -0.8723, & -0.8503 \\ -0.3222, & -0.2059 \\ 0.4446, & 0.6924 \end{pmatrix} \right.$$

Если растяжка влево

В таком сетапе считаем

$$z < -1 < x_1 < \dots < x_{m-1} < x_m = 1$$

где $x_k = at_k + b, k \in 1, \dots, m$

и $z = at_0 + b, a > 0$ (её игнорим)

для неких $a, b \in \mathbb{R}$ (мы их не знаем, но они явно и не нужны, главное что какое-то линейное преобразование)

а $t_k, k \in 0, \dots, m$ есть точки альтернанса полинома Чебышёва 1-го рода

$$T_m(x) = \cos(m \arccos(x))$$

Они имеют вид

$$t_k = \cos\left(\frac{(m-k)\pi}{m}\right), k \in 0 \dots m$$

Уравнения описывающие растяжение (отношение длин интервалов между точками альтернанса сохраняется)

$$\frac{x_{m-1} - x_{m-2}}{x_m - x_{m-1}} = \frac{t_{m-1} - t_{m-2}}{t_m - t_{m-1}}$$

$$\frac{x_{m-2} - x_{m-3}}{x_m - x_{m-1}} = \frac{t_{m-1} - t_{m-2}}{t_m - t_{m-1}}$$

...

$$\frac{x_2 - x_1}{x_m - x_{m-1}} = \frac{t_2 - t_1}{t_m - t_{m-1}}$$

уже известно, что $x_m = -1$, значит из первого уравнения x_{m-2} линейно выражается через x_{m-1} .

из второго x_{m-3} линейно выражается через x_{m-2} и x_{m-1} то есть линейно через x_{m-1} в конце концов все $x_k, k \in 1 \dots m$ линейно выражаются через x_{m-1}

Для окончательного нахождения плана достаточно найти x_{m-1} **ИЛИ** найти a и b .

Для поиска узлов используем

$$p'_0(x) = \frac{d}{dt} \left[\prod_{k=1}^m (t - x_k) \right]_{t=x} = \frac{d}{dt} \left[\prod_{k=1}^m (t - (at_k + b)) \right]_{t=x} = 0$$

Введём новую переменную $s = \frac{t-b}{a}$

$$\frac{d}{dt} \left[\prod_{k=1}^m (t - (at_k + b)) \right] = \frac{1}{a} \frac{d}{dt} \left[\prod_{k=1}^m \left(\frac{t-b}{a} - t_k \right) \right]$$

$$\frac{d}{dt} \left[\prod_{k=1}^m \left(\frac{t-b}{a} - t_k \right) \right] = 0 \iff \frac{d}{ds} \left[\prod_{k=1}^m (s - t_k) \right] = 0$$

В $x_k = at_k + b, k \in 1, \dots, m$ подставляем $k = m$ и получаем

$$x_m = at_m + b$$

$$1 = a(1) + b$$

$$a = 1 - b$$

Когда мы найдем значения s из

$$\frac{d}{ds} \left[\prod_{k=1}^m (s - t_k) \right] = 0$$

Мы воспользуемся тем, что

$$s|_{t=x} = \frac{x - b}{a} = \frac{x - b}{1 - b}$$

И отсюда найдём b , затем a

после этого можно явно выписать выражения для $x_k, k \in 1 \dots m$

Если обратиться к полиномам Чебышёва 2-го рода то можно переписать уравнение на s в виде:

$$\frac{d}{ds} \left[(s - t_m) \prod_{k=1}^{m-1} (s - t_k) \right] = \frac{d}{ds} \left[(s - 1) \prod_{k=1}^{m-1} (s - t_k) \right] = C \frac{d}{ds} [(s - 1)U_{m-1}(s)] = 0$$

Где

$$U_{m-1}(s) = \frac{\sin(m \arccos(s))}{\sin(\arccos(s))}$$

Положим $m = 4$ и в лоб решим уравнение на s

$$\frac{d}{ds} \left[\prod_{k=1}^m (s - t_k) \right] = 0$$

Явно выпишем то что дифференцируется

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^m (s - t_k) &= \\ &= \left(s + \frac{1}{\sqrt{2}} \right) (s) \left(s - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) (s - 1) = \\ &= (s^2 - s) \left(s^2 - \frac{1}{2} \right) \\ &= s^4 - s^3 - \frac{1}{2}s^2 + \frac{1}{2}s \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds} \left[\prod_{k=1}^m (s - t_k) \right] &= \\ &= \frac{d}{ds} \left[s^4 - s^3 - \frac{1}{2}s^2 + \frac{1}{2}s \right] = \\ &= 4s^3 - 3s^2 - s + \frac{1}{2} = 0 \end{aligned}$$

Пытаемся решить кубическое...

Разделим уравнение на 4:

$$s^3 - \frac{3}{4}s^2 - \frac{1}{4}s + \frac{1}{8} = 0.$$

Для приведения кубического уравнения к нормальной форме сделаем замену

$$s = y + \frac{1}{4}.$$

Подставляя это выражение в исходное уравнение, получаем

$$\left(y + \frac{1}{4}\right)^3 - \frac{3}{4}\left(y + \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{1}{4}\left(y + \frac{1}{4}\right) + \frac{1}{8} = 0.$$

Раскрывая скобки, имеем

$$y^3 + \frac{3}{4}y^2 + \frac{3}{16}y + \frac{1}{64} - \frac{3}{4}\left(y^2 + \frac{1}{2}y + \frac{1}{16}\right) - \frac{1}{4}y - \frac{1}{16} + \frac{1}{8} = 0.$$

После приведения подобных слагаемых квадратичный член сокращается:

$$y^3 - \frac{7}{16}y + \frac{1}{32} = 0.$$

Таким образом, получили нормальную форму кубического уравнения

$$\boxed{y^3 - \frac{7}{16}y + \frac{1}{32} = 0.}$$

Для решения воспользуемся тригонометрической формой решения приведённого кубического уравнения

$$y^3 + py + q = 0.$$

В нашем случае

$$p = -\frac{7}{16}, \quad q = \frac{1}{32}.$$

Поскольку $p < 0$, положим

$$y = 2\sqrt{-\frac{p}{3}} \cos \theta.$$

Имеем

$$2\sqrt{-\frac{p}{3}} = 2\sqrt{\frac{7}{48}} = \sqrt{\frac{7}{12}},$$

поэтому

$$y = \sqrt{\frac{7}{12}} \cos \theta.$$

После подстановки в уравнение $y^3 + py + q = 0$ и использования формулы

$$4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta = \cos(3\theta)$$

получаем

$$\cos(3\theta) = \frac{3q}{2p} \sqrt{-\frac{3}{p}}.$$

Вычислим правую часть:

$$\frac{3q}{2p} = \frac{3(1/32)}{2(-7/16)} = -\frac{3}{28},$$

а

$$\sqrt{-\frac{3}{p}} = \sqrt{\frac{48}{7}} = 4\sqrt{\frac{3}{7}}.$$

Следовательно,

$$\cos(3\theta) = -\frac{3}{28} 4\sqrt{\frac{3}{7}} = -\frac{3}{7} \sqrt{\frac{3}{7}} = -\frac{3\sqrt{21}}{49}.$$

Таким образом,

$$\boxed{\cos(3\theta) = -\frac{3\sqrt{21}}{49}.$$

Обозначим

$$\varphi = \arccos \left(-\frac{3\sqrt{21}}{49} \right).$$

Тогда три значения угла имеют вид

$$\theta_k = \frac{\varphi + 2\pi k}{3}, \quad k = 0, 1, 2.$$

Следовательно, три корня уравнения для y равны

$$y_k = \sqrt{\frac{7}{12}} \cos \left(\frac{1}{3} \arccos \left(-\frac{3\sqrt{21}}{49} \right) + \frac{2\pi k}{3} \right), \quad k = 0, 1, 2.$$

Возвращаясь к переменной s , поскольку

$$s = y + \frac{1}{4},$$

получаем

$$\boxed{s_k = \frac{1}{4} + \sqrt{\frac{7}{12}} \cos \left(\frac{1}{3} \arccos \left(-\frac{3\sqrt{21}}{49} \right) + \frac{2\pi k}{3} \right), \quad k = 0, 1, 2.}$$

Численные значения корней:

$$\boxed{s_0 \approx 0.8723, \quad s_1 \approx 0.3222, \quad s_2 \approx -0.4446.}$$

Выражаем параметры растяжения через s

$$\begin{aligned} s|_{t=x} &= \frac{x-b}{a} = \frac{x-b}{1-b} \\ s(1-b) &= x-b \\ b &= \frac{x-s}{1-s} \\ a = 1-b &= 1 - \frac{x-s}{1-s} = \frac{1-x}{1-s} \end{aligned}$$

Узлы получаем через

$$x_k = at_k + b = \frac{(1-x)t_k + x-s}{1-s} = \frac{x(1-t_k) + (t_k-s)}{1-s}, \quad k \in 1, \dots, m$$

3.5 Ограничение на x от узлов

Вспоминаем геометрию узлов:

$$z < -1 < x_1 < \dots < x_{m-1} < x_m = 1$$

Отсюда, с учетом растяжения влево ограничение на x :

$$x_1 = x_1(x) \in (-1, t_1)$$

Хотим растяжение с положительным коэффициентом

$$a = \frac{1-x}{1-s} > 0$$

С учетом того что все корни $s < 1$ получаем условие

$$x < 1$$

Остается условие

$$\begin{aligned} -1 &< x_1 < t_1 \\ -1 &< at_1 + b < t_1 \\ -1 &< \frac{1-x}{1-s}t_1 + \frac{x-s}{1-s} < t_1 \\ s-1 &< (1-x)t_1 + x-s < (1-s)t_1 \\ 2s-1-t_1 &< x(1-t_1) < s(1-t_1) \\ \frac{2s-1-t_1}{(1-t_1)} &< x < s \end{aligned}$$

Итого

$$x \in \left(\frac{2s-1-t_1}{(1-t_1)}, \quad s \right) = \left\{ \begin{pmatrix} \frac{2s_2-1-t_1}{(1-t_1)}, & s_2 \\ \frac{2s_1-1-t_1}{(1-t_1)}, & s_1 \\ \frac{2s_0-1-t_1}{(1-t_1)}, & s_0 \end{pmatrix} \right\} \approx \left\{ \begin{pmatrix} -0.6924, & -0.4446 \\ 0.2059, & 0.3222 \\ 0.8503, & 0.8723 \end{pmatrix} \right\}$$

4 Два узла на границе

4.1 Веса

Они получаются такими же как и в получебышёвском случае:

$$\omega_k = \frac{(-1)^{k+1} L'_k(x)}{\sum_{i=1}^m (-1)^{i+1} L'_i(x)}, \quad \forall k \in 1 \dots m$$

$$L_k(x) = \prod_{\substack{j=1 \\ k \neq j}}^m \frac{x - x_j}{x_k - x_j}, \quad k \in 1 \dots m$$

4.2 Ограничение на x от весов

Мы требуем $\forall k \in 1 \dots m \quad \omega_k > 0$

То есть нужно решить систему неравенств относительно x :

$$\omega_k = (-1)^{k+1} \lambda^* L'_k(x) > 0, \quad \forall k \in 1 \dots m$$

4.3 Узлы

Теперь узлы должны быть расположены следующим образом:

$$-1 = x_1 < x_2 < \dots < x_{m-1} < x_m = 1$$

5 Решение системы

5.1 Исходная система

Фиксируем $x \in \mathbb{R}$ и рассматриваем

$$f(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ x^2 \\ x^3 \\ x^4 \end{pmatrix}, \quad c = f'(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2x \\ 3x^2 \\ 4x^3 \end{pmatrix}.$$

Пусть

$$\xi = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ \omega_1 & \omega_2 & \omega_3 & \omega_4 \end{pmatrix}.$$

При $m = n = 4$ имеем

$$\lambda^* \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2x \\ 3x^2 \\ 4x^3 \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^4 (-1)^{k+1} \omega_k \begin{pmatrix} 1 \\ x_k \\ x_k^2 \\ x_k^3 \\ x_k^4 \end{pmatrix}.$$

Фиксируем крайние узлы

$$x_1 = -1, \quad x_4 = 1.$$

Для удобства обозначим

$$x_2 = u, \quad x_3 = v.$$

Таким образом,

$$x_1 = -1, \quad x_2 = u, \quad x_3 = v, \quad x_4 = 1.$$

5.2 Система по компонентам

После покомпонентного раскрытия получаем

$$\begin{cases} \omega_1 - \omega_2 + \omega_3 - \omega_4 = 0, \\ -\omega_1 - \omega_2 u + \omega_3 v - \omega_4 = \lambda^*, \\ \omega_1 - \omega_2 u^2 + \omega_3 v^2 - \omega_4 = 2\lambda^* x, \\ -\omega_1 - \omega_2 u^3 + \omega_3 v^3 - \omega_4 = 3\lambda^* x^2, \\ \omega_1 - \omega_2 u^4 + \omega_3 v^4 - \omega_4 = 4\lambda^* x^3. \end{cases}$$

Дополнительно выполняется условие нормировки

$$\omega_1 + \omega_2 + \omega_3 + \omega_4 = 1.$$

5.3 Выражение ω_3 и ω_4

Из первого уравнения системы имеем

$$\omega_3 - \omega_4 = \omega_2 - \omega_1.$$

Из условия нормировки

$$\omega_3 + \omega_4 = 1 - \omega_1 - \omega_2.$$

Складывая и вычитая эти равенства, получаем

$$\boxed{\omega_3 = \frac{1}{2} - \omega_1}$$

и

$$\boxed{\omega_4 = \frac{1}{2} - \omega_2.}$$

Следовательно,

$$\omega_1 = \omega_1, \quad \omega_2 = \omega_2, \quad \omega_3 = \frac{1}{2} - \omega_1, \quad \omega_4 = \frac{1}{2} - \omega_2.$$

5.4 Исключение λ^*

Введём обозначение

$$M_r = (-1)^r \omega_1 - \omega_2 u^r + \left(\frac{1}{2} - \omega_1 \right) v^r - \left(\frac{1}{2} - \omega_2 \right).$$

Тогда четыре ненулевых уравнения исходной системы принимают вид

$$M_1 = \lambda^*,$$

$$M_2 = 2\lambda^* x,$$

$$M_3 = 3\lambda^* x^2,$$

$$M_4 = 4\lambda^* x^3.$$

Из первого равенства

$$\lambda^* = M_1.$$

Поэтому вместо остальных трёх уравнений можно рассматривать

$$F_1 = M_2 - 2xM_1 = 0,$$

$$F_2 = M_3 - 3x^2M_1 = 0,$$

$$F_3 = M_4 - 4x^3M_1 = 0.$$

После раскрытия скобок получаем

$$F_1 = \omega_1(1 + 2x) + \omega_2(2u - 2x) + \frac{v^2 - v}{2} - 1 + x = 0,$$

$$F_2 = \omega_1(3x^2 - 1) + \omega_2(3x^2u - u^3) + \frac{v^3 - 3x^2v}{2} - 1 + 3x^2 = 0,$$

$$F_3 = \omega_1(1 + 4x^3) + \omega_2(4x^3u - u^4) + \frac{v^4 - 4x^3v}{2} - 1 + 4x^3 = 0.$$

5.5 Базисные многочлены Лагранжа

Для узлов

$$-1, \quad u, \quad v, \quad 1$$

базисные многочлены Лагранжа имеют вид

$$L_k(t) = \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^4 \frac{t - x_j}{x_k - x_j}.$$

Их производные в точке x имеют вид

$$L'_1(x) = -\frac{uv - 2ux + u - 2vx + v + 3x^2 - 2x}{2(u+1)(v+1)}.$$

Для второго узла

$$L'_2(x) = \frac{-2vx + v + 3x^2 - 2x - 1}{(u-1)(u+1)(u-v)}.$$

Для третьего узла

$$L'_3(x) = \frac{2ux - u - 3x^2 + 2x + 1}{(u-v)(v-1)(v+1)}.$$

Для четвёртого узла

$$L'_4(x) = \frac{uv - 2ux - u - 2vx - v + 3x^2 + 2x}{2(u-1)(v-1)}.$$

5.6 Выражение весов через u и v

Используем формулу

$$\omega_k = \frac{(-1)^{k+1} L'_k(x)}{\sum_{i=1}^4 (-1)^{i+1} L'_i(x)}.$$

Введём обозначение

$$D = L'_1(x) - L'_2(x) + L'_3(x) - L'_4(x).$$

Тогда

$$\omega_1 = \frac{L'_1(x)}{D}, \quad \omega_2 = -\frac{L'_2(x)}{D},$$

$$\omega_3 = \frac{L'_3(x)}{D}, \quad \omega_4 = -\frac{L'_4(x)}{D}.$$

То есть

$$\omega_1 = -\frac{uv - 2ux + u - 2vx + v + 3x^2 - 2x}{2(u+1)(v+1)D}.$$

$$\omega_2 = -\frac{-2vx + v + 3x^2 - 2x - 1}{(u-1)(u+1)(u-v)D}.$$

$$\omega_3 = \frac{2ux - u - 3x^2 + 2x + 1}{(u-v)(v-1)(v+1)D}.$$

$$\omega_4 = -\frac{uv - 2ux - u - 2vx - v + 3x^2 + 2x}{2(u-1)(v-1)D}.$$

5.7 Подстановка весов в систему

Подставляя найденные выражения для весов в

$$F_1 = 0, \quad F_2 = 0, \quad F_3 = 0,$$

после сокращения общих множителей получаем

$$\boxed{F_1 \equiv 0,}$$

$$\boxed{F_2 \equiv 0.}$$

Из третьего уравнения остаётся нетривиальное условие

$$\boxed{2uvx - 3uv - 3ux^2 + 2ux + 2u - 3vx^2 + 2vx + 2v + 4x^3 - 3x^2 - 2x = 0.}$$

Таким образом, это единственное дополнительное уравнение на u и v , которое остаётся после использования формулы оптимальных весов.

5.8 Условие $x_3 - x_2 = \alpha$

Добавим дополнительное условие

$$x_3 - x_2 = \alpha.$$

Поскольку

$$x_2 = u, \quad x_3 = v,$$

получаем

$$v - u = \alpha.$$

Следовательно,

$$\boxed{v = u + \alpha.}$$

Таким образом,

$$\boxed{x_2 = u, \quad x_3 = u + \alpha.}$$

5.9 Подстановка $v = u + \alpha$

Подставляем

$$v = u + \alpha$$

в уравнение

$$2uvx - 3uv - 3ux^2 + 2ux + 2u - 3vx^2 + 2vx + 2v + 4x^3 - 3x^2 - 2x = 0.$$

Получаем

$$2u(u + \alpha)x - 3u(u + \alpha) - 3ux^2 + 2ux + 2u - 3(u + \alpha)x^2 + 2(u + \alpha)x + 2(u + \alpha) + 4x^3 - 3x^2 - 2x = 0.$$

Собирая слагаемые по степеням u , получаем

$$(2x - 3)u^2 + (2\alpha x - 3\alpha - 6x^2 + 4x + 4)u + (-3\alpha x^2 + 2\alpha x + 2\alpha + 4x^3 - 3x^2 - 2x) = 0.$$

5.10 Введение A, B, C

Для компактности обозначим

$$A = 2x - 3,$$

$$B = 2\alpha x - 3\alpha - 6x^2 + 4x + 4,$$

$$C = -3\alpha x^2 + 2\alpha x + 2\alpha + 4x^3 - 3x^2 - 2x.$$

Тогда уравнение для $u = x_2$ принимает стандартный вид

$$Au^2 + Bu + C = 0.$$

При условии

$$2x - 3 \neq 0$$

получаем

$$x_2 = u = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}.$$

Непосредственно через x и α :

$$x_2 = \frac{-(2\alpha x - 3\alpha - 6x^2 + 4x + 4) \pm \sqrt{(2\alpha x - 3\alpha - 6x^2 + 4x + 4)^2 - 4(2x - 3)(-3\alpha x^2 + 2\alpha x + 2\alpha + 4x^3 - 3x^2 - 2x)}}{2(2x - 3)}$$

После этого

$$x_3 = x_2 + \alpha.$$

Или, используя обозначения A, B, C ,

$$x_3 = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} + \alpha.$$

Знак $\pm$ должен быть выбран согласованно для x_2 и x_3 .

5.11 Восстановление весов

После нахождения x_2 и x_3 подставляем их в

$$D = L'_1(x) - L'_2(x) + L'_3(x) - L'_4(x).$$

Тогда веса определяются формулами

$$\omega_1 = \frac{L'_1(x)}{D}, \quad \omega_2 = -\frac{L'_2(x)}{D},$$

$$\omega_3 = \frac{L'_3(x)}{D}, \quad \omega_4 = -\frac{L'_4(x)}{D}.$$

При этом выполняются соотношения

$$\omega_3 = \frac{1}{2} - \omega_1, \quad \omega_4 = \frac{1}{2} - \omega_2.$$

5.12 Восстановление λ^*

Из первого ненулевого уравнения исходной системы

$$-\omega_1 - \omega_2 x_2 + \omega_3 x_3 - \omega_4 = \lambda^*$$

получаем

$$\lambda^* = -\omega_1 - \omega_2 x_2 + \omega_3 x_3 - \omega_4.$$

С учётом

$$x_2 = u, \quad x_3 = u + \alpha$$

имеем

$$\lambda^* = -\omega_1 - \omega_2 u + \omega_3(u + \alpha) - \omega_4.$$

Используя

$$\omega_3 = \frac{1}{2} - \omega_1, \quad \omega_4 = \frac{1}{2} - \omega_2,$$

получаем

$$\lambda^* = -\omega_1 - \omega_2 u + \left(\frac{1}{2} - \omega_1\right)(u + \alpha) - \left(\frac{1}{2} - \omega_2\right).$$

5.13 Итоговая схема решения

Таким образом,

$$x_1 = -1, \quad x_4 = 1, \quad x_3 - x_2 = \alpha.$$

Полагая

$$x_2 = u, \quad x_3 = u + \alpha,$$

получаем

$$x_2 = u, \quad x_3 = u + \alpha.$$

Значение u определяется из квадратного уравнения

$$(2x - 3)u^2 + (2\alpha x - 3\alpha - 6x^2 + 4x + 4)u + (-3\alpha x^2 + 2\alpha x + 2\alpha + 4x^3 - 3x^2 - 2x) = 0.$$

При $2x - 3 \neq 0$

$$x_2 = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}, \quad x_3 = x_2 + \alpha,$$

где

$$A = 2x - 3,$$

$$B = 2\alpha x - 3\alpha - 6x^2 + 4x + 4,$$

$$C = -3\alpha x^2 + 2\alpha x + 2\alpha + 4x^3 - 3x^2 - 2x.$$

После определения узлов вычисляются веса:

$$\omega_k = \frac{(-1)^{k+1} L'_k(x)}{L'_1(x) - L'_2(x) + L'_3(x) - L'_4(x)}.$$

Наконец,

$$\lambda^* = -\omega_1 - \omega_2 x_2 + \omega_3 x_3 - \omega_4.$$

При выборе ветви $\pm$ необходимо учитывать допустимость узлов

$$-1 < x_2 < x_3 < 1$$

и ненулевость знаменателей, возникающих в формулах для многочленов Лагранжа.