CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 · CHAPITRE 11
DYSFONCTIONNEMENT DU SYSTÈME IMMUNITAIRE : TRANSMISSION ET PRÉVENTION DU VIH

Correction de l'exercice 1 : Vrai ou faux sur la transmission

1) **Juste**. 2) **Faux** : la séropositivité est une phase **sans signes**. 3) **Faux** : la salive ne transmet pas le VIH. 4) **Faux** : ils sont **spécifiques** du VIH. 5) **Juste**. 6) **Faux** : il se transmet aussi par le sang et de la mère à l'enfant. 7) **Faux** : une personne séropositive peut transmettre le VIH, même sans signes. 8) **Juste**. 9) **Faux** : le moustique ne transmet pas le VIH.

Correction de l'exercice 2 : Situations et modes de contamination

1-**c** ; 2-**d** ; 3-**b** ; 4-**a**. Liquides : le **sang**, les **sécrétions sexuelles** (sperme, sécrétions vaginales) et le **lait maternel**.

Correction de l'exercice 3 : Définitions et vrai ou faux

1) **Pandémie** : épidémie qui touche de nombreux pays sur plusieurs continents. **Sida** : syndrome d'immunodéficience acquise, stade avancé de l'infection par le VIH. **VIH** : virus de l'immunodéficience humaine, qui détruit les lymphocytes T4. **Séropositivité** : présence d'anticorps anti-VIH dans le sang. **Maladies opportunistes** : maladies qui profitent de l'affaiblissement du système immunitaire. 2) a) **Faux** : ces anticorps ne parviennent pas à éliminer le virus. b) **Faux** : elles sont la **conséquence** de l'affaiblissement du système immunitaire. c) **Vrai**.

Correction de l'exercice 4 : De la mère à l'enfant

1) Pendant la grossesse (à travers le placenta), pendant l'accouchement et pendant l'allaitement. 2) Sans traitement, le risque est élevé, surtout avec l'allaitement (jusqu'à 45 %). Avec le traitement de la mère et du bébé, il devient très faible (moins de 2 %). 3) Pour traiter les femmes séropositives et protéger leur enfant (prévention de la transmission de la mère à l'enfant). 4) **Non** : ces anticorps peuvent venir de la mère (ils traversent le placenta) ; il faut rechercher le virus lui-même ou refaire le test après la disparition des anticorps maternels.

Correction de l'exercice 5 : Risque ou pas de risque ?

Risque : lame de rasoir partagée, tatouage ou scarification avec instruments non stérilisés, relation sexuelle non protégée, seringue déjà utilisée. Pas de risque : serrer la main, partager le repas et les couverts, piqûre de moustique, piscine.
Prévention : utiliser des objets tranchants personnels ou stérilisés ; abstinence, fidélité ou usage du préservatif ; ne jamais partager de seringues ; se faire dépister.

Correction de l'exercice 6 : Un camarade séropositif

1) **Non** : le VIH ne se transmet pas par le contact de la peau, la sueur, la salive ou l'air ; s'asseoir à côté ou jouer au football ne présente aucun risque. 2) C'est de la **discrimination** (stigmatisation). Ousmane est isolé, triste, risque d'abandonner l'école et de perdre confiance en lui. 3) Par peur d'être rejetées, les personnes n'osent pas se faire dépister ni suivre leur traitement : le virus continue de se transmettre. 4) Exemple : « Le VIH ne s'attrape pas en jouant ou en partageant un banc. Ousmane est notre camarade ; il a besoin de notre soutien. Rejeter quelqu'un est injuste et n'aide personne. »