
CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 6
LES ORGANES GÉNITAUX, LEUR RÔLE ET LE CYCLE SEXUEL

Correction de l'exercice 1 : L'appareil génital de la femme


1) Titre : **Schéma de l'appareil génital de la femme (vue de face)**.



2) Gonades : **ovaires**. Voies génitales : **pavillons, trompes, utérus, vagin**. Organe d'accouplement : **vagin et vulve**.
3) Ils sont situés à l'intérieur de l'abdomen (dans le bassin), contrairement aux testicules de l'homme logés dans les bourses, à l'extérieur.

Correction de l'exercice 2 : L'appareil génital de l'homme


1) Titre : **Schéma de l'appareil génital de l'homme (coupe simplifiée)**.




2) Testicule → épididyme → spermiducte → (passage près des vésicules séminales et dans la prostate) → urètre → pénis → extérieur.
3) Elles produisent le **liquide séminal** qui se mélange aux spermatozoïdes pour former le **sperme** ; ce liquide les nourrit et facilite leur déplacement.
4) L'**urètre** (urospermiducte).

Correction de l'exercice 3 : Les cellules reproductrices

1) A : **spermatozoïde** ; B : **ovule**.



A



B

2) Spermatozoïde : dans les **testicules** ; ovule : dans les **ovaires**.
3) Le spermatozoïde est très petit (environ 0,06 mm), allongé, mobile grâce à son flagelle et produit en très grand nombre (des millions par jour). L'ovule est gros (environ 0,1 à 0,15 mm), sphérique, immobile, et produit à raison d'un seul par cycle.
4) Le flagelle permet au spermatozoïde de se **déplacer** dans les voies génitales de la femme jusqu'à l'ovule.
5) Le testicule produit des spermatozoïdes de façon **continue** de la puberté jusqu'à un âge avancé ; l'ovaire libère un ovule de façon **cyclique** (environ un tous les 28 jours) de la puberté à la ménopause.

Correction de l'exercice 4 : Le rôle des testicules et des ovaires

1) Les testicules sont nécessaires à la **fertilité** (production des spermatozoïdes) et à l'**apparition des caractères sexuels secondaires**.
2) La testostérone remplace les testicules pour l'apparition des caractères sexuels secondaires : c'est l'**hormone mâle** produite par les testicules. Elle est transportée par le **sang** jusqu'aux organes cibles.
3) Il n'a plus de testicules : il ne produit pas de **spermatozoïdes**.
4) Les ovaires ont une **double fonction** : la production des **ovules** (fonction reproductrice) et la production d'**hormones** sexuelles, les **œstrogènes** et la **progestérone**, responsables des caractères sexuels secondaires et du cycle utérin.

Correction de l'exercice 5 : La température au cours du cycle

1) Du jour 1 au jour 14, la température est **basse** (environ 36,5 °C) avec un petit creux le jour 14 (36,4 °C) ; le jour 15, elle **s'élève** brusquement et reste haute (environ 37 °C) jusqu'au jour 26 ; elle redescend à la fin du cycle.
2) L'ovulation a lieu vers le **14e jour**, juste avant l'élévation de la température (au point le plus bas).
3) La **progestérone**.
4) Phase **folliculaire** (pré-ovulatoire), du jour 1 au jour 14 : 14 jours ; phase **lutéale** (post-ovulatoire), du jour 15 au jour 28 : 14 jours.
5) La phase post-ovulatoire dure toujours environ 14 jours : ovulation au jour $32 - 14 = \mathbf{18}$.

Correction de l'exercice 6 : Le cycle sexuel de la femme

Dans l'ordre : **28**, **règles**, **follicule**, **14**, **ovulation**, **corps jaune**, **progestérone**, **fécondation**, **muqueuse utérine**, **ménopause**.