CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE 8
COMMENT ÉVITER UNE GROSSESSE ?
L'ABSTINENCE ET LES MÉTHODES NATURELLES

Correction de l'exercice 1 : Les méthodes naturelles

1) L'abstinence périodique, la méthode du **calendrier** (Ogino), la méthode des **températures**, la méthode de la **glaire cervicale**.
2) L'**abstinence** est la privation volontaire des rapports sexuels. Abstinence **définitive** : ne pas avoir de rapports sexuels jusqu'au mariage. Abstinence **périodique** : éviter les rapports seulement pendant la période fertile du cycle.
3) Elles ne bloquent ni l'ovulation ni les spermatozoïdes : elles servent seulement à repérer la période fertile ; pour éviter la grossesse, il faut s'abstenir de rapports pendant cette période.
4) La date de l'ovulation varie d'un cycle à l'autre (stress, maladie, voyage) et les signes sont parfois difficiles à interpréter ; les spermatozoïdes peuvent survivre plusieurs jours.

Correction de l'exercice 2 : La méthode du calendrier

1) Les spermatozoïdes vivent 3 jours : un rapport à partir du 11e jour peut être fécond ; l'ovule vit 1 jour : jusqu'au 15e jour. Période féconde : du **11e au 15e jour**.
2) Avec 2 jours de marge : du **9e au 17e jour**.
3) Cycle de 26 jours : ovulation au jour $26 - 14 = 12$. Cycle de 32 jours : ovulation au jour $32 - 14 = 18$. L'ovulation se situe entre le **12e** et le **18e jour**.
4) La date d'ovulation est imprévisible : la période d'abstinence devient très longue (du 9e au 20e jour environ, avec les marges) et le risque d'erreur est grand.

Correction de l'exercice 3 : La méthode de la glaire cervicale

1) Du **10e au 15e jour**, lorsque la vulve est humide ou mouillée : c'est la présence de glaire, qui permet la survie et la montée des spermatozoïdes.
2) Vers le **14e jour** : dernier jour de glaire « mouillée » ; la glaire disparaît le lendemain de l'ovulation (jour 16 sec).
3) Pour éviter une grossesse : pas de rapports du 10e au 15e jour (période humide), en pratique jusqu'au 16e jour. Pour avoir un enfant : rapports pendant les jours « mouillés » (12e au 14e jour).
4) Elle est gratuite, sans produit ni effet secondaire, accessible à toutes les femmes après une simple formation, et favorise le dialogue dans le couple.

Correction de l'exercice 4 : Grossesses précoces en milieu scolaire

1) Abandon des études ; complications à l'accouchement (déchirures, césarienne, hémorragie) ; rejet par la famille ou honte ; difficultés pour élever l'enfant ; tentation d'avortement clandestin dangereux.
2) Son bassin est encore étroit et ses organes ne sont pas totalement développés : risques d'accouchement difficile, de bébé de faible poids et de décès de la mère ou de l'enfant.
3) L'**abstinence**.
4) Elle évite les grossesses non désirées ; protège contre les IST et le VIH ; permet de poursuivre ses études ; ne coûte rien et n'a aucun effet secondaire ; renforce la confiance et la fidélité dans le futur couple.
5) Exemple : « Ton avenir passe par tes études. Une grossesse précoce peut tout arrêter. Choisis l'abstinence et parle à un adulte de confiance. »

Correction de l'exercice 5 : **L'allaitement maternel**

1) L'hormone de la lactation bloque la maturation des follicules : il n'y a pas d'ovulation, donc pas de fécondation possible.
2) L'ovulation peut reprendre avant le retour des règles, surtout si les tétées deviennent moins fréquentes : une grossesse peut alors survenir sans prévenir.
3) La mère récupère des forces entre deux grossesses (moins d'anémie, moins de complications) ; l'enfant est allaité plus longtemps, mieux nourri et mieux suivi.

Correction de l'exercice 6 : **Vrai ou faux**

a) **V**.
b) **V**.
c) **F** : elle n'est féconde que pendant une **courte période** autour de l'ovulation.
d) **F** : la température **s'élève** après l'ovulation (action de la progestérone).
e) **V**.
f) **F** : elles sont en général **moins efficaces** que la plupart des méthodes artificielles.

LN_EDUCATION