CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : CINQUIÈME


CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 6
LE DÉVELOPPEMENT DES ANIMAUX : DIRECT OU INDIRECT

Correction de l'exercice 1 : La croissance du criquet

1) La longueur du criquet **augmente par paliers** : elle reste constante pendant plusieurs jours puis augmente brusquement (7, 12, 18, 26, 35 puis 50 mm).
2) **Cinq fois** (aux jours 7, 13, 19, 26 et 33) : ce sont les **mues**.
3) Le criquet est enfermé dans une enveloppe rigide (cuticule) qui ne peut pas s'étirer : il ne peut grandir qu'au moment où il quitte son ancienne enveloppe (mue), avant que la nouvelle ne durcisse.
4) À partir du **33e jour** : après la dernière mue, la taille ne change plus ; le criquet a des ailes et peut se reproduire.

Correction de l'exercice 2 : La croissance d'un poulet


1) Graphe :



2) Au 36e jour : environ **1 650 à 1 700 g**.
3) La masse augmente lentement jusqu'au 15e jour, puis très rapidement du 18e au 39e jour, et plus lentement ensuite (la courbe s'aplatit). La croissance est la plus rapide entre le **30e et le 39e jour** environ.
4) Aliment « démarrage » (protides, construction) : pendant les premières semaines, quand le poussin construit ses tissus. Aliment « finition » (glucides, énergie et engraissement) : à la fin, à partir de la 4e ou 5e semaine, pour engraisser le poulet avant la vente.
5) **Direct** : le poussin qui sort de l'œuf ressemble déjà à l'adulte ; il grandit sans métamorphose.

Correction de l'exercice 3 : Le cycle du criquet

1) Schéma :



2) **Indirect** : il passe par des stades larvaires sans ailes, différents de l'adulte, et par des mues.
3) Aux stades **œufs et larves** (sauteriaux), qui ne volent pas et restent localisés. Moyens : labourer les zones de ponte pour détruire les oothèques ; traiter les bandes de larves avec des produits adaptés ; surveiller les zones de reproduction ; lutte biologique (champignons, oiseaux).

Correction de l'exercice 4 : La reproduction de la vache

1) La **gestation** est la période pendant laquelle le petit se développe dans le ventre de sa mère, de la fécondation à la naissance. L'embryon se développe dans l'**utérus**.
2) **Vivipare** : le veau se développe dans le corps de sa mère et naît vivant.
3) **Direct** : à la naissance, le veau ressemble déjà à un adulte en miniature.
4) Un cycle complet dure environ $9 + 3 = 12$ mois (gestation + repos) : environ **4 veaux** en 4 ans.
5) La vache a peu de descendants (1 par an) mais les protège et les nourrit (lait) : ils ont de grandes chances de survie. Le criquet pond des centaines d'œufs mais ne s'en occupe pas ; beaucoup meurent, d'où un grand nombre de descendants.

Correction de l'exercice 5 : De l'œuf à la grenouille

1) **B, D, A, F, C, E**.
2) La **métamorphose**.
3) Le têtard vit uniquement dans l'**eau** et respire avec des **branchies** ; la grenouille adulte vit dans l'eau et sur terre, et respire avec ses **poumons** et sa **peau**.
4) **Indirect** (avec métamorphose).

Correction de l'exercice 6 : Bilan sur la reproduction

Animal	Fécondation	Ovipare ou vivipare	Développement	Soins aux jeunes
Poule	Interne	Ovipare	Direct	Couvaison, protection des poussins
Vache	Interne	Vivipare	Direct	Allaitement, protection
Criquet	Interne	Ovipare	Indirect (mues)	Aucun
Grenouille	Externe	Ovipare	Indirect (métamorphose)	Aucun

LN EDUCATION