CORRIGÉ DU TD DE GÉOGRAPHIE
CLASSE : TERMINALE

CORRECTION DU TD N° 1 · LEÇON 16
LE SÉNÉGAL : MILIEUX NATURELS ET POPULATIONS

Correction de l'exercice 1 : **Maîtrise des connaissances**

1) Définitions

- **Isohyète** : ligne qui relie, sur une carte, les points recevant la même quantité de pluie.
- **Hivernage** : saison des pluies au Sénégal, de juillet à octobre.
- **Niayes** : bande littorale de la Grande Côte (de Dakar à Saint-Louis) formée de dunes et de dépressions humides, zone de maraîchage.
- **Langue salée** : remontée de l'eau de mer dans le lit d'un fleuve à faible pente pendant la saison sèche.
- **Toggéré** : buttes non inondables de la vallée du fleuve Sénégal, où sont installés les villages.
- **Exode rural** : départ massif des populations des campagnes vers les villes.

2) Zones climatiques

Zones	Pluies annuelles	Végétation	Exemple de localité
Zone aride (nord)	Moins de 350 mm	Steppe à graminées et acacias	Podor
Zone semi-aride	350 à 700 mm	Steppe arborée, savane sèche	Louga, Diourbel
Zone subhumide	700 à 900 mm	Savane boisée (baobab, néré)	Kaolack, Tambacounda
Zone humide (sud-ouest)	1 000 à 1 600 mm	Forêt claire et dense, palmiers à huile	Ziguinchor

3) Fleuves et réserve d'eau

Le Sénégal (1 750 km), la Gambie (750 km), la Casamance (300 km). Principale réserve d'eau douce : le lac de Guiers, alimenté par le fleuve Sénégal.

Correction de l'exercice 2 : **Commentaire de document**

1) Caractéristiques du climat

Climat tropical ; deux saisons : longue saison sèche (novembre à juin) et courte saison des pluies (juillet à octobre) ; températures élevées à l'intérieur, adoucies sur le littoral ; pluies apportées par la mousson, décroissantes du sud vers le nord.

2) Écart de pluviométrie

1 280 − 330 = **950 mm** : Ziguinchor reçoit près de quatre fois plus de pluie que Podor. La mousson, venue du sud-ouest, arrive plus tôt, reste plus longtemps et est plus chargée au sud ; plus on va vers le nord, plus la saison des pluies est courte.

3) Climat et végétation

La végétation suit la pluviométrie : forêt subguinéenne au sud-ouest très arrosé (palmiers à huile), savane boisée soudanienne au centre et au sud-est (fromager, néré, baobab), steppe sahélienne clairsemée au nord sec (graminées, acacias).

4) Rôle du courant des Canaries

Ce courant froid rafraîchit le littoral (températures plus douces qu'à l'intérieur), favorise une humidité nocturne utile au maraîchage des Niayes et entraîne une remontée d'eaux riches en plancton (upwelling), d'où l'abondance du poisson.

Correction de l'exercice 3 : Question de cours

- **Un pays plat** : altitude moyenne inférieure à 100 m ; vaste bassin sédimentaire au centre.
- **Les reliefs du Sud-Est** : contreforts du Fouta-Djalon dans la région de Kédougou, point culminant à 581 m (mont Bassari, plateaux de grès).
- **Les reliefs de l'Ouest** : plateaux volcaniques de la presqu'île du Cap-Vert (Mamelles, 105 m), massif de Ndiass (Thiès).
- **La vallée du fleuve Sénégal** : arc de 600 km de Bakel à Saint-Louis, plaine alluviale avec toggéré, faible pente (remontée de la langue salée).
- **Le littoral** : Niayes (dunes et dépressions) sur la Grande Côte ; vasières, mangroves et estuaires (Saloum, Casamance) au sud.

Un atout : le relief plat facilite la circulation, la construction des routes et des voies ferrées, l'agriculture mécanisée et l'irrigation (vallée du fleuve) ; les côtes basses permettent la pêche et le tourisme ; les reliefs du Sud-Est renferment des minerais (or, fer de la Falémé).

LN_EDUCATION