



BACCALAURÉAT – SESSION 2016

MATHÉMATIQUES

Épreuve du 1^{er} groupe

Référence : 16 G 26 A 01 Séries : S2-S2A-S4-S5 – Coef. 5

Durée : 4 heures Organisme : Université Cheikh Anta Diop de Dakar – Office du Baccalauréat

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des tracés de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude (Cf. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12/08/1998).

EXERCICE 1

(04 points)

1. On considère l'équation (E) :

$$z^3 - 13z^2 + 59z - 87 = 0,$$

où z est un nombre complexe.

- Déterminer la solution réelle de (E) .
- Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ l'équation (E) .

2. On pose $a = 3$, $b = 5 - 2i$ et $c = 5 + 2i$. Le plan complexe étant muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B, C d'affixes respectives a, b, c . Soit M le point d'affixe z distinct de A et de B .

- Calculer

$$\frac{b - a}{c - a}.$$

En déduire la nature du triangle ABC .

- On pose

$$Z = \frac{z - 3}{z - 5 + 2i}.$$

Donner une interprétation géométrique de l'argument de Z . En déduire l'ensemble des points M d'affixe z tels que Z soit un nombre réel non nul.

3. Soit (C) le cercle circonscrit au triangle ABC et I le point d'affixe $2 - i$.

- Donner l'écriture complexe de la rotation r de centre I et d'angle $-\frac{\pi}{2}$.
- Déterminer l'image (C') de (C) par r .

EXERCICE 2

(06 points)

À l'occasion de ses activités culturelles, le FOSCO d'un lycée organise un jeu pour le collectif des professeurs. Une urne contenant 4 boules rouges et une boule jaune indiscernables au toucher est placée dans la cour de l'école. Chaque professeur tire simultanément 2 boules de l'urne.

- Si les 2 boules sont de même couleur, il les remet dans l'urne et procède à un second tirage successif avec remise de 2 autres boules.

- Si les 2 boules sont de couleurs distinctes, il les remet dans l'urne, mais le second tirage de 2 autres boules s'effectue successivement sans remise.

1. Calculer les probabilités des événements suivants :

- A : « Le professeur tire 2 boules de même couleur au premier tirage. »
- B : « Le professeur tire 2 boules de couleurs distinctes au premier tirage. »
- C : « Le professeur tire 2 boules de même couleur au second tirage sachant que les boules tirées au premier tirage sont de même couleur. »
- D : « Le professeur tire 2 boules de même couleur au second tirage sachant que les boules tirées au premier tirage sont de couleurs distinctes. »
- E : « Le professeur tire 2 boules de couleurs distinctes au second tirage sachant que les boules tirées au premier tirage sont de couleurs distinctes. »
- F : « Le professeur tire 2 boules de couleurs distinctes au premier et au second tirage. »

2. Pour le second tirage, chaque boule rouge tirée fait gagner au FOSCO 1 000 F et chaque boule jaune tirée fait gagner au collectif des professeurs 1 000 F. Soit X la variable aléatoire à laquelle on associe le gain obtenu par le FOSCO.

- a) Déterminer les différentes valeurs prises par X et sa loi de probabilité.
- b) Déterminer la fonction de répartition de X .

3. Étant donné que le collectif est composé de 50 professeurs qui ont tous joué indépendamment et dans les mêmes conditions, déterminer la probabilité des événements suivants :

- G : « Le FOSCO réalise un gain de 100 000 F. »
- H : « Le collectif des professeurs réalise un gain de 100 000 F. »
- I : « Ni gagnant, ni perdant. »

PROBLÈME (10 points)**PARTIE A**

Soit g la fonction définie sur $] -1, +\infty[$ par :

$$g(x) = -2\ln(x+1) + \frac{x}{x+1}.$$

1.

- a) Déterminer D_g , puis calculer les limites de g aux bornes de D_g .
- b) Calculer $g'(x)$, étudier son signe et dresser le tableau de variations de g .

2.

- a) Calculer $g(0)$. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet exactement deux solutions dont l'une, notée α , appartient à $] -0,72; -0,71[$.
- b) Déterminer le signe de $g(x)$.

PARTIE B

Soit f la fonction définie par

$$f(x) = \frac{x^2}{\ln(x+1)} \quad (x > -1, x \neq 0),$$

et prolongée en 0 par $f(0) = 0$.

1. Déterminer le domaine de définition de f et calculer les limites aux bornes de son ensemble de définition.
2. Étudier la continuité et la dérivabilité de f en -1 et en 0, puis interpréter graphiquement les résultats.
3. Montrer que, pour tout $x \in] -1, +\infty[, x \neq 0$,

$$f'(x) = -\frac{xg(x)}{\ln^2(x+1)}.$$

Étudier les variations de f et dresser son tableau de variations.

4. Soit h la restriction de f à $[0, +\infty[$.
 - a) Montrer que h réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur un intervalle J à préciser.
 - b) Donner le sens de variation de h^{-1} .
 - c) Construire C_f et $C_{h^{-1}}$.

PARTIE C

Soit la fonction

$$m(x) = \frac{\ln(x+1)}{x^2} - \frac{1}{x(x+1)}, \quad x > 0.$$

1.

- a) Déterminer les fonctions u et v telles que

$$m(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x).$$

- b) En déduire une primitive H de m sur $]0, +\infty[$ puis calculer l'intégrale demandée dans le sujet.

FIN DU SUJET