

# MLCheatsheet

## 1. Bài toán Gốc: Toán học (Theory)

### 1. Thiết lập:

•  $x, w \in \mathbb{R}^{M-1}$ ; Siêu phẳng:  $w^T x + b = 0$ .

2. **Dẫn dắt:** Max Margin  $\Leftrightarrow$  Min  $\|w\| \Leftrightarrow$  Min  $\frac{1}{2}\|w\|^2$ .

### 3. Công thức Primal:

$$\begin{aligned} \min_{w, b} \quad & \frac{1}{2} \|w\|^2 \\ \text{s.t.} \quad & t_n(w^T x_n + b) \geq 1, \forall n \end{aligned}$$

## 2. Bài toán Gốc: Implementation (CVXOPT)

Solver:  $\min \frac{1}{2} u^T P u + q^T u$  s.t  $G u \leq h$ . **Biến:**  $u = [\mathbf{w}; \mathbf{b}]_{(M \times 1)}$ .  
**Mapping:**

$$\begin{aligned} P &= \text{diag}(\mathbf{1}, \dots, \mathbf{1}, \mathbf{0})_{(M \times M)} \\ q &= \mathbf{0}_{(M \times 1)} \\ G &= -[\text{diag}(\mathbf{t}) \cdot \mathbf{X}, \quad \mathbf{t}]_{(N \times M)} \\ h &= -\mathbf{1}_{(N \times 1)} \end{aligned}$$

## 3. Lagrangian & Điều kiện KKT

### 1. Hàm Lagrangian:

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= \frac{1}{2} \|w\|^2 + \sum_{n=1}^N \underbrace{\alpha_n}_{\geq 0} \underbrace{\{1 - t_n(w^T x_n + b)\}}_{\substack{\text{đúng: } \leq 0 \\ \text{sai: } > 0}} \\ &= \frac{1}{2} \|w\|^2 + E_{\text{data}} \quad (\text{cost trên dữ liệu}) \end{aligned}$$

**Tính chất:** Với  $\alpha_n \geq 0$ ,  $(w^*, b^*)$  tối ưu:

$$\mathcal{L}(w^*, b^*, \alpha) \leq \frac{1}{2} \|w^*\|^2$$

### 2. Tính đạo hàm:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w} &= w - \sum_{n=1}^N \alpha_n t_n x_n \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b} &= - \sum_{n=1}^N \alpha_n t_n \end{aligned}$$

### 3. Điều kiện dừng (KKT-1):

$$\bullet \nabla_w \mathcal{L} = 0 \Rightarrow w = \sum_{n=1}^N \alpha_n t_n x_n \quad (1)$$

$$\bullet \nabla_b \mathcal{L} = 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^N \alpha_n t_n = 0 \quad (2)$$

### 4. Các điều kiện KKT khác:

- **(KKT-2)** Ràng buộc gốc:  $1 - t_n(w^T x_n + b) \leq 0$
- **(KKT-3)** Ràng buộc dual:  $\alpha_n \geq 0, \forall n$
- **(KKT-4)** Điều kiện bù:  $\alpha_n \{1 - t_n(w^T x_n + b)\} = 0$

**Ý nghĩa:** Thỏa KKT  $\Rightarrow (w, b, \alpha) = (w^*, b^*, \alpha^*)$

### 5. Tiêu chuẩn Slater (cho SVM):

Nếu phần trong của tập khả thi không rỗng thì:

$$\exists (w, b) \text{ s.t. } 1 - t_i(w^T x_i + b) < 0, \forall i$$

$$\Rightarrow \text{strong duality } (p^* = d^*) \Leftrightarrow \text{duality gap} = 0$$

## 4. Bài toán Dual: Biến đổi (Math)

Thay (1), (2) vào  $\mathcal{L}$ :

**A. Thay  $w$  vào  $\frac{1}{2} w^T w$ :**

$$\frac{1}{2} \left( \sum \alpha_i t_i x_i \right)^T \left( \sum \alpha_j t_j x_j \right) = \frac{1}{2} \sum_{i,j} \alpha_i \alpha_j t_i t_j (x_i^T x_j) \quad (*)$$

**B. Thay  $w$  vào  $-\sum \alpha_n t_n w^T x_n$ :**

$$-\sum_n \alpha_n t_n \underbrace{\left( \sum_m \alpha_m t_m x_m \right)^T}_{w^T} x_n = -2 \times (*)$$

**C. Kết quả ( $A + B = -A$ ):**

$$\begin{aligned} \max_{\alpha} g(\alpha) &= \sum_n \alpha_n - \frac{1}{2} \sum_{i,j} \alpha_i \alpha_j t_i t_j (x_i^T x_j) \\ \text{s.t.} \quad & \alpha_n \geq 0; \quad \sum \alpha_n t_n = 0 \end{aligned}$$

## 5. Bài toán Dual: Implementation (CVXOPT)

Solver:  $\min \frac{1}{2} \alpha^T P \alpha + q^T \alpha$  s.t  $G \alpha \leq h, A \alpha = b$ . **Biến:**  $\alpha \in \mathbb{R}^N$ .  
**Mapping:**

$$\begin{aligned} P &= \mathbf{K}_{\text{Gram}(N \times N)} \quad (K_{ij} = t_i t_j x_i^T x_j) \\ q &= -\mathbf{1}_{(N \times 1)} \quad (\text{Max } \Sigma \rightarrow \text{Min } -\Sigma) \\ G &= -I_{(N \times N)}; \quad h = \mathbf{0}_{(N \times 1)} \\ A &= t^T; \quad b = 0 \end{aligned}$$

## 6. Soft Margin & Kernel

**1. Soft Margin (ý tưởng):** Cho phép một số điểm vi phạm margin bằng biến slack  $\xi_n$ , đổi lại bị phạt trong hàm mục tiêu.

**2. Bài toán gốc (Primal – soft margin):**

$$\min_{w, b, \xi} \quad \frac{1}{2} \|w\|^2 + C \sum_{n=1}^N \xi_n$$

$$\text{s.t.} \quad t_n(w^T x_n + b) \geq 1 - \xi_n, \quad \xi_n \geq 0$$

**Ý nghĩa  $C$ :**  $C$  lớn  $\Rightarrow$  phạt mạnh (ít sai, lề hẹp);  $C$  nhỏ  $\Rightarrow$  cho sai nhiều (lề rộng).

**3. Dạng đối ngẫu (Dual):**

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \|w\|^2 + C \sum_n \xi_n - \sum_n \alpha_n \{t_n(w^T x_n + b) - 1 + \xi_n\} - \sum_n \mu_n \xi_n$$

$$\max_{\alpha} \quad \sum_{n=1}^N \alpha_n - \frac{1}{2} \sum_{i,j} \alpha_i \alpha_j t_i t_j x_i^T x_j$$

$$\text{s.t.} \quad \boxed{0 \leq \alpha_n \leq C}, \quad \sum_{n=1}^N \alpha_n t_n = 0$$

**Phân loại theo KKT:**

- $\alpha_n = 0$ : điểm ngoài margin (không support)
- $0 < \alpha_n < C$ : support vector trên margin
- $\alpha_n = C$ : support vector vi phạm / phân loại sai

**4. Kernel Trick:** Thay tích vô hướng:

$$x_i^T x_j \longrightarrow k(x_i, x_j)$$

$$f(x) = \sum_{n \in SV} \alpha_n t_n k(x_n, x) + b, \quad y = \text{sign}(f(x))$$