

Algebra

Jaroslav Langer *

Říjen 2020

Contents

1	Přednáška 1.	1
1.1	Úvod	1
1.2	Hierarchie	1
1.3	Neutrální a inverzní prvky	2
1.4	Znázornění grup	2
2	Přednáška 2.	3
2.1	Podgrupy	3
2.2	Lagrangeova věta	4
2.3	Generující množiny a generátor grup	4
2.4	Cyklické grupy	5
2.5	(Malá) Fermatova věta	5
3	Přednáška 3.	6
3.1	Homomorfismy a izomorfismy	6
3.2	Aplikace teorie grup v kryptografii	6
4	Přednáška 4.	6
5	Přednáška 5.	6

Abstract

Definice, pojmy a znalosti z předmětu NI-MPI. [Odkaz na courses.](#)

*z přednášek NI-MPI/FIT/ČVUT

1 Přednáška 1.

Grupoid, grupa, Cayleyho tabulka; podgrupa

1.1 Úvod

Věta 1.1: Pro všechna $b, c \in R \setminus \emptyset$ pro rovnici $b \cdot x = c$ existuje právě jedno řešení $x = \frac{c}{b}$

Poznámka: Dvojici (M, \circ) , kde $\circ : M \times M \rightarrow M$, \circ je asociativní na M , neutrální prvek náleží M a pro každý prvek M inverzní prvek náleží M , říkáme grupa.

1.2 Hierarchie

Definice 2.1: Grupoid (magma) je uspořádaná dvojice (M, \circ) , kde M je neprázdná množina a \circ je binární operace na M .

- **Pologrupa** (semigrupa) je grupoid (M, \circ) , kde operace \circ je asociativní pro všechny prvky M .

- **Monoid** je pologrupa (M, \circ) , kde $\exists e, \forall a, \quad e, a \in M$,

$$a \circ e = e \circ a = a$$

.

- **Grupa** je monoid (M, \circ) a $e \in M$ je neutrální prvek, kde $\forall a \exists a^{-1}, \quad e, a \in M$,

$$a \circ a^{-1} = a^{-1} \circ a = e$$

.

- **Komutativní (abelovská) grupa** je grupa (M, \circ) , kde operace \circ je komutativní na M .

Poznámka: O množině M mluvíme také jako o *nosiči* grupy (M, \circ)

Poznámka: Binární operace je *na* M což znamená, že $\circ : M \times M \rightarrow M$, také můžeme říci, že množina M je uzavřená vůči operaci \circ .

1.3 Neutrální a inverzní prvky

Věta 4.1: V monoidu existuje právě jeden neutrální prvek.

Věta 4.2: V grupě má každý prvek právě jeden inverzní prvek.

1.4 Znázornění grup

Poznámka: Pokud má množina M konečný počet prvků, pak strukturu dvojic (M, \circ) , lze kompletně zachytit Cayleyho tabulkou. Cayleyho tabulka pro (M, \circ) , $|M| = n$ je tabulka $n \times n$, kde záhlaví sloupců i řádků jsou stejně seřazené prvky M , políčko $p_{a,b}$ pro a -tý řádek a b -tý sloupec má hodnotu $a \circ b$

Poznámka: Latinský čtverec pro n prvkovou množinu M je tabulka $n \times n$, kde v každém řádku a sloupci, je každý prvek M právě jednou.

Věta 5.2: Cayleyho tabulka každé grupy tvoří latinský čtverec.

Věta 5.3: V každé grupě (M, \circ) jde jednoznačně dělit. Tzn. $\forall a, b \in M$ mají rovnice

$$a \circ x = b, y \circ a = b$$

jediné řešení.

Poznámka: Grupu (M, \circ) s konečným počtem prvků M lze vizualizovat pomocí Cayleyho orientovaného grafu. Cayleyho orientovaný graf

$$(V, E), V = M, E = \{(a, b) : b = a \circ c, \quad \forall a \in M, \forall c \in N \subset V\}$$

2 Přednáška 2.

dodělovka Algebry I; Algebra II : podgrupy; Lagrangeova věta; cyklické grupy

2.1 Podgrupy

Poznámka: Hledáme-li podgrupu (N, \circ) grupy (M, \circ) tak aby obsahovala prvek m , těleso musí zůstat grupou, proto musí také obsahovat všechny prvky tak, aby množina N byla uzavřená na operaci \circ , dále musí obsahovat neutrální prvek e , a inverzní prvek pro všechny prvky N . Takovou podgrupu nazýváme **podgrupa generovaná množinou $\{m\}$** .

Definice 6.2: Podgrupa (subgroup) (N, \circ) buď grupa $G = (M, \circ)$, podgrupa $H = (N, \circ)$ je libovolná dvojice, kde

- $N \subset M$
- (N, \circ) je grupa.

Poznámka: Každá grupa (M, \circ) , kde $|M| \geq 2$ má vždy podgrupy

- $(\{e\}, \circ), e \in M$
- $(N, \circ), N = M$

těmto dvěma podgrupám říkáme **triviální podgrupy**. Ostatní podgrupy nazýváme **valstní (proper)**.

Věta 6.3: Buď grupa $G = (M, \circ)$, pro každé i z indexové množiny I buď H_i podgrupa G , pak

$$H' = \bigcap_{i \in I} H_i$$

je také podgrupa G .

Věta 6.4: Buď grupa $G = (M, \circ)$, $N \subset M \wedge N \neq \emptyset$, pak libovolná dvojice (N, \circ) je podgrupa právě tehdy když

$$\forall a, b \in N, a \circ b^{-1} \in N$$

2.2 Lagrangeova věta

Definice 7.1 Řád (order): Řádem grupy $G = (M, \circ)$ nazýváme počet prvků M , jeli počet prvků nekonečný, i řád je nekonečný, podle řádů rozdělujeme grupy na **konečné** a **nekonečné**. Řád grupy G značíme $\#G$ (nebo také $|G| = \text{ord}(G)$).

Věta 7.3 Lagrangeova: Buď $H = (N, \circ)$ podgrupa konečné grupy $G = (M, \circ)$, potom řád H dělí řád G .

Věta 7.4 Sylowova: Buď grupa konečná G řádu n a p prvočíselný dělitel n . Pokud p^k dělí n (pro k přirozená), potom existuje podgrupa G řádu p^k . (Pro $k = 1$ též Cauchyho věta).

2.3 Generující množiny a generátor grup

Věta 8.1 Buď grupa $G = (M, \circ)$ a $N \subset M \wedge N \neq \emptyset$, pak množina

$$\langle N \rangle = \bigcap \{H : H \text{ je podgrupa grupy } G \text{ obsahující } N\}$$

spolu s operací \circ tvoří podgrupu grupy G obsahující prvek N .

Věta 8.2 Podgrupu $\langle N \rangle$ grupy $G = (M, \circ)$, $N \subset M \wedge N \neq \emptyset$ nazýváme **podgrupou generovanou množinou** N . O množinu N pak nazýváme jako **generující množinu** grupy $\langle N \rangle$. V případě jednoprvkové generující

množiny zavádíme značení $\langle a \rangle = \langle \{a\} \rangle$ nazýváme jednoprvkovou množinu **generátor** grupy $\langle a \rangle$.

Poznámka: Pro grupu $G = (M, \circ)$ s neutrálním prvkem $e \in M$ pro každý prvek $g \in M$ a $n \in \mathbb{N}$ zavádíme n -tou a $-n$ -tou mocninu takto.

$$\begin{aligned} g^0 &= e \\ g^1 &= g \\ g^2 &= g \circ g \\ g^n &= g \circ g \circ g \dots \circ g \quad (n\text{-krát}) \\ g^{-2} &= g^{-1} \circ g^{-1} \\ g^{-n} &= (g^{-1})^n \end{aligned}$$

Věta 8.5 Buď grupa $G = (M, \circ)$ a podmnožina $N \subset M \wedge N \neq \emptyset$, potom všechny prvky grupy $\langle N \rangle$ lze získat pomocí grupového obalu

$$\langle N \rangle = \{a_1^{k_1} \circ a_2^{k_2} \circ \dots \circ a_n^{k_n} : n \in \mathbb{N}, k_i \in \mathbb{Z}, a_i \in N\}$$

Důsledek: $\langle N \rangle = \{a^k : k \in \mathbb{Z}\}$

2.4 Cyklické grupy

Věta 9.1 Grupa \mathbb{Z}_n^+ je rovna $\langle k \rangle, k \in \mathbb{Z}_n^+$ tehdy a jen tehdy, když k a n jsou nesoudělná čísla.

Definice 9.4 Cyklická grupa (cyclic group) Grupa $G = (M, \circ)$ se nazývá **cyklická**, pokud existuje $a \in M, \langle a \rangle = G$. Prvek a se nazývá **generátor** cyklické grupy G .

Definice 9.5 Buď g prvek grupy $G = (M, \circ)$, existuje-li $m \in \mathbb{N}$ takové, že $g^m = e$, pak nejmenší takové m nazýváme **řádem prvku g** . Neexistuje-li takové m , pak prvek g má řád nekonečno. Řád prvku g značíme $ord(g)$.

Poznámka Řád prvku g se rovná řádu množiny generované g , platí tedy rovnost

$$ord(g) = \#\langle g \rangle$$

Dále platí, že $g^k = e \Leftrightarrow k = l \cdot ord(g), l \in \mathbb{Z}$

Věta 9.6 Grupa \mathbb{Z}_n^\times je cyklická právě tehdy když $n \in \{2, 4, p^k, 2p^k\}, k \in \mathbb{N}$ a p je liché prvočíslo.

Poznámka Obecně najít generátor grupy není jednoduché, (třeba pro grupy \mathbb{Z}_n^\times). Pokud však jeden známe, je jednoduché najít všechny ostatní.

Věta 9.7 Je-li $G = (M, \circ)$ cyklická grupa řádu n a a nějaký její generátor. Potom a^k je také její tehdy a jen tehdy, když n a k jsou nesoudělné, tedy $\gcd(n, k) = 1$

!!! Důkaz !!! brutus

Poznámka $\varphi(n)$ je **Eulerova funkce**, každému $n \in \mathbb{N}$ přiřazuje počet menších přirozených čísel, která jsou s ním nesoudělná.

Věta 9.8 V cyklické grupě řádu n je počet generátorů roven $\varphi(n)$.

Věta 9.9 Libovolná podgrupa cyklické grupy je opět cyklická grupa.

2.5 (Malá) Fermatova věta

Věta 10.1 V grupě $G = (M, \circ)$ řádu n pro libovolný prvek $a \in M$ platí $a^n = e$, kde e je neutrální prvek.

Poznámka Grupa \mathbb{Z}_p^\times je cyklická a řádu $p - 1$.

Věta 10.2 Pro libovolné p a libovolné $1 < a < p$

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}. \quad (a^n \equiv a \pmod{p})$$

3 Přednáška 3.

3.1 Homomorfismy a izomorfismy

Definice 11.1 Buď $G = (M, \circ_G), H = (N, \circ_H)$ dva grupoidy, zobrazení $h : M \rightarrow N$, nazveme **homomorfismem G do H**, jestliže

$$\forall a, b \in M, h(a \circ_G b) = h(a) \circ_H h(b)$$

Je-li navíc h injektivní, resp. surjektivní, resp. bijektivní, říkáme, že jde o **monomorfismus**, resp. **epimorfismus**, resp. **izomorfismus**.

Definice 11.2 Grupy $G = (M, \circ_G), H = (N, \circ_H)$ nazýváme **izomorfní**, právě tehdy když existuje izomorfismus $h : M \rightarrow N$, také říkáme, že G je izomorfní s H .

Poznámka: vlastnost dvou grup být izomorfní je relace ekvivalence na množině všech grup.

Věta 11.3: buď homomorfismus grupy $G = (M, \circ_G)$ do grupoidu $H = (N, \circ_H)$ $h : M \rightarrow N$, potom $h(G) = (h(M), \circ_H)$ grupa

3.2 Aplikace teorie grup v kryptografii

4 Přednáška 4.

5 Přednáška 5.