


三角函数

- $\sin x$: 正弦函数
- $\cos x$: 余弦函数
- $\tan x$: 正切函数
- $\cot x$: 余切函数
- $\sec x$: 正割函数
- $\csc x$: 余割函数

几何定义



•

$$\cot \theta = \frac{b}{a}$$

(1)

•

$$\sec \theta = \frac{h}{b}$$


(2)

•

$$\csc \theta = \frac{h}{a}$$

(3)

图像演示



三角公式

| | | |
|---|--|------|
| • | $\sin^2x + \cos^2x = 1$ | (4) |
| • | $\tan^2x + 1 = \sec^2$ | (5) |
| • | $1 + \cot^2 = \csc^2$ | (6) |
| • | $\sin(x \pm y) = \sin x * \cos y \pm \cos x * \sin y$ | (7) |
| • | $\cos(x \pm y) = \cos x * \cos y \mp \sin x * \sin y$ | (8) |
| • | $\tan(x \pm y) = (\tan x \pm \tan y) / (1 \mp \tan x * \tan y)$ | (9) |
| • | $\sin(2x) = 2\sin x * \cos x$ | (10) |
| • | $\cos(2x) = \cos^2x - \sin^2x = 1 - 2\sin^2x = 2\cos^2x - 1$ | (11) |
| • | $\tan(2x) = \frac{2\tan x}{(1 - \tan^2x)}$ | (12) |
| • | $\sin(\frac{x}{2}) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}}$ | (13) |
| • | $\cos(\frac{x}{2}) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}}$ | (14) |
| • | $\tan(\frac{x}{2}) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}} = \frac{1 - \cos x}{\sin x} = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$ | (15) |
| • | $\sin x * \cos y = \frac{\sin(x + y) + \sin(x - y)}{2}$ | (16) |
| • | $\cos x * \sin y = \frac{\sin(x + y) - \sin(x - y)}{2}$ | (17) |
| • | $\cos x * \cos y = \frac{\cos(x + y) + \cos(x - y)}{2}$ | (18) |
| • | $\sin x * \sin y = -\frac{\cos(x + y) - \cos(x - y)}{2}$ | (19) |
| • | $\sin x + \sin y = 2 * \sin(\frac{x + y}{2}) * \cos(\frac{x - y}{2})$ | (20) |
| • | $\sin x - \sin y = 2 * \cos(\frac{x + y}{2}) * \sin(\frac{x - y}{2})$ | (21) |
| • | $\cos x + \cos y = 2 * \cos(\frac{x + y}{2}) * \cos(\frac{x - y}{2})$ | (22) |
| • | $\cos x - \cos y = -2 * \sin(\frac{x + y}{2}) * \sin(\frac{x - y}{2})$ | (23) |

正弦弦定理

正弦定理

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

余弦定理

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab * \cos C$$

连续、可导、可微关系及定义

$$\text{可微} \Leftrightarrow \text{可导} \Rightarrow \text{连续} \Leftarrow \text{可微}$$

连续定义

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

可导定义

$$y'|_{x=x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \tag{28}$$

或者左右导数相等

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \tag{29}$$

可微定义

$$dy = A * \Delta x = f'(x_0) * \Delta x = f'(x_0)dx$$

(30)

基本求导公式

| | | |
|---|---|------|
| • | $(a^x)' = a^x \ln a$ | (31) |
| • | $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$ | (32) |
| • | $(\tan x)' = \sec^2 x$ | (33) |
| • | $(\cot x)' = -\csc^2 x$ | (34) |
| • | $(\sec x)' = \sec x * \tan x$ | (35) |
| • | $(\csc x)' = -\csc x * \cot x$ | (36) |
| • | $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ | (37) |
| • | $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ | (38) |
| • | $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$ | (39) |
| • | $(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$ | (40) |

泰勒公式

$$f(x) = f(x_0) + \sum_{i=1}^n \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} (x - x_0)^i + o[(x - x_0)^n]$$

(41)

麦克劳林公式

$$f(x) = f(0) + \sum_{i=1}^n \frac{f^{(i)}(0)}{i!} x^i + o(x^n)$$

(42)

常用泰勒展开式

•

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!} x^{n+1}$$

(43)

•

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + (-1)^n \frac{\cos(\theta x)}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

(44)

•

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + (-1)^{(n+1)} \frac{\cos(\theta x)}{(2n+2)!} x^{2n+2}$$

(45)

•

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{(n+1)(1+\theta x)^{n+1}}$$

(46)

•

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)(\alpha-n)}{(n+1)!} (1+\theta x)^{n-a-1} x^{n+1}$$

注意：

$$\theta \in (0, 1)$$

(48)

第一换元积分法

$$\int f[g(x)]g'(x)dx = \int f[g(x)]dg(x) = F[g(x)] + C$$

(49)

凑微分形式

-
-
-
-
-
-

$$\int f(\sin x)\cos xdx = \int f(\sin x)d(\sin x) \tag{50}$$
$$\int f(\cos x)\sin xdx = - \int f(\cos x)d(\cos x) \tag{51}$$
$$\int f(\tan x)\frac{1}{\cos^2 x}1dx = \int f(\tan x)d(\tan x) \tag{52}$$
$$\int f(\arcsin x)\frac{1}{\sqrt{(1-x^2)}}dx = \int f(\arcsin x)d(\arcsin x) \tag{53}$$
$$\int f(\arctan x)\frac{1}{\sqrt{(1+x^2)}}dx = \int f(\arctan x)d(\arctan x) \tag{54}$$

第二换元积分

$$\int f(x)dx = \int f[g(t)]g'(t)dt = F(t) + C \tag{55}$$

三种变量代换

-
-
-

$$\sqrt{(a^2-x^2)}=>x=asint(\text{或}x=acost) \tag{56}$$
$$\sqrt{(a^2+x^2)}=>x=atant \tag{57}$$
$$\sqrt{(x^2-a^2)}=>x=asect \tag{58}$$

分部积分

$$\int u dv = u * v - \int v du \tag{59}$$

dv优先级

$$e^x > \sin x, \cos x > x^n \tag{60}$$

不定积分公式

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

$$\int \sec^2 xdx = \tan x + C \tag{61}$$
$$\int \csc^2 xdx = -\cot x + C \tag{62}$$
$$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C \tag{63}$$
$$\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C \tag{64}$$
$$\int \frac{1}{\sqrt{(1-x^2)}}dx = \arcsin x + C \tag{65}$$
$$\int \frac{1}{\sqrt{(a^2-x^2)}}dx = \arcsin(\frac{x}{a}) + C \tag{66}$$
$$\int \frac{1}{(1+x^2)}dx = \arctan x + C \tag{67}$$
$$\int \frac{1}{(a^2+x^2)}dx = \arctan(\frac{x}{a}) + C \tag{68}$$
$$\int \frac{dx}{\sqrt{(x^2+a^2)}} = \ln[x + \sqrt{(x^2+a^2)}] + C \tag{69}$$
$$\int \frac{dx}{\sqrt{(x^2-a^2)}} = \ln[x + \sqrt{(x^2-a^2)}] + C \tag{70}$$
$$\int \frac{dx}{(x^2-a^2)} = \frac{1}{2a} \ln|\frac{x-a}{x+a}| + C \tag{71}$$
$$\int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x| + C \tag{72}$$

•

$$\int cscxdx = -ln|cscx+cotx|+C \tag{73}$$

定积分

$$\int_a^bf(x)dx=lim_{\lambda\rightarrow 0}\sum_{i=1}^nf(\xi_i)*\Delta x_i\quad \{\Delta x_i=\frac{b-a}{n};\quad \xi_i=\frac{i}{n}\} \tag{74}$$

特殊形式

$$\int_0^1f(x)dx=lim_{\lambda\rightarrow 0}\sum_{i=1}^nf(\xi_i)*\Delta x_i=lim_{n\rightarrow \infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^nf(\frac{i}{n}) \tag{75}$$

定积分存在的充分条件

区间 [a,b], 有:

•

$$f(x)\text{连续} \implies \exists \int_a^bf(x)dx \tag{76}$$

•

$$f(x)\text{有界} \wedge \text{只有有限个间断点} \implies \exists \int_a^bf(x)dx \tag{77}$$

•

$$f(x)\text{只有有限个第一类间断点} \implies \exists \int_a^bf(x)dx \tag{78}$$

定积分性质

•

$$\int_a^af(x)dx=0 \tag{79}$$

•

$$\int_a^bf(x)dx=-\int_b^af(x)dx \tag{80}$$

•

$$\int_a^b\{\alpha f(x)+\beta g(x)\}dx=\alpha \int_a^bf(x)dx+\beta \int_a^bg(x)dx \tag{81}$$

•

$$\int_a^cf(x)dx=\int_a^bf(x)dx-\int_b^cf(x)dx \tag{82}$$

•

$$\int_a^bkdx=k(b-a) \tag{83}$$

•

$$\left\{\begin{aligned} f(x)\geq 0 &\implies \int_a^bf(x)dx\geq 0 \\ f(x)\leq 0 &\implies \int_a^bf(x)dx\leq 0 \end{aligned}\right. \tag{84}$$

•

$$f(x)\leq g(x)\implies \int_a^bf(x)dx\leq \int_a^bg(x)dx \tag{85}$$

•

$$m\leq f(x)\leq M\implies m(b-a)\leq \int_a^bf(x)dx\leq M(b-a) \tag{86}$$

•

$$|\int_a^bf(x)dx|\leq \int_a^b|f(x)|dx \tag{87}$$

•

$$\int_a^bf(x)dx=f(\xi)(b-a)\quad \{x\in[a,b],\quad a<\xi<b\}\quad (\text{中值定理}) \tag{88}$$

•

$$\left.\begin{aligned} x\in[a,b] \\ f(x),g(x)\text{连续} \\ g(x)\text{不变号} \\ \xi\in[a,b] \end{aligned}\right\}\implies \int_a^bf(x)g(x)dx=f(\xi)\int_a^bg(x)dx \tag{89}$$

$$\left.\begin{aligned} x\in[a,b] \\ f(x)\text{连续} \\ f(x)\text{在}\xi\text{处可微} \\ \psi_2(x)\text{在}\xi\text{处可微} \end{aligned}\right\}\implies \int_a^bf(x)\psi_2(x)dx=f(\xi)\int_a^b\psi_2(x)dx \tag{90}$$

- $$\left. \begin{array}{l} f(x) \text{连续} \\ \psi_1(x), \psi_2(x) \text{可导} \end{array} \right\} \implies \left(\int_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} f(t) dt \right)' = f[\psi_2(x)] * \psi_2'(x) - f[\psi_1(x)] * \psi_1'(x) \quad (\text{积分上限函数}) \quad (90)$$
- $$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a) \quad (\text{牛顿 - 莱布尼兹}) \quad (91)$$
- $$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f[\psi(t)] * \psi'(t) dt \quad (\text{换元法}) \quad (92)$$
- $$\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du \quad (\text{分部积分}) \quad (93)$$
- $$\int_{-a}^a f(x) dx = \begin{cases} 0, & f(x) = -f(x) \\ 2 \int_0^a f(x) dx, & f(x) = f(-x) \end{cases} \quad x \in [-a, a] \quad (94)$$
- $$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx \quad \{T \text{是} f(x) \text{周期}\} \quad (95)$$

反常积分

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx \tag{96}$$

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^b f(x) dx \tag{97}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^0 f(x) dx + \int_0^{+\infty} f(x) dx \tag{98}$$

极限（都）存在，f(x) 收敛， 否则， 发散。