



**Permanencias individuales de cultivos y quelites y permanencia conjunta
perturbando la incidencia de los herbívoros (plagas) (P=1/2, n=100)
Comparando distintas combinaciones de cultivos
Manejo: desyerbe manual**


- Permanencia maíz
- Permanencia frijol
- Permanencia calabaza
- Permanencia quelites
- Permanencia conjunta




**Permanencias individuales de cultivos y quelites y permanencia conjunta
perturbando la incidencia de los herbívoros (plagas) ($P=1/2$, $n=100$)
Comparando distintas combinaciones de cultivos
Manejo: desyerbe manual y plaguicida**



Permanencias individuales de cultivos y quelites y permanencia conjunta
perturbando la incidencia de los herbívoros (plagas) ($P=1/2$, $n=100$)
Comparando distintas combinaciones de cultivos
Manejo: herbicida



Permanencias individuales de cultivos y quelites y permanencia conjunta
perturbando la incidencia de los herbívoros (plagas) (P=1/2, n=100)
Comparando distintas combinaciones de cultivos
Manejo: plaguicida y herbicida



**Permanencias individuales de cultivos y quelites y permanencia conjunta
perturbando la incidencia de los herbívoros (plagas) ($P=1/2$, $n=100$)
Comparando distintas combinaciones de cultivos
Manejo: plaguicida y herbicida (Roundup)**

