




Permanencias individuales de cultivos, quelites y permanencia conjunta
 bajo distintos tipos de manejo, perturbando la incidencia de precipitaciones ($P=1/7$) $n=100$
 Comparando varios tipos de manejo: tradicional(desyerbe manual) y convencional(plaguicida y herbicida)
 Cultivos: milpa (maíz, frijol enredador y calabaza)




Permanencias individuales de cultivos, quelites y permanencia conjunta
 bajo distintos tipos de manejo, perturbando la incidencia de precipitaciones ($P=1/7$) $n=100$
 Comparando varios tipos de manejo: tradicional(desyerbe manual) y convencional(plaguicida y herbicida)
 Cultivos: maíz y calabaza



Permanencias individuales de cultivos, quelites y permanencia conjunta
bajo distintos tipos de manejo, perturbando la incidencia de precipitaciones (P=1/7) n=100
Comparando varios tipos de manejo: tradicional(desyerbe manual) y convencional(plaguicida y herbicida)
Cultivos: maíz y frijol enredador



Permanencias individuales de cultivos, quelites y permanencia conjunta
bajo distintos tipos de manejo, perturbando la incidencia de precipitaciones (P=1/7) n=100
Comparando varios tipos de manejo: tradicional(desyerbe manual) y convencional(plaguicida y herbicida)
Cultivos: maíz



Permanencias individuales de cultivos, quelites y permanencia conjunta
bajo distintos tipos de manejo, perturbando la incidencia de precipitaciones ($P=1/7$) $n=100$
Comparando varios tipos de manejo: tradicional(desyerbe manual) y convencional(plaguicida y herbicida)
Cultivos: calabaza

