BAC 2026 · ÉPREUVE ANTICIPÉE · MÉTROPOLE

Mathématiques · 1re spécialité

Sujet officiel · corrigé proposé par la prof Julie, professeure certifiée

Sommaire

Le sujet page 2

Sujet officiel, Métropole 2026

Le corrigé page 8

Corrigé détaillé proposé par la prof Julie

BAC 2026 · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle



La prof Julie

Professeure certifiée de physique-chimie, passionnée de maths et de sciences

@la_prof_julie

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

SESSION 2026

MATHÉMATIQUES

ÉPREUVE ANTICIPÉE

Pour les candidats AVEC ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ MATHÉMATIQUES

Vendredi 12 juin 2026

Durée de l'épreuve **: 2 heures -** Coefficient : **2**

L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé.

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
Ce sujet comporte 6 pages numérotées de 1/6 à 6/6.

Vous traiterez les deux parties du sujet dans leur intégralité.

Répartition des points

Première partie	6 points
Deuxième partie	14 points

PREMIÈRE PARTIE : AUTOMATISMES – QCM (6 pts)

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

Question 1


La forme développée de l'expression $(3x-2)^2$ est

a. $9x^2-4$ **b.** $3x^2-12x+4$

c. $9x^2-12x+4$ **d.** $6x-4$

Question 2

Dans le repère (O,I,J) ci-contre, la droite (Δ) a pour équation



a. $y=2x+2$ **b.** $y=-2x+2$ **c.** $y=-x+2$ **d.** $y=x+2$

Question 3

Dans une classe de première, 75% des élèves étudient le grec.
Les autres élèves étudient le latin : ils sont 9.

Le nombre d'élèves de cette classe de première est égal à

a. 24 **b.** 30 **c.** 34 **d.** 36

Question 4

Le prix d'un article augmente de 15 %.
Cela signifie que le prix de cet article a été multiplié par

a. $\frac{15}{100}$ **b.** $1{,}15$ **c.** $0{,}85$ **d.** $1{,}115$

Question 5

Parmi les réponses proposées, la valeur la plus proche de $\frac{150\,000}{3\,200}$ est

a. 5 **b.** 50 **c.** 500 **d.** $5\,000$

Question 6

Une vidéo, d'une durée de 1 minute et 40 secondes, contient $2\,400$ images.
Le nombre d'images par seconde est égal à

a. 60 images/seconde **b.** 24 images/seconde

c. 120 images/seconde **d.** 15 images/seconde

Question 7

On considère une fonction f définie sur **R** par

$$f(x) = 0{,}5(x-3)^2 + 10.$$

On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère.
Un seul des quatre points ci-dessous appartient à la courbe $\mathcal{C}$. Lequel ?

a. $A(-3\,;10)$ **b.** $B(3\,;10{,}5)$ **c.** $C(3\,;10)$ **d.** $D(0\,;19{,}5)$

Question 8

On considère le nombre $A = \frac{10^{201} \times 10^{-4}}{(10^2)^{100}}$.

On peut affirmer que

a. $A = -0{,}001$ **b.** $A = 0{,}0001$ **c.** $A = 0{,}001$ **d.** $A = 1\,000$

DEUXIÈME PARTIE (14 points)

Exercice 1 (5 points)


Un loueur de bicyclettes propose deux types de bicyclettes : des bicyclettes traditionnelles et des bicyclettes électriques. Il incite ses clients à prendre une assurance. On dispose des informations suivantes.

- 60 % des clients ont loué une bicyclette traditionnelle, les autres ont loué une bicyclette électrique.
- Parmi ceux qui ont loué une bicyclette traditionnelle, 25 % ont pris une assurance.
- 20 % de l'ensemble des clients ont pris une assurance.

On choisit un client au hasard et on note les événements :

T : « le client a loué une bicyclette traditionnelle » ;
A : « le client a pris une assurance ».

1. Recopier l'arbre pondéré ci-dessous et compléter les pointillés.



2. Donner, par simple lecture de l'énoncé, la probabilité de l'événement A.

3. Montrer que la probabilité que le client ait loué une bicyclette traditionnelle et qu'il ait pris une assurance est égale à $0{,}15$.

4. En déduire que la probabilité $P(\overline{T} \cap A)$ est égale à $0{,}05$.

5. Déterminer la probabilité que le client ait pris une assurance sachant qu'il a loué une bicyclette électrique. On donnera le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

Exercice 2 **(5 points)**

*Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est **vraie** ou **fausse**, en **justifiant** la réponse. Une réponse non justifiée n'est pas prise en compte.*

Les trois questions sont indépendantes.

1. On considère un réel u. On considère sur **R** l'équation :

$$(E) \quad x^2 + x - u^2 = 0\,.$$

Affirmation : Quelle que soit la valeur du réel u, l'équation (E) possède deux solutions réelles distinctes.

2. On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par

$$u_n = 2^{-n}.$$

Affirmation : La suite (u_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$.


3. On considère la fonction f définie sur **R** par $f(x) = \mathrm{e}^x - 1$.
On note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère.
On note T la tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0.
On note A le point de coordonnées $(3\,;\,3)$.

Affirmation : le point A appartient à la tangente T.

Exercice 3 (4 points)

Dans le plan muni d'un repère orthonormal, on considère les points $\mathrm{P}(4\,;0)$ et $\mathrm{K}(1\,;0)$.

On considère un réel x et on note M le point de coordonnées $(x\,;3)$.



1. Donner les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{\mathrm{KP}}$ ainsi que sa norme.

2. Exprimer en fonction de x les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{\mathrm{KM}}$ ainsi que sa norme.

3. Montrer que le produit scalaire $\overrightarrow{\mathrm{KP}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{KM}}$ est égal à $3x - 3$.

4. Montrer que si l'angle $\widehat{\mathrm{PKM}}$ est égal à $\dfrac{\pi}{3}$, alors le réel x est solution de l'équation

$$(E) \quad \sqrt{(x-1)^2 + 9} = 2x - 2.$$

5. Vérifier que le réel $1 + \sqrt{3}$ est solution de l'équation (E).

Le corrigé

Tu as terminé le sujet ? Bravo ! Avant de tourner la page, note ce dont tu n'es pas sûr(e) : c'est là que la correction te servira le plus.

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Continue avec le corrigé : tourne la page →

BAC 2026 · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

🎯 BAC 2026 · Épreuve anticipée de mathématiques

1re SPÉCIALITÉ · MÉTROPOLE · CORRIGÉ

Corrigé proposé par la prof Julie, professeure certifiée

Vendredi 12 juin 2026 · 2 heures · sans calculatrice

Partie 1 · Automatismes · QCM

6 points · 8 questions

Sans calculatrice et sans justification : une réponse fausse n'enlève aucun point (réponds à tout !). Barème : 0,75 point par question.

Question 1 *(0,75 pt)*

♥ $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$


Avec $a = 3x$ et $b = 2$: $(3x)^2 - 2 \times 3x \times 2 + 2^2 = 9x^2 - 12x + 4$.

Réponse c. : $(3x-2)^2 = 9x^2 - 12x + 4$

Attention, piège : *$(3x-2)^2 \neq (3x)^2 - 2^2$: n'oublie pas le double produit $-12x$ (réponse a.), ni le carré du 3 : $(3x)^2 = 9x^2$ et non $3x^2$ (réponse b.).*

Question 2 *(0,75 pt)*

La droite (Δ) coupe l'axe des ordonnées en $(0\,;\,2)$: l'ordonnée à l'origine est 2. Elle passe aussi par $(1\,;\,1)$: quand on avance de 1 vers la droite, on descend de 1, donc le coefficient directeur est -1. La droite « descend » : il est négatif, ce qui élimine déjà a. et d.



Réponse c. : (Δ) **a pour équation** $y = -x + 2$

Attention, piège : *la réponse b. ($y = -2x + 2$) a la bonne ordonnée à l'origine, mais elle couperait l'axe des abscisses en 1 et non en 2. Vérifie toujours avec un deuxième point.*

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Question 3 *(0,75 pt)*

Si 75 % étudient le grec, les autres, c'est-à-dire les latinistes, représentent $100\,\% - 75\,\% = 25\,\%$, soit un quart de la classe. Un quart de la classe vaut 9 élèves, donc la classe compte $4 \times 9 = 36$ élèves.

Vérification : $\frac{3}{4} \times 36 = 27$ hellénistes et $36 - 27 = 9$ latinistes.

Réponse d. : la classe compte 36 élèves

Attention, piège : *les 9 élèves correspondent aux 25 % de latinistes, pas aux 75 %. Lis bien de quel groupe parle le nombre donné.*

Question 4 *(0,75 pt)*

♥ Augmenter de $t\,\%$, c'est multiplier par $1 + \frac{t}{100}$

$1 + \frac{15}{100} = 1 + 0{,}15 = 1{,}15$.

Réponse b. : le prix a été multiplié par $1{,}15$

Attention, piège : *multiplier par $\frac{15}{100}$ donne le montant de l'augmentation, pas le nouveau prix ; $0{,}85$ correspond à une baisse de 15 % ; $1{,}115$ à une hausse de 11,5 %.*

Question 5 *(0,75 pt)*

On remplace $3\,200$ par un nombre proche et plus simple : $3\,000$.

$$\frac{150\,000}{3\,200} \approx \frac{150\,000}{3\,000} = \frac{150}{3} = 50$$

(La valeur exacte est $46{,}875$: c'est bien 50 la plus proche.)

Réponse b. : la valeur la plus proche est 50

Attention, piège : *simplifie les zéros avec soin : on en enlève autant en haut et en bas ($150\,000$ en a 4, $3\,000$ en a 3, il reste $150 \div 3$).*

Question 6 *(0,75 pt)*

On convertit la durée en secondes : 1 min 40 s $= 60 + 40 = 100$ s. Puis $2\,400$ images en 100 s, cela fait $\frac{2\,400}{100} = 24$ images par seconde.

Réponse b. : 24 images/seconde

Attention, piège : *1 min 40 s ne vaut pas 1,40 min ni 140 s : une minute fait 60 secondes.*

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Question 7 *(0,75 pt)*

♥ $M(a\,;\,b) \in \mathcal{C}$ **si et seulement si** $f(a) = b$

On calcule l'image de chaque abscisse :

$f(3) = 0{,}5 \times 0^2 + 10 = 10$, donc $C(3\,;\,10)$ est sur $\mathcal{C}$ (et $B(3\,;\,10{,}5)$ ne l'est pas).

Contrôle des autres : $f(-3) = 0{,}5 \times 36 + 10 = 28 \neq 10$ et $f(0) = 0{,}5 \times 9 + 10 = 14{,}5 \neq 19{,}5$.

Réponse c. : $C(3\,;\,10)$ appartient à $\mathcal{C}$

Attention, piège : *pour D, $0{,}5 \times (0-3)^2 = 0{,}5 \times 9 = 4{,}5$: on élève au carré avant de multiplier par $0{,}5$ (et $(-3)^2 = 9$, pas -9).*

Question 8 *(0,75 pt)*

♥ $10^m \times 10^n = 10^{m+n}$; $(10^m)^n = 10^{m\times n}$; $\dfrac{10^m}{10^n} = 10^{m-n}$

$$A = \frac{10^{201} \times 10^{-4}}{(10^2)^{100}} = \frac{10^{197}}{10^{200}} = 10^{197-200} = 10^{-3} = 0{,}001$$

Réponse c. : $A = 0{,}001$

Attention, piège : *$(10^2)^{100} = 10^{200}$ (on multiplie les exposants, pas 10^{102}) ; et 10^{-3} est positif : la réponse a. est impossible.*

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Partie 2 · 14 points · 3 exercices


Toutes les réponses doivent être justifiées.

Exercice 1 · Location de bicyclettes

5 points

1. Arbre pondéré *(1 pt)*

D'après l'énoncé : $P(T) = 0{,}6$, donc $P(\overline{T}) = 1 - 0{,}6 = 0{,}4$; $P_T(A) = 0{,}25$, donc $P_T(\overline{A}) = 1 - 0{,}25 = 0{,}75$.



en violet : données de l'énoncé (Q1) en vert : calculé à la question 5

♥ **La somme des probabilités des branches issues d'un même nœud vaut 1.**

Pointillés : $P(T) = 0{,}6$; $P(\overline{T}) = 0{,}4$; $P_T(A) = 0{,}25$; $P_T(\overline{A}) = 0{,}75$

Attention, piège : *le « 20 % » ne va pas sur une branche : c'est $P(A)$, la probabilité totale d'avoir pris une assurance, et non une probabilité conditionnelle.*

2. Probabilité de A *(0,5 pt)*

L'énoncé dit que 20 % de l'ensemble des clients ont pris une assurance.

$P(A) = 0{,}2$

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

3. Probabilité de $T \cap A$ *(1 pt)*

♥ $P(T \cap A) = P(T) \times P_T(A)$

On multiplie les probabilités le long du chemin T puis A :

$$P(T \cap A) = 0{,}6 \times 0{,}25 = 0{,}15$$

$P(T \cap A) = 0{,}15$

Attention, piège : *$0{,}6 \times 0{,}25$ se calcule de tête : $0{,}25$, c'est un quart, et un quart de $0{,}6$ fait $0{,}15$.*

4. Probabilité de $\overline{T} \cap A$ *(1 pt)*

Les événements T et $\overline{T}$ forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales :

♥ $P(A) = P(T \cap A) + P(\overline{T} \cap A)$

donc $P(\overline{T} \cap A) = P(A) - P(T \cap A) = 0{,}2 - 0{,}15 = 0{,}05$.

$P(\overline{T} \cap A) = 0{,}05$

5. Probabilité d'avoir pris une assurance sachant que la bicyclette est électrique *(1,5 pt)*

Un client qui n'a pas loué de bicyclette traditionnelle a loué une bicyclette électrique : on cherche $P_{\overline{T}}(A)$.

♥ $P_{\overline{T}}(A) = \dfrac{P(\overline{T} \cap A)}{P(\overline{T})}$

$$P_{\overline{T}}(A) = \frac{0{,}05}{0{,}4} = \frac{5}{40} = \frac{1}{8}$$

(1 et 8 n'ont pas d'autre diviseur commun que 1 : la fraction est irréductible.)

La probabilité cherchée est $P_{\overline{T}}(A) = \dfrac{1}{8}$

Attention, piège : *ne confonds pas $P_{\overline{T}}(A) = \dfrac{1}{8}$ (parmi les clients en vélo électrique) et $P(\overline{T} \cap A) = 0{,}05$ (parmi tous les clients). Pour passer de $\dfrac{0{,}05}{0{,}4}$ à $\dfrac{5}{40}$, multiplie le haut et le bas par 100.*

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Exercice 2 · Vrai ou faux

5 points

Affirmation 1 *(2 pts)*

L'équation (E) : $x^2 + x - u^2 = 0$ est une équation du second degré avec $a = 1$, $b = 1$ et $c = -u^2$.

♥ **$\Delta = b^2 - 4ac$; si $\Delta > 0$, l'équation a deux solutions réelles distinctes.**

$$\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times \left(-u^2\right) = 1 + 4u^2$$

Un carré est toujours positif ou nul : $u^2 \geqslant 0$, donc $4u^2 \geqslant 0$, donc $\Delta = 1 + 4u^2 \geqslant 1 > 0$.

VRAIE : pour tout réel u, $\Delta = 1 + 4u^2 > 0$, donc (E) a deux solutions réelles distinctes.

Attention, piège : *$c = -u^2$, donc $-4ac = -4 \times 1 \times (-u^2) = +4u^2$. Et tester une ou deux valeurs de u ne suffit pas pour prouver « quelle que soit la valeur ».*

Affirmation 2 *(1,5 pt)*

Pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = 2^{-(n+1)} = 2^{-n} \times 2^{-1} = u_n \times \frac{1}{2}$$

♥ **(u_n) est géométrique de raison q si, pour tout n, $u_{n+1} = q \times u_n$.**

On peut aussi écrire $u_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$: c'est la forme $u_n = u_0 \times q^n$ avec $u_0 = 1$ et $q = \frac{1}{2}$.

VRAIE : (u_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $u_0 = 1$.

Attention, piège : *le signe moins de l'exposant ne rend pas la raison négative : $2^{-1} = \frac{1}{2}$, et non -2.*

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Affirmation 3 *(1,5 pt)*


♥ Tangente au point d'abscisse a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$

$f(0) = \mathrm{e}^0 - 1 = 1 - 1 = 0$. La dérivée de $x \mapsto \mathrm{e}^x$ est $x \mapsto \mathrm{e}^x$ et celle d'une constante est nulle, donc $f'(x) = \mathrm{e}^x$ et $f'(0) = \mathrm{e}^0 = 1$.

$T : y = 1 \times (x - 0) + 0$, soit $y = x$.

Pour $x = 3$, on obtient $y = 3$: les coordonnées de A vérifient l'équation de T.

VRAIE : T a pour équation $y = x$ et $A(3\,;\,3)$ appartient à T.




Attention, piège : *le point A est sur la tangente, pas sur la courbe : $f(3) = \mathrm{e}^3 - 1 \approx 19 \neq 3$. Et $\mathrm{e}^0 = 1$, pas 0.*

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Exercice 3 · Produit scalaire et angle $\widehat{\text{PKM}}$

4 points



1. Coordonnées et norme de $\overrightarrow{KP}$ *(0,5 pt)*

♥ $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$ **et, dans un repère orthonormé,** $\left\|\vec{u}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}\right\| = \sqrt{a^2+b^2}$

$\overrightarrow{KP}\begin{pmatrix} 4-1 \\ 0-0 \end{pmatrix}$, soit $\overrightarrow{KP}\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$, et $\left\|\overrightarrow{KP}\right\| = \sqrt{3^2+0^2} = \sqrt{9} = 3$.

$\overrightarrow{KP}\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\left\|\overrightarrow{KP}\right\| = 3$

2. Coordonnées et norme de $\overrightarrow{KM}$ *(0,5 pt)*

$\overrightarrow{KM}\begin{pmatrix} x-1 \\ 3-0 \end{pmatrix}$, soit $\overrightarrow{KM}\begin{pmatrix} x-1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

$\overrightarrow{KM}\begin{pmatrix} x-1 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\left\|\overrightarrow{KM}\right\| = \sqrt{(x-1)^2+9}$

Attention, piège : *on ne simplifie pas la racine :* $\sqrt{(x-1)^2+9} \neq (x-1)+3$.

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

3. Produit scalaire $\overrightarrow{KP} \cdot \overrightarrow{KM}$ *(0,75 pt)*

♥ **Dans un repère orthonormé :** $\vec{u}\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix} \cdot \vec{v}\begin{pmatrix}a'\\b'\end{pmatrix} = aa' + bb'$

$$\overrightarrow{KP} \cdot \overrightarrow{KM} = 3 \times (x-1) + 0 \times 3 = 3x - 3$$

$\overrightarrow{KP} \cdot \overrightarrow{KM} = 3x - 3$

4. Si $\widehat{\text{PKM}} = \dfrac{\pi}{3}$, alors x est solution de (E) *(1,25 pt)*

On calcule le même produit scalaire d'une deuxième façon, avec l'angle :

♥ $\vec{u} \cdot \vec{v} = \left\|\vec{u}\right\| \times \left\|\vec{v}\right\| \times \cos\left(\vec{u}, \vec{v}\right)$

Si $\widehat{\text{PKM}} = \dfrac{\pi}{3}$, avec $\cos\dfrac{\pi}{3} = \dfrac{1}{2}$:

$$\overrightarrow{KP} \cdot \overrightarrow{KM} = 3 \times \sqrt{(x-1)^2+9} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{2}\sqrt{(x-1)^2+9}$$

D'après la question 3, on a donc $\dfrac{3}{2}\sqrt{(x-1)^2+9} = 3x - 3$. On multiplie les deux membres par $\dfrac{2}{3}$:

$$\sqrt{(x-1)^2+9} = \frac{2}{3}(3x-3) = 2x - 2$$

Si $\widehat{\text{PKM}} = \dfrac{\pi}{3}$, alors x est solution de (E) : $\sqrt{(x-1)^2+9} = 2x - 2$.

Attention, piège : *$\cos\dfrac{\pi}{3} = \dfrac{1}{2}$ et $\sin\dfrac{\pi}{3} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$: ne les échange pas. Pense au cercle trigonométrique.*

5. $1+\sqrt{3}$ est solution de (E) *(1 pt)*

On remplace x par $1+\sqrt{3}$ dans chaque membre, séparément.

Membre de gauche : $x - 1 = \sqrt{3}$, donc

$$\sqrt{(x-1)^2+9} = \sqrt{\left(\sqrt{3}\right)^2+9} = \sqrt{3+9} = \sqrt{12} = \sqrt{4\times 3} = 2\sqrt{3}$$

Membre de droite : $2x - 2 = 2\left(1+\sqrt{3}\right) - 2 = 2 + 2\sqrt{3} - 2 = 2\sqrt{3}$.

Les deux membres sont égaux.

$1+\sqrt{3}$ est solution de (E) : les deux membres valent $2\sqrt{3}$.

Attention, piège : *« vérifier » ne demande pas de résoudre l'équation : on calcule chaque membre de son côté, sans partir de l'égalité à démontrer. Et $\sqrt{12}$ se simplifie en $2\sqrt{3}$ en faisant apparaître un carré parfait : $12 = 4 \times 3$.*

Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Et maintenant ?

Tu as fait le plus dur : t'entraîner sur un vrai sujet. Pour continuer à progresser avec moi :

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Le petit mot



Bravo d'être allé jusqu'au bout.
Refaire un sujet complet avec son corrigé, c'est exactement comme ça qu'on progresse.

Ne regarde pas seulement ta note. Relis les « Attention, piège », refais sans le corrigé les questions que tu as ratées, et recopie dans ton carnet ce qui t'a manqué : une formule, un mot de vocabulaire, une méthode.

Et si une notion te résiste, écris-moi en message privé sur Instagram ou TikTok : on la retravaille ensemble.

Je crois en toi.
La prof Julie

Bon courage pour ton Bac !
@la_prof_julie