



FICHA DE EXERCÍCIOS 1
SÉRIES DE POTÊNCIAS E FÓRMULA DE TAYLOR

Exercícios Propostos

1. Determine o domínio de convergência das seguintes séries de potências, indicando os pontos onde a convergência é simples ou absoluta.

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n$; (b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x)^n}{(n-1)!}$; (c) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}$; (d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x-3)^n}{2n+4}$;
(e) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!} x^n$; (f) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n!(x-2)^n}{n-1}$; (g) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n} (x+2)^n$; (h) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{2+n^3} x^n$;
(i) $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{x^{3n}}{\ln n}$; (j) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n6^n} (3x-2)^n$; (k) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n+1}{2^n} (x-2)^n$; (l) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-2)^n}{\sqrt{2n+1}} x^n$;
(m) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(-2)^n} x^{2n}$.

2. Mostre que:

- (a) se $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ é absolutamente convergente num dos extremos do seu domínio de convergência, então também é absolutamente convergente no outro extremo;
(b) se o domínio de convergência de $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ é $] -r, r]$, então a série é simplesmente convergente em $x = r$.

3. Determine os polinómios de Taylor seguintes:

(a) $T_0^3(x^3 + 2x + 1)$; (b) $T_\pi^3(\cos x)$; (c) $T_1^3(xe^x)$;
(d) $T_0^5(\sin x)$; (e) $T_0^6(\sin x)$; (f) $T_1^n(\ln x)$ ($n \in \mathbb{N}$).

4. Considere $f(x) = e^x$.

- (a) Escreva a fórmula de MacLaurin de ordem n da função f .
(b) Mostre que o polinómio de MacLaurin de ordem n permite aproximar e^x no intervalo $] -1, 0]$, com erro inferior a $\frac{1}{(n+1)!}$.
(c) Escolha um dos polinómios de MacLaurin de f e use-o para obter uma aproximação de $\frac{1}{\sqrt{e}}$, indicando uma estimativa para o erro cometido nessa aproximação.
5. Usando o resto de Lagrange, determine um majorante para o erro cometido na aproximação de $\sin(3)$ quando se usa o polinómio de Taylor de ordem 5 em torno do ponto $a = \pi$.
6. Mostre que o polinómio de MacLaurin de ordem 7 da função seno permite aproximar os valores desta função, no intervalo $[-1, 1]$, com erro inferior a $\frac{1}{2} \times 10^{-4}$.

7. (a) Obtenha o polinómio de Taylor de ordem $n \in \mathbb{N}$ da função $f(x) = \frac{1}{x}$ no ponto $c = 1$.
 (b) Determine um valor de n para o qual se garanta que o polinómio $T_1^n(\frac{1}{x})$, obtido na alínea anterior, aproxime $\frac{1}{x}$ no intervalo $[0.9, 1.1]$, com erro inferior a 10^{-3} .
8. Determine o menor valor de n tal que o polinómio de MacLaurin de ordem n da função $f(x) = e^x$ aproxime $f(1)$ com erro inferior a 10^{-3} .
9. Mostre, usando a fórmula de Taylor, que $\ln(1+x) \leq x$, para todo $x > -1$.
10. Considere a representação em série de potências da função $\frac{1}{1-x}$ dada por

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n, \quad -1 < x < 1.$$

Determine uma representação em série de potências para cada uma das seguintes funções (indicando o intervalo onde tal é válida):

$$(a) \frac{1}{1-3x}; \quad (b) \frac{2}{2+x}; \quad (c) \frac{1}{x}.$$

11. Desenvolva a função $f(x) = \frac{1}{x+1}$ em série de potências de $x-3$, indicando o maior intervalo onde o desenvolvimento é válido.
12. ¹ Considere a seguinte série de potências $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{4^n}{n+1} (x-1)^n$.
- (a) Calcule o raio de convergência da série.
 (b) Determine o seu domínio de convergência.
13. Seja $f(x) = \ln x$, $x \in \mathbb{R}^+$.
- (a) Determine o polinómio de Taylor de f de ordem 3 centrado em $c = 1$, isto é, $T_1^3 f(x)$.
 (b) Mostre que o erro absoluto cometido ao aproximar $\ln(\frac{3}{2})$ usando $T_1^3 f(\frac{3}{2})$ é inferior a $\frac{1}{64}$.

Exercícios Resolvidos

1. Determine o domínio de convergência da série de potências $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{x-2}{4} \right)^n$.

Resolução: Usando o Critério da Raíz,

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\left| \frac{1}{n} \left(\frac{x-2}{4} \right)^n \right|} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|x-2|}{4 \sqrt[n]{n}} \\ &= \frac{|x-2|}{4} \end{aligned}$$

Assim, a série é convergente para valores de x tais que $L < 1$ e divergente para valores de x tais que $L > 1$. Como, $\frac{|x-2|}{4} < 1 \Leftrightarrow -2 < x < 6$, o intervalo de convergência da série é $I =]-2, 6[$. Podem

¹A partir deste exercício são retomados conteúdos já abordados em exercícios anteriores.

ainda pertencer ao domínio de convergência os pontos $x = -2$ e $x = 6$.

Para $x = -2$, obtem-se

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} (-1)^n,$$

trata-se da série harmónica alternada, que é convergente (esta conclusão pode obter-se usando o Critério de Leibniz).

Para $x = 6$, obtem-se

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n},$$

trata-se da série harmónica, que é divergente.

Conclusão, o domínio de convergência da série é $[-2, 6[$.

Nota: Em alternativa, pode determinar o intervalo de convergência I , calculando o raio de convergência usando os coeficientes da série.

2. (a) Escreva a fórmula de Taylor de 2.^a ordem no ponto 1 da função $f(x) = \ln(x)$.
(b) Calcule um valor aproximado de $\ln(1.2)$ usando o polinómio de Taylor de ordem 2 obtido na alínea anterior e mostre que o erro absoluto cometido é inferior a 3×10^{-3} .

Resolução:

(a) Como

$$\begin{aligned} f(x) &= \ln(x), & f(1) &= 0 \\ f'(x) &= \frac{1}{x}, & f'(1) &= 1 \\ f''(x) &= -\frac{1}{x^2}, & f''(1) &= -1 \\ f^{(3)}(x) &= \frac{2}{x^3}, & f^{(3)}(\theta) &= \frac{2}{\theta^3} \end{aligned}$$

o polinómio de Taylor de ordem 2 no ponto 1 e o resto de Lagrange de ordem 2 correspondente são, respetivamente,

$$\begin{aligned} T_1^2 f(x) &= 0 + 1(x-1) + \frac{-1}{2}(x-1)^2 \\ &= (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 \\ R_1^2 f(x) &= \frac{\frac{2}{\theta^3}}{3!}(x-1)^3 \\ &= \frac{1}{3\theta^3}(x-1)^3, \text{ para algum } \theta \text{ entre } x \text{ e } 1. \end{aligned}$$

A fórmula de Taylor pedida é

$$\ln(x) = (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3\theta^3}(x-1)^3, \text{ para algum } \theta \text{ entre } x \text{ e } 1.$$

(b)

$$\begin{aligned} \ln(1.2) &\simeq T_1^2 f(1.2) \\ &= 0.2 - \frac{1}{2}(0.2)^2 \\ &= 0.2 - 0.02 \\ &= 0.18 \end{aligned}$$

O erro absoluto cometido nesta aproximação é $|R_1^2 f(1.2)|$ e

$$\begin{aligned} |R_1^2 f(1.2)| &= \frac{\frac{2}{\theta^3}}{3!} (0.2)^3 \\ &= \frac{8}{3\theta^3} 10^{-3}, \text{ para algum } \theta \text{ entre } 1 \text{ e } 1.2, \\ &< \frac{8}{3} \times 10^{-3} \\ &< 3 \times 10^{-3} \end{aligned}$$

Soluções

1. (a) $] -1, 1[$, sendo absolutamente convergente em todos os pontos desse intervalo.
 (b) \mathbb{R} , sendo absolutamente convergente em todos os pontos desse intervalo.
 (c) $] -1, 1]$, sendo simplesmente convergente em $x = 1$ e absolutamente convergente nos restantes pontos.
 (d) $[1, 2[$, sendo simplesmente convergente em $x = 1$ e absolutamente convergente nos restantes pontos.
 (e) \mathbb{R} , sendo absolutamente convergente em todos os pontos desse intervalo.
 (f) $\{2\}$, sendo absolutamente convergente nesse ponto.
 (g) $[-3, -1[$, sendo simplesmente convergente em $x = -3$ e absolutamente convergente nos restantes pontos.
 (h) $[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}]$, sendo absolutamente convergente em todos os pontos desse intervalo.
 (i) $[-1, 1[$, sendo simplesmente convergente em $x = -1$ e absolutamente convergente nos restantes pontos.
 (j) $] -\frac{4}{3}, \frac{8}{3}]$, sendo simplesmente convergente em $x = \frac{8}{3}$ e absolutamente convergente nos restantes pontos.
 (k) $]0, 4[$, sendo absolutamente convergente em todos os pontos desse intervalo.
 (l) $] -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, sendo simplesmente convergente em $x = \frac{1}{2}$ e absolutamente convergente nos restantes pontos.
 (m) $] -\sqrt{2}, \sqrt{2}[$, sendo absolutamente convergente em todos os pontos do intervalo.
2. —
3. (a) $T_0^3(x^3 + 2x + 1) = x^3 + 2x + 1$
 (b) $T_\pi^3(\cos x) = -1 + \frac{(x-\pi)^2}{2}$
 (c) $T_1^3(xe^x) = e + 2e(x-1) + \frac{3}{2}e(x-1)^2 + \frac{2}{3}e(x-1)^3$
 (d) $T_0^5(\sin x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}$
 (e) $T_0^6(\sin x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}$
 (f) $T_1^n(\ln x) = (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3 + \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{n}(x-1)^n$.
4. (a) $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^\theta}{(n+1)!} x^{n+1}$, para algum θ entre 0 e x .
 (b) —
 (c) Por exemplo, $\frac{1}{\sqrt{e}} \simeq T_0^2 f(-\frac{1}{2}) = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = \frac{5}{8} = 0.625$, com erro inferior a $\frac{1}{6}$.
5. $|R_5(3)| \leq \frac{(3-\pi)^6}{6!}$

6. —
7. (a) $T_1^n\left(\frac{1}{x}\right) = 1 - (x-1) + (x-1)^2 + \cdots + (-1)^n(x-1)^n$, $n \in \mathbb{N}$.
 (b) $n = 3$ (ou outro superior a este).
8. $n = 6$.
9. —
10. (a) $\sum_{n=0}^{\infty} 3^n x^n$, para $-\frac{1}{3} < x < \frac{1}{3}$;
 (b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n} x^n$, para $-2 < x < 2$;
 (c) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x-1)^n$, para $0 < x < 2$.
11. $\frac{1}{x+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^{n+1}} (x-3)^n$, $x \in]-1, 7[$.
12. (a) $R = \frac{1}{4}$.
 (b) $[\frac{3}{4}, \frac{5}{4}[$.
13. (a) $T_1^3 f(x) = x - 1 - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3$.
 (b) —