

Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro

CÁLCULO 2 - agrup. 1

2017/18

Folha 4: Equações com derivadas ordinárias

1. Verifique que as seguintes equações diferenciais são exactas e resolva-as:

(a) $(3x^2 - 2xy)dx + (2y - x^2)dy = 0$

(d) $xe^{xy}y' + ye^{xy} - 4x^3 = 0$

(b) $3x^3y^2y' + 3x^2y^3 - 5x^4 = 0$

(e) $\cos x \cos y - (\sin x \sin y + y^2)y' = 0$

(c) $(3x^2y^2 - 4xy)dy + (2xy^3 - 2y^2)dx = 0$

(f) $(x - y + 1)dy - (x - y - 1)dx = 0$.

2. Encontre a solução geral das seguintes equações e, quando aplicável, resolva os problemas de valores iniciais:

(a) $x^2y' + y = 0$

(e) $y'x^3 = 2y$

(b) $x + xy + y'(y + xy) = 0$

(f) $2y'\sqrt{x} = y, y(4) = 1$

(c) $t\sqrt{1+y^2} + y\sqrt{1+t^2}y' = 0$

(g) $y' = (2y + 1) \cot x, y\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$

(d) $y' \tan x = y$

(h) $x^2y' + y^2 = 0, y(-1) = 1$

3. Encontre a solução geral das seguintes equações e, quando aplicável, resolva os problemas de valores iniciais:

(a) $y' - 2y = x^2 + x,$

(f) $y' - \frac{2}{x}y = x, \quad y(1) = 0.$

(b) $y' + (\cos(x))y = \sin(x) \cos(x),$

(g) $y^{(4)} + y^{(3)} = 2$

(c) $xy' + y = 3x^3 - 1, \quad x > 0,$

(h) $\sqrt{(x^2 - 1)(y^2 - 1)} y' = -x^2, \quad y(2) = 2$

(d) $y' - y \tan(x) = e^{\sin(x)}, \quad 0 < x < \pi/2,$

(i) $2xy^3 + 3x^2y^2y' = 0, \quad y(1) = 1$

(e) $y' + ay = \sin x + e^{-5x}, \quad y(0) = 0,$

4. Encontre a solução geral das seguintes equações homogéneas:

(i) $yy' = 2y - x$

(ii) $x^2 + y^2 - 2xyy' = 0$

5. Uma equação diferencial da forma $y' + a(x)y = b(x)y^k, k \in \mathbb{R}$, diz-se de uma *equação de Bernoulli*. Resolva os problemas

$$(i) \quad y'x + y = -xy^2$$


$$(ii) \quad y' - xy = -y^3e^{-x^2}.$$

6. Durante uma certa reacção química a concentração de clorobutano (C_4H_9Cl) satisfaz a equação

$$\frac{d[C_4H_9Cl]}{dt} = -k[C_4H_9Cl]$$

com $k = 0,1223/\text{seg}$. Quanto tempo precisa a reacção consumir 90% da quantia inicial do clorobutano?

7. Considere a decomposição de dióxido de nitrogénio:



Porque esta reacção precisa de duas moléculas de NO_2 o rácio da reacção é proporcional ao quadrado da concentração de NO_2 , i.e.

$$\frac{d[NO_2]}{dt} = -k[NO_2]^2$$

onde $[NO_2]$ denota a concentração de NO_2 e k é uma constante. Determine a concentração $[NO_2]$ em função da temperatura t .

8. Considere uma colónia de bactérias a crescer num ambiente com recursos limitados. Neste caso um modelo geral para o crescimento dessa colónia é dado pela equação logística

$$\frac{dP}{dt} = kP \left(1 - \frac{P}{P_{\max}} \right)$$

Determine a população P em relação ao tempo t .

9. O Sr. Silva tirou uma garrafa de cerveja do frigorífico, que estava à temperatura de 7°C . Antes de conseguir abri-la chegou o seu irmão, que o manteve ocupado durante cerca de 90 minutos. Isto aconteceu na sala de estar, mantida a uma temperatura confortável de 19°C . O Sr. Silva, após a saída do seu irmão, mediu a temperatura da sua cerveja, chegando à conclusão de que esta se encontrava agora à temperatura de 15°C , demasiadamente alta para a cerveja ser bebida. Como qualquer bebedor de cerveja, sabe que a lei do arrefecimento de Newton estabelece que

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_a),$$

onde $T = T(t)$ é a temperatura, T_a a temperatura ambiente e $k > 0$ é uma constante que depende apenas da cerveja. Assim, o Sr. Silva conclui que uma garrafa à temperatura ambiente da sala deve ser posta no frigorífico por 3 horas de forma a reduzir a sua temperatura para uns aceitáveis 8°C .

Ele tem razão? Encontrando-se agora à temperatura de 15°C , quanto tempo deve a garrafa ficar no frigorífico ?

10. Um bolo de maçã com temperatura inicial de 170°C é tirado do forno e deixado a arrefecer numa sala com temperatura ambiente de 20°C . Dado que a temperatura do bolo inicialmente está a decrescer num rácio de $3^{\circ}\text{C}/\text{min}$, quanto tempo precisamos de esperar até o bolo ficar a uma temperatura de 30°C ?

11. Em 1974 Stephen Hawking descobriu que os buracos negros emitem uma pequena quantia de radiação, que resulta numa evaporação lenta do buraco. De acordo com Hawking, a massa M de um buraco negro satisfaz a equação

$$\frac{dM}{dt} = -\frac{k}{M^2}$$

com $k = 1,25 \times 10^{23}\text{kg}^3/\text{ano}$.

- (a) Determine a solução geral completa desta equação.
- (b) Depois de uma supernova, o resto da estrela colapsou num buraco negro com massa inicial de $6,00 \times 10^{31}\text{kg}$. Quanto tempo o buraco negro vai precisar para evaporar completamente?
12. A equação de Gompertz foi usada para modelar o crescimento de tumores malignos. A equação diz que

$$\frac{dP}{dt} = kP(\ln P_{\max} - \ln P)$$

onde P denota a população das células de cancro e k, P_{\max} são constantes.

- (a) Determine a solução geral usando separação de variáveis.
- (b) Um tumor com 5000 células cresce inicialmente com um rácio de 200 células/dia. Supondo um tamanho máximo do tumor de $P_{\max} = 100000$ células, qual é o seu tamanho depois de 100 dias?
13. (Datação por carbono do sudário de Turin) O mais famoso exemplo de datação por carbono é o Sudário de Turin, que se pensa ter coberto Jesus na sua campa. Em 1988, amostragens do tecido foram estudadas e a ETH de Zurique obteve o valor médio $M = 0.8808$, da razão entre carbono 14 e carbono 12. Sabendo que o nível de carbono 12 é constante, podemos considerar a equação

$$\frac{dM}{dt} = -rM,$$

onde $r = 1.2097 \times 10^{-4}/\text{anos}$ denota o *tempo de meia vida* do carbono 14, com valor inicial $M(0) = 1$. Resolva a equação e determine o tempo t necessário para chegar ao valor médio obtida na ETH.

14. Determine a solução geral da EDO linear homogénea:

$$(a) \quad y^{(4)} - 4y^{(3)} + 6y'' - 4y' = 0$$

$$(d) \quad y''' - 2y'' + y' - 2y = 0$$

$$(b) \quad y''' - 4y'' + 4y' - y = 0$$

$$(e) \quad y^{(5)} + y^{(4)} + 2y''' + 2y'' + y' + y = 0$$

$$(c) \quad y''' - 2y'' + y' = 0$$

15. Determine a solução do PVI

$$(a) \quad y'' - 3y' + 2y = 6e^{-x} \text{ com } y(0) = 9 \text{ e } y'(0) = 6 \quad (e) \quad y''' + y'' - 4y' - 4y = 2 - 4x \text{ com } y(0) = \frac{1}{2} \text{ e}$$

$$(b) \quad y''' + y'' - 5y' + 3y = 6 \sinh(2x) \text{ com } y(0) = y'(0) = y''(0) = 0$$

$$(c) \quad y'' - 6y' + 9y = 0 \text{ com } y(0) = 1 \text{ e } y'(0) = 0$$

$$(f) \quad y'' + 4y = f(x) \text{ com } y(0) = 1, y'(0) = 0 \text{ e}$$

$$(d) \quad y'' + 4y = \cos(2x) \text{ com } y(0) = 0 \text{ e } y'(0) = 1$$

$$f(x) = \begin{cases} 4x & 0 \leq x < \pi \\ 4\pi & x \geq \pi \end{cases}$$