

UJIAN AKHIR SEMESTER
MA1101 KALKULUS 1A
SENIN, 13 DESEMBER 2010
WAKTU 09:15 – 11:05 (110 MENIT)

Dilarang menggunakan kalkulator, handphone dan sejenisnya. Ujian ini terdiri dari 8 soal bagian A dan 3 soal bagian B. Setiap soal pada bagian A bernilai maksimum 3, sedangkan setiap soal pada bagian B bernilai maksimum 10. Selesaikanlah soal-soal tersebut pada tempat yang tersedia.

Bagian A

1. Hitunglah $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos x}{x}$. Jelaskan jawaban Anda.
2. Tentukan persamaan garis singgung kurva $y = 4x - x^2$ di titik $(2, 4)$.
3. Tentukan konstanta a dan b agar fungsi $f(x) = \begin{cases} \sin x & , x < \pi \\ ax + b & , x \geq \pi \end{cases}$ terdiferensialkan di $x = \pi$.
4. Tentukan y' jika $y = \ln(x^2 + x + 1)$.
5. Tentukan anti turunan dari $f(x) = \frac{3x}{\sqrt{2x^2 + 1}}$ yang grafiknya melalui titik $\left(0, \frac{3}{2}\right)$.
6. Hitunglah $\sin\left(2 \cos^{-1}\left(\frac{4}{5}\right)\right)$.
7. Tentukan selang kemonotonan grafik fungsi $g(x) = e^{x^2-1}$.
8. Tentukan solusi persamaan diferensial $\frac{dy}{dx} = \sqrt{\frac{x}{y}}$ dengan $y(1) = 4$.

Bagian B

1. Selebaran iklan harus memuat 50 inci persegi bahan cetakan. Margin kiri dan kanan selebaran tersebut masing-masing 1 inci, sedangkan margin atas dan bawahnya, masing-masing 2 inci. Tentukan ukuran selebaran tersebut yang menggunakan kertas sesedikit mungkin.
2. Tentukan pusat massa lamina homogen yang dibatasi oleh kurva $y = 9 - x^2$ dan sumbu x .
3. Bu Yayuk membuat puding dengan cara memanaskan adonan hingga mencapai 105° Celcius. Kemudian adonan tersebut diletakkan dalam ruang bertemperatur konstan 25° Celcius. Setelah 20 menit temperatur puding turun menjadi 65° Celcius. Puding tersebut akan siap saji jika temperaturnya mencapai 35° Celcius. Tentukan waktu yang diperlukan agar puding tersebut siap saji. (*Menurut Hukum Pendinginan Newton, laju perubahan temperatur suatu benda, sebanding dengan perbedaan temperatur benda tersebut dengan temperatur lingkungannya.*)

Pembahasan Soal Ujian Akhir Semester MA 1101 Kalkulus 1A Senin, 13 Desember 2010 Waktu 09.15-11.05 (110 Menit)

Dilarang menggunakan kalkulator, handphone, dan sejenisnya. Ujian ini terdiri dari 8 soal bagian A dan 3 soal bagian B. Setiap soal pada bagian A bernilai maksimum 3, sedangkan setiap soal pada bagian B bernilai maksimum 10. Selesaikanlah soal-soal tersebut pada tempat yang tersedia.

Bagian A

1. Hitunglah $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos x}{x}$. Jelaskan jawaban anda.

Jawab

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos x}{x}$$

Gunakan teorema apit

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) \leq \lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = L$$

$$-1 \leq \cos x \leq 1$$

maka, berdasarkan teorema apit $\frac{\cos x}{x} = 0$

$$-1 \leq \frac{\cos x}{x} \leq 1$$

$$\text{Jadi, } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos x}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{x} \right) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

2. Tentukan persamaan garis singgung kurva $y = 4x - x^2$ di titik (2,4)

Jawab

$$y = 4x - x^2$$

$$y' = 4 - 2x$$

$$m = y'(2,4) = 4 - 2(2) = 0$$

Persamaan garis singgung di titik (2,4) dan $m=0$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 4 = 0(x - 2)$$

$$y = 4$$

Jadi, persamaan garis singgung kurva adalah $y = 4$.

3. Tentukan konstanta a dan b agar fungsi $f(x) = \begin{cases} \sin x & , x < \pi \\ ax+b & , x \geq \pi \end{cases}$ terdiferensialkan di $x = \pi$

Jawab

Jika fungsi f punya turunan di $x = \pi$, maka fungsi f kontinu di $x = \pi$

Syarat agar fungsi f kontinu di $x = \pi$

$$\lim_{x \rightarrow \pi^-} f(x) = f(\pi) \text{ atau } \lim_{x \rightarrow \pi^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pi^+} f(x) = f(\pi)$$

Tinjau limit kiri

$$\lim_{x \rightarrow \pi^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pi^-} \sin x = \sin \pi = 0$$

Tinjau limit kanan

$$\lim_{x \rightarrow \pi^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pi^+} ax+b = \pi a + b$$

Tinjau fungsi

$$f(x) = ax+b \text{ maka } f(\pi) = \pi a + b \text{ sehingga } \boxed{\pi a + b = 0}$$

persamaan I

Syarat agar fungsi f punya turunan di $x = \pi$, $f'_+(\pi) = f'_-(\pi)$

Tinjau turunan Kanan

$$f'_-(\pi) = \lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{f(x) - f(\pi)}{x - \pi}$$

Tinjau turunan

$$f'_+(\pi) = \lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{f(x) - f(\pi)}{x - \pi}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{(ax+b) - (\pi a + b)}{x - \pi}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{\sin x - (\pi a + b)}{x - \pi}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{ax+b - \pi a - b}{x - \pi}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{\sin x - 0}{x - \pi}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{a(x-\pi)}{x-\pi}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{-\sin(x-\pi)}{x-\pi}, \sin(x-\pi) = -\sin x$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi^-} a = a$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi^+} (-1) = -1$$

sehingga $a = -1$, substitusi a ke persamaan I

$$\pi a + b = 0$$

$$\pi(-1) + b = 0$$

$$-\pi + b = 0$$

$$b = \pi$$

Jadi, fungsi punya turunan di $x = \pi$ jika $a = -1$ dan $b = \pi$

4. Tentukan y' jika $y = \ln(x^2 + x + 1)$

Jawab

$$y = \ln(x^2 + x + 1)$$

$$y' = \frac{2x+1}{x^2+x+1}$$

$$y' = \frac{1}{x^2+x+1} \cdot d(x^2+x+1)$$

5. Tentukan anti turunan dari $f(x) = \frac{3x}{\sqrt{2x^2+1}}$ yang grafiknya melalui titik $(0, \frac{3}{2})$

jawab

$$f(x) = \frac{3x}{\sqrt{2x^2+1}}$$

Cari konstanta C dari titik $(0, \frac{3}{2})$

$$y = \int f(x) dx$$

$$\frac{3}{2} = \frac{3}{2} \sqrt{2(0)^2+1} + C$$

$$y = \int \frac{3x}{\sqrt{2x^2+1}} dx$$

$$C = 0$$

sehingga

$$y = \frac{3}{2} \sqrt{2x^2+1} + C$$


$$f(x) = \frac{3}{2} \sqrt{2x^2+1} + 0$$

6. Hitunglah $\sin \left(2 \cos^{-1} \left(\frac{4}{5} \right) \right)$

jawab

$$\text{misal } \theta = \cos^{-1} \left(\frac{4}{5} \right)$$

$$\text{maka } \cos \theta = \frac{4}{5}; 0 \leq \theta \leq \pi$$



$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$\sin \left(2 \cos^{-1} \left(\frac{4}{5} \right) \right) = 2 \sin \left(\cos^{-1} \left(\frac{4}{5} \right) \right) \cos \left(\cos^{-1} \left(\frac{4}{5} \right) \right)$$

$$\sin \left(2 \cos^{-1} \left(\frac{4}{5} \right) \right) = 2 \left(\frac{3}{5} \right) \left(\frac{4}{5} \right)$$

$$\sin \left(2 \cos^{-1} \left(\frac{4}{5} \right) \right) = \frac{24}{25}$$

7. Tentukan selang kemonotonan grafik fungsi $g(x) = e^{x^2-1}$

jawab

Daerah asal dari $g(x) = e^{x^2-1}$ adalah $(-\infty, \infty)$


$$g(x) = e^{x^2-1}$$

$$g'(x) = e^{x^2-1} \frac{d}{dx} (x^2-1)$$

$$g'(x) = e^{x^2-1} \cdot 2x$$

$$\text{Titik stationer } g'(x) = 0$$

$$e^{x^2-1} \cdot 2x = 0, \text{ maka } x = 0 \text{ (dimana } e^{x^2-1} > 0).$$



Jadi, selang kemonotonan $g(x)$ adalah monoton naik $(-\infty, 0)$ dan monoton turun $(0, \infty)$

B. Tentukan solusi persamaan diferensial $\frac{dy}{dx} = \sqrt{\frac{x}{y}}$ dengan $y(1) = 4$

Jawab

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt{\frac{x}{y}}$$

maka $y = (x^{3/2} + C)^{2/3}$

Cari konstanta C menggunakan $y(1) = 4$

$$\sqrt{y} dy = \sqrt{x} dx$$

$$4 = ((1)^{3/2} + C)$$

$$\int \sqrt{y} dy = \int \sqrt{x} dx$$

$$1 + C = (4)^{3/2}$$

$$1 + C = (2^2)^{3/2}$$

$$\frac{2}{3} y^{3/2} = \frac{2}{3} x^{3/2} + C_1$$

$$1 + C = 8$$

$$C = 8 - 1 = 7$$

$$y^{3/2} = x^{3/2} + C \text{ dengan } C = \frac{3}{2} C_1$$

Jadi, solusi persamaan diferensial adalah $y = (x^{3/2} + 7)^{2/3}$

Bagian B

1. Selebaran iklan harus memuat 50 inci persegi bahan cetakan. Margin kiri dan kanan selebaran tersebut masing-masing 1 inci, sedangkan margin atas dan bawahnya, masing-masing 2 inci. Tentukan ukuran selebaran tersebut yang menggunakan kertas sesedikit mungkin

Jawab

Ketentuan

x = lebar

y = tinggi

Area cetakan selebaran memiliki $\frac{dA}{dx} = \frac{-100}{(x-2)^2} + 4$

luas 50 inci persegi. persamaan $\frac{dA}{dx} = \frac{4x^2 - 16x - 84}{(x-2)^2}$

luasnya adalah

$$\frac{dA}{dx} = \frac{4x^2 - 16x - 84}{(x-2)^2}$$

$$(x-2)(y-4) = 50$$

$$\frac{dA}{dx} = \frac{4(x-7)(x+3)}{(x-2)^2}$$

$$y = \frac{50}{x-2} + 4$$

$$\frac{dA}{dx} = \frac{4(x-7)(x+3)}{(x-2)^2}$$

Substitusi persamaan y pada persamaan A

titik kritis akan diperoleh saat

$$A = xy$$

$\frac{dA}{dx} = 0$. Ini akan menghasilkan $x=7$ dan $x=-3$. $x=-3$ Tidak memenuhi domain

$$A = x \left(\frac{50}{x-2} + 4 \right)$$

$(2, \infty)$ Saat $\frac{dA}{dx} < 0$ untuk x di

$$A = \frac{50x}{x-2} + 4x$$

$(2, 7)$ dan $\frac{dA}{dx} > 0$ untuk x di $(7, \infty)$

Kita ingin meminimalkan area selebaran

$(2, 7)$ dan $\frac{dA}{dx} > 0$ untuk x di $(7, \infty)$

$$A = xy$$

dengan x berada pada interval $2 < x < \infty$. Kita ingin meminimalkan


A dinyatakan dalam dua variabel jadi kita perlu menulis satu dalam hal lain

Kita dapat menyimpulkan bahwa A mencapai nilai minimum saat $x=7$. Nilai ini akan membuat $y=14$. Jadi, dimensi dari selebaran akan mencapai minimum pada ukuran 7 inci x 14 inci

A pada interval buka $(2, \infty)$


$$\frac{dA}{dx} = \frac{(x-2)50 - 50x}{(x-2)^2} + 4$$

nilai minimum saat $x=7$. Nilai ini akan membuat $y=14$. Jadi, dimensi dari selebaran akan mencapai minimum pada ukuran 7 inci x 14 inci



2. Tentukan pusat massa lamina homogen yang dibatasi oleh kurva

jawab



$$m = \delta \int_{-2}^2 (4 - x^2) dx = 2\delta \int_0^2 (4 - x^2) dx = 2\delta \left[4x - \frac{x^3}{3} \right]_0^2 = 2\delta [(8 - \frac{8}{3}) - 0] = 36\delta$$

$$M_x = \frac{\delta}{2} \int_{-2}^2 (4 - x^2)^2 dx = 2 \frac{\delta}{2} \int_0^2 (4 - x^2)^2 dx = \delta \int_0^2 (16 - 16x^2 + x^4) dx$$

$$M_x = \delta \left[16x - \frac{16x^3}{3} + \frac{x^5}{5} \right]_0^2 = \delta \left[(128 - \frac{128}{3} + \frac{32}{5}) - 0 \right] = \delta \left(\frac{405 + 243}{5} \right) = \frac{648}{5} \delta$$

$x = 0$, karena kurva $y = 4 - x^2$ simetris terhadap sumbu y

$$\bar{y} = \frac{M_y}{m} = \frac{\frac{648}{5} \delta}{36\delta} = \frac{54}{15}$$

jadi, pusat massa lamina adalah

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (0, \frac{54}{15})$$

3. Bu Yayuk membuat pudding dengan cara memanaskan adonan hingga mencapai 105°Celsius . Kemudian adonan tersebut diletakkan dalam ruang bertemperatur konstan 25°Celsius . Setelah 20 menit temperatur pudding turun menjadi 65°Celsius . Pudding tersebut akan siap saji jika temperaturnya mencapai 35°Celsius . Tentukan waktu yang diperlukan agar pudding siap saji (Menurut Hukum Perbandingan Newton, laju perubahan temperatur suatu benda sebanding dengan perbedaan temperatur benda tersebut dengan temperatur lingkungannya)

Diketahui

$$t = 0, T_b = 105^\circ \text{C}$$

$$t = 20, T_b = 65^\circ \text{C}$$

$$\frac{dT_b}{dt} = k(T_b - 25)$$

$$\int \frac{dT_b}{T_b - 25} = \int \frac{du}{u} = \ln|u| + C$$

$$\frac{dT_b}{dt} = k(T_b - T_i)$$

$$\int \frac{dT_b}{T_b - 25} = k \int dt$$

$$\ln|u| = kt + C \text{ maka } \ln|T_b - 25| = kt + C$$

→ Cari konstanta C

$$t = 0$$

$$T_b = 105^\circ \text{C}$$

$$\frac{dT_b}{dt} = k(T_b - 25)$$

$$\text{misal } u = T_b - 25$$

$$\text{maka } du = dT_b$$

$$\ln |105 - 25| = k(0) + C$$

$$\ln 80 = C$$

maka $C = \ln 80$

$$\ln |T_b - 25| = kt + \ln 80$$

→ Cari konstanta k

$$t = 20, T_b = 65^\circ\text{C}$$

$$\ln |65 - 25| = k(20) + \ln 80$$

$$\ln 40 = 20k + \ln 80$$

$$20k = \ln 40 - \ln 80 = \ln \left(\frac{40}{80} \right) = \ln \frac{1}{2} = \ln 2^{-1} = -\ln 2$$

maka $k = -\frac{\ln 2}{20}$. Sehingga $\ln |T_b - 25| = \left(-\frac{\ln 2}{20} \right) t + \ln 80$

→ Cari waktu t pudding siap saji pada saat $T_b = 35^\circ\text{C}$

$$\ln |35 - 25| = \left(-\frac{\ln 2}{20} \right) t + \ln 80$$

$$\left(-\frac{\ln 2}{20} \right) t = \ln 10 - \ln 80 = \ln \left(\frac{1}{8} \right) = \ln (2^{-3}) = -3 \ln 2$$

$$\cancel{\frac{\ln 2}{20}} t = 3 \cancel{\ln 2}$$

$$t = 3 \cdot 20$$

$$t = 60 \text{ menit}$$

Jadi, pudding siap disajikan dalam 60 menit