

UJIAN AKHIR SEMESTER I
MA 1101 KALKULUS IA
2014/2015


Bagian A

1. Soal. Hitunglah $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{2}{x}$
2. Soal. Tentukan turunan pertama dari fungsi $f(x) = \frac{1 + \sin x}{\cos x}$
3. Soal. Gunakan aturan trapesium dengan $n = 3$ untuk menghampiri nilai $\int_0^3 \sqrt{3x^2 + 6x + 1} \, dx$
4. Soal. Hitunglah $\int_0^1 \frac{x}{x+1} \, dx$
5. Soal. Jika laju $y = f(x)$ terhadap x adalah $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{(x+1)^2}$ dan $f(0) = 2$, tentukan $f(2)$.
6. Soal. Tentukan solusi persamaan diferensial $y' + y = 2xe^x$.
7. Soal. Jika $y = f(x)$ termuat secara implisit dalam $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 2$, tentukan persamaan garis singgung pada kurva f di titik $(1,1)$.

Bagian B

1. Soal. Diketahui $f(x) = \begin{cases} x^2 + c^2, & x \leq 1 \\ cx + 1, & x > 1 \end{cases}$
 - (a) Tentukan $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$, dan konstanta c agar f kontinu di 1.
 - (b) Gambarkan kurva f untuk c yang diperoleh.

2. **Soal.** Diketahui daerah D yang dibatasi kurva $y = 2\sqrt{x}$, garis $x = 1$, dan garis $y = x$ (lihat gambar). Hitunglah



- (a) Luas D,
- (b) Volume benda jika D diputar terhadap sumbu x,
- (c) Volume jika D diputar terhadap sumbu y.
3. **Soal.** Laju perubahan waktu tertentu banyaknya penduduk suatu kota pada setiap saat sebanding dengan banyaknya penduduk pada saat itu. Jika pada tahun 2000 (saat $t = 0$) jumlah penduduk kota itu 1,5 juta jiwa dan pada tahun 2008 (saat $t = 8$) banyaknya penduduk kota itu 3 juta jiwa, tentukan :
- (a) Banyaknya penduduk setiap saat t untuk $0 \leq t \leq 20$,
- (b) Banyaknya penduduk pada tahun 2016

PEMBAHASAN UP 2014

1. Soal. Hitunglah $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{2}{x}$

$$L = \lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{2}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{2}{x}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 \sin \frac{2}{x}}{\frac{2}{x}} = 2 \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{2}{x}}{\frac{2}{x}}$$

misal $\theta = \frac{2}{x}$. saat $x \rightarrow \infty$ maka $\theta \rightarrow 0^+$ sehingga

$$L = 2 \cdot \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\sin \theta}{\theta} = 2 \cdot 1 = 2$$

$$\text{jadi, } \lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{2}{x} = 2$$

2. Soal. Tentukan turunan pertama dari fungsi $f(x) = \frac{1 + \sin x}{\cos x}$

$$u = 1 + \sin x \quad v = \cos x$$

$$du = \cos x \quad dv = -\sin x$$

$$f'(x) = \frac{\cos x \cdot \cos x - (1 + \sin x)(-\sin x)}{\cos^2 x}$$

$$= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x + \sin x}{\cos^2 x}$$

$$= \frac{1 + \sin x}{\cos^2 x}$$

$$= \frac{1}{\cos^2 x} + \frac{\sin x}{\cos x \cdot \cos x}$$

$$= \frac{1}{\cos^2 x} + \frac{\sin x}{\cos x} \cdot \frac{1}{\cos x}$$

$$= \sec^2 x + \sec x \cdot \tan x$$

$$\text{jadi, } f'(x) = \sec^2 x + \sec x \cdot \tan x$$

3. Soal. Gunakan aturan trapesium dengan $n = 3$ untuk menghampiri nilai $\int_0^3 \sqrt{3x^2 + 6x + 1} \, dx$

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} \quad \text{maka} \quad \Delta x = \frac{3-0}{3} = 1$$

$$x_0 = 0 \quad \text{maka} \quad f(0) = \sqrt{3(0)^2 + 6(0) + 1} = 1$$

$$x_1 = 1 \quad \text{maka} \quad f(1) = \sqrt{10}$$

$$x_2 = 2 \quad \text{maka} \quad f(2) = 5$$

$$x_3 = 3 \quad \text{maka} \quad f(3) = \sqrt{46}$$

$$\begin{aligned} \int_0^3 \sqrt{3x^2 + 6x + 1} \, dx &\approx \frac{1}{2} [f(0) + 2f(1) + 2f(2) + f(3)] \\ &= \frac{1}{2} [1 + 2\sqrt{10} + 2(5) + \sqrt{46}] \\ &= \frac{1}{2} [11 + 2\sqrt{10} + \sqrt{46}] \end{aligned}$$

4. Soal. Hitunglah $\int_0^1 \frac{x}{x+1} \, dx$

$$u = x+1 \rightarrow x = u-1$$

$$du = dx$$

• ganti batas integral

$$x=1 \quad \text{maka} \quad u = (1)+1 = 2$$

$$x=0 \quad \text{maka} \quad u = 0+1 = 1$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{x}{x+1} \, dx &= \int_1^2 \frac{u-1}{u} \, du \\ &= \int_1^2 \left[1 - \frac{1}{u}\right] \, du \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &[u - \ln|u|]_1^2 \\ &(2 - \ln 2) - (1 - \ln 1) \\ &2 - \ln 2 - 1 + 0 \quad [\ln 1 = 0] \\ &1 - \ln 2 \end{aligned}$$

5. Soal. Jika laju $y = f(x)$ terhadap x adalah $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{(x+1)^2}$ dan $f(0) = 2$, tentukan $f(2)$.

$$dy = \frac{1}{(x+1)^2} \, dx$$

$$\int dy = \int \frac{1}{(x+1)^2} \, dx$$

$$y = -\frac{1}{x+1} + C$$

Cari konstanta C dari $f(0) = 2$

$$2 = -\frac{1}{0+1} + C$$

$$1 = -1 + C$$

$$C = 2$$

$$f(x) = -\frac{1}{x+1} + 2$$

$$f(2) = -\frac{1}{2+1} + 2 = \frac{5}{3}$$

6. Soal. Tentukan solusi persamaan diferensial $y' + y = 2xe^x$.

[DIASUMSIKAN SALAH SOAL]

seharusnya $y' - y = 2xe^x$

$$p(x) = -1 \quad \text{maka} \quad \int p(x) \, dx = \int -1 \, dx = -x + C$$

$$\text{faktor integrasi} \quad I(x) = e^{\int p(x) \, dx} = e^{-x}$$

$$\text{gunakan rumus} \quad \frac{d}{dx} [y \cdot I(x)] = Q(x) \cdot I(x) \quad \text{dengan}$$

$$Q(x) = 2xe^x$$

$$\frac{d}{dx} (y \cdot e^{-x}) = 2xe^x \cdot e^{-x}$$

$$d(y \cdot e^{-x}) = 2xe^0 \, dx$$

$$\int d(y \cdot e^{-x}) = \int 2x \, dx$$

$$y \cdot e^{-x} = x^2 + C$$

$$y = e^x (x^2 + C)$$

7. Soal. Jika $y = f(x)$ termuat secara implisit dalam $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 2$, tentukan persamaan garis singgung pada kurva f di titik $(1,1)$.

• turunkan kurva $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 2$ terhadap x secara implisit

$$\frac{d}{dx} (\sqrt{x} + \sqrt{y}) = \frac{d}{dx} (2)$$

$$\frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{2\sqrt{y}} \cdot \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{2\sqrt{y}}{2\sqrt{x}} = -\sqrt{\frac{y}{x}}$$

$$m = \frac{dy}{dx} = -\sqrt{\frac{y}{x}} = -\sqrt{\frac{1}{1}} = -1$$

persamaan garis singgung di titik $(1,1)$ dan $m = -1$

$$y - 1 = -1(x - 1) \quad \text{atau} \quad y = -x + 2$$

1. Soal. Diketahui $f(x) = \begin{cases} x^2 + c^2, & x \leq 1 \\ cx + 1, & x > 1 \end{cases}$

- (a) Tentukan $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$, dan konstanta c agar f kontinu di 1.
(b) Gambarkan kurva f untuk c yang diperoleh.

a. $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 + c^2 = (1)^2 + c^2 = 1 + c^2$

$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} cx + 1 = c(1) + 1 = c + 1$


fungsi f kontinu di $x = 1$: $f(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$

$f(x) = x^2 + c^2$ maka $f(1) = 1^2 + c^2 = 1 + c^2$


sehingga $1 + c^2 = c + 1 \Leftrightarrow c^2 - c = 0 \Leftrightarrow c(c-1) = 0$

maka $c = 0$ dan $c = 1$


b. $c = 0$: $f(x) = \begin{cases} x^2; & x \leq 1 \\ 1; & x > 1 \end{cases}$



$c = 1$: $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1; & x \leq 1 \\ x + 1; & x > 1 \end{cases}$



2. Soal. Diketahui daerah D yang dibatasi kurva $y = 2\sqrt{x}$, garis $x = 1$, dan garis $y = x$ (lihat gambar). Hitunglah



- (a) Luas D,
(b) Volume benda jika D diputar terhadap sumbu x ,
(c) Volume jika D diputar terhadap sumbu y .

a. $L \approx \sum_{i=1}^n (2\sqrt{x_i} - x_i) \cdot \Delta x$

$$\begin{aligned} L &= \int_0^1 (2\sqrt{x} - x) dx \\ &= \left[\frac{4}{3} x^{3/2} - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 \\ &= \left[\frac{4}{3} - \frac{1}{2} \right] \\ &= \frac{5}{6} \end{aligned}$$

c. METODE KULIT TABUNG

$\Delta V = 2\pi r h \cdot \Delta x$

$r = x$

$h = 1 - x^2$

$$\begin{aligned} V &\approx 2\pi \int_0^1 x(1-x^2) dx \\ &= 2\pi \int_0^1 x - x^3 dx \\ &= \pi \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{2}\pi \end{aligned}$$

b. METODE CINCIN

$$R(\text{Jari-jari luar}) = 2\sqrt{x}$$

$$r(\text{Jari-jari dalam}) = x$$

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^1 [(2\sqrt{x})^2 - (x^2)] dx \\ &= \pi \int_0^1 (4x - x^2) dx \\ &= \pi \left[2x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 \\ &= \pi \left[(2 - \frac{1}{3}) \right] \\ &= \frac{5}{3} \pi \end{aligned}$$

3. Soal. Laju perubahan waktu tertentu banyaknya penduduk suatu kota pada setiap saat sebanding dengan banyaknya penduduk pada saat itu. Jika pada tahun 2000 (saat $t = 0$) jumlah penduduk kota itu 1,5 juta jiwa dan pada tahun 2008 (saat $t = 8$) banyaknya penduduk kota itu 3 juta jiwa, tentukan :

- (a) Banyaknya penduduk setiap saat t untuk $0 \leq t \leq 20$,
 (b) Banyaknya penduduk pada tahun 2016

a. Misal y adalah jumlah penduduk, maka

$$\frac{dy}{dt} = ky$$

$$\frac{dy}{y} = k dt$$

$$\int \frac{dy}{y} = \int k dt$$

$$\ln y = kt + C$$

$$y = 1.5 \text{ saat } t = 0$$

$$\ln 1.5 = k(0) + C$$

$$C = \ln 1.5$$

$$y = 3 \text{ saat } t = 8$$

$$\ln 3 = k(8) + C$$

$$\ln 3 = k(8) + \ln 1.5$$

$$k = \frac{\ln 2}{8}$$

$$\ln y = kt + \ln 1.5$$

$$y = e^{kt + \ln 1.5}$$

$$= e^{kt} \cdot e^{\ln 1.5}$$

$$= 1.5 e^{kt}$$

$$= 1.5 e^{\frac{\ln 2}{8} t}$$

$$\text{jadi, banyaknya penduduk : } y = 1.5 e^{\frac{\ln 2}{8} \cdot t}$$

b. $y(16) = 1.5 e^{\frac{16}{8} \ln 2}$

$$= 1.5 e^{2 \ln 2}$$

$$= 1.5 e^{\ln 2^2}$$

$$= 1.5 (2^2)$$

$$= 6$$

banyaknya penduduk adalah 6 juta jiwa