

ME951 - Estatística e Probabilidade I

Parte 9

Notas de aula de ME414 produzidas pelos professores **Samara Kiihl**, **Tatiana Benaglia** e **Benilton Carvalho** modificadas e alteradas pela Profa. **Larissa Avila Matos**

Variável Aleatória Discreta

Variável Aleatória

- Em um experimento aleatório, muitas vezes não estamos interessados nos detalhes do resultado do evento, mas sim em alguma quantidade numérica obtida a partir do experimento.

Variável Aleatória

- Em um experimento aleatório, muitas vezes não estamos interessados nos detalhes do resultado do evento, mas sim em alguma quantidade numérica obtida a partir do experimento.
- Ex: lançamento de dois dados. O interesse pode estar apenas na soma, não nos resultados individuais dos dados.

Variável Aleatória


- Em um experimento aleatório, muitas vezes não estamos interessados nos detalhes do resultado do evento, mas sim em alguma quantidade numérica obtida a partir do experimento.
- Ex: lançamento de dois dados. O interesse pode estar apenas na soma, não nos resultados individuais dos dados.
- Quantidades de interesse que são determinadas a partir do resultado de experimento aleatório são denominadas **variáveis aleatórias**.

Variável Aleatória

- Em um experimento aleatório, muitas vezes não estamos interessados nos detalhes do resultado do evento, mas sim em alguma quantidade numérica obtida a partir do experimento.
- Ex: lançamento de dois dados. O interesse pode estar apenas na soma, não nos resultados individuais dos dados.
- Quantidades de interesse que são determinadas a partir do resultado de experimento aleatório são denominadas **variáveis aleatórias**.
- Cada resultado possível de uma variável aleatória (v.a.) tem associado uma probabilidade. O conjunto de todos os resultados possíveis e as respectivas probabilidades é denominado **distribuição de probabilidade**.


Exemplo: Lançamento de dois dados

Estamos interessados na soma dos resultados.



Definição: Variável Aleatória Discreta

Uma **função** X que associa a cada elemento do espaço amostral um valor num conjunto enumerável de pontos da reta é denominada **variável aleatória discreta**.




Exemplo: Lançamento de uma moeda

$X = 1$ se cara e $X = 0$ se coroa



Exemplo: Lançamento de uma moeda duas vezes

X é a soma dos resultados (coroa é 0 e cara é 1).



Distribuição de Probabilidade

Distribuição de Probabilidade - v.a. discreta

- Quando a v.a. assume valores inteiros: v.a. **discreta**.

Distribuição de Probabilidade - v.a. discreta

- Quando a v.a. assume valores inteiros: v.a. **discreta**.
- A distribuição de probabilidade associa uma probabilidade $P(X = x)$ para cada valor possível, x , da variável aleatória X .

Distribuição de Probabilidade - v.a. discreta

- Quando a v.a. assume valores inteiros: v.a. **discreta**.
- A distribuição de probabilidade associa uma probabilidade $P(X = x)$ para cada valor possível, x , da variável aleatória X .
- Para cada valor de x , $0 \leq P(X = x) \leq 1$.

Distribuição de Probabilidade - v.a. discreta

- Quando a v.a. assume valores inteiros: v.a. **discreta**.
- A distribuição de probabilidade associa uma probabilidade $P(X = x)$ para cada valor possível, x , da variável aleatória X .
- Para cada valor de x , $0 \leq P(X = x) \leq 1$.
- Soma das probabilidades de todos os valores possíveis de X é igual a 1.

Distribuição de Probabilidade - v.a. discreta

- Seja X uma v.a. discreta com n valores possíveis denotados por x_1, x_2, \dots, x_n .

Distribuição de Probabilidade - v.a. discreta

- Seja X uma v.a. discreta com n valores possíveis denotados por x_1, x_2, \dots, x_n .
- $P(X = x_i)$ denota a probabilidade de que a v.a. X assumo o valor x_i .

Distribuição de Probabilidade - v.a. discreta

- Seja X uma v.a. discreta com n valores possíveis denotados por x_1, x_2, \dots, x_n .
- $P(X = x_i)$ denota a probabilidade de que a v.a. X assumo o valor x_i .
- O conjunto de todas essas probabilidades (para cada x_i) representa a **distribuição de probabilidade** de X .

Distribuição de Probabilidade - v.a. discreta

- Seja X uma v.a. discreta com n valores possíveis denotados por x_1, x_2, \dots, x_n .
- $P(X = x_i)$ denota a probabilidade de que a v.a. X assumo o valor x_i .
- O conjunto de todas essas probabilidades (para cada x_i) representa a **distribuição de probabilidade** de X .

X	x_1	x_2	x_3	\dots	x_n
$P(X = x)$	$P(X = x_1)$	$P(X = x_2)$	$P(X = x_3)$	\dots	$P(X = x_n)$

Distribuição de Probabilidade - v.a. discreta

- Seja X uma v.a. discreta com n valores possíveis denotados por x_1, x_2, \dots, x_n .
- $P(X = x_i)$ denota a probabilidade de que a v.a. X assumo o valor x_i .
- O conjunto de todas essas probabilidades (para cada x_i) representa a **distribuição de probabilidade** de X .

X	x_1	x_2	x_3	\dots	x_n
$P(X = x)$	$P(X = x_1)$	$P(X = x_2)$	$P(X = x_3)$	\dots	$P(X = x_n)$

- Como X só pode assumir valores entre x_1, x_2, \dots, x_n , temos que:

$$\sum_{i=1}^n P(X = x_i) = 1$$

Exemplo

Suponha que X seja uma v.a. discreta que assume os valores 1, 2 e 3.

Exemplo

Suponha que X seja uma v.a. discreta que assume os valores 1, 2 e 3.

Se $P(X = 1) = 0.4$ e $P(X = 2) = 0.1$, qual o valor de $P(X = 3)$?

Exemplo

Suponha que X seja uma v.a. discreta que assume os valores 1, 2 e 3.

Se $P(X = 1) = 0.4$ e $P(X = 2) = 0.1$, qual o valor de $P(X = 3)$?

$$\sum_{i=1}^n P(X = x_i) = 1$$

Exemplo

Suponha que X seja uma v.a. discreta que assume os valores 1, 2 e 3.

Se $P(X = 1) = 0.4$ e $P(X = 2) = 0.1$, qual o valor de $P(X = 3)$?

$$\sum_{i=1}^n P(X = x_i) = 1$$

$$P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = 1$$

Exemplo

Suponha que X seja uma v.a. discreta que assume os valores 1, 2 e 3.

Se $P(X = 1) = 0.4$ e $P(X = 2) = 0.1$, qual o valor de $P(X = 3)$?

$$\sum_{i=1}^n P(X = x_i) = 1$$

$$P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = 1$$

$$0.4 + 0.1 + P(X = 3) = 1$$

Exemplo

Suponha que X seja uma v.a. discreta que assume os valores 1, 2 e 3.

Se $P(X = 1) = 0.4$ e $P(X = 2) = 0.1$, qual o valor de $P(X = 3)$?

$$\sum_{i=1}^n P(X = x_i) = 1$$


$$P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = 1$$

$$0.4 + 0.1 + P(X = 3) = 1$$

$$P(X = 3) = 0.5$$

Distribuição de Probabilidade

Podemos representar a distribuição de probabilidade com o seguinte gráfico:



A altura de cada barra representa a probabilidade daquele valor.

Exemplo: Vendedor



Um vendedor de enciclopédias visita cada casa duas vezes.

Com anos de experiência, ele acredita que a probabilidade de uma venda logo na primeira visita é 0.3.

Já na segunda visita, ele acredita que a probabilidade de venda seja 0.6. Ele acredita também que o resultado em cada visita seja independente.

Qual é a distribuição de probabilidade da v.a. X : número de vendas feitas em uma casa?

Exemplo: Vendedor

Seja V_1 : venda na primeira visita e V_2 : venda na segunda visita.

- Espaço amostral do fenômeno aleatório:

Exemplo: Vendedor

Seja V_1 : venda na primeira visita e V_2 : venda na segunda visita.

- Espaço amostral do fenômeno aleatório:

$$\Omega = \{(V_1^c \cap V_2^c), (V_1 \cap V_2^c), (V_1^c \cap V_2), (V_1 \cap V_2)\}$$

Exemplo: Vendedor

Seja V_1 : venda na primeira visita e V_2 : venda na segunda visita.

- Espaço amostral do fenômeno aleatório:

$$\Omega = \{(V_1^c \cap V_2^c), (V_1 \cap V_2^c), (V_1^c \cap V_2), (V_1 \cap V_2)\}$$

- A v.a. X pode assumir os valores 0, 1 ou 2.

Exemplo: Vendedor

Seja V_1 : venda na primeira visita e V_2 : venda na segunda visita.

- Espaço amostral do fenômeno aleatório:

$$\Omega = \{(V_1^c \cap V_2^c), (V_1 \cap V_2^c), (V_1^c \cap V_2), (V_1 \cap V_2)\}$$

- A v.a. X pode assumir os valores 0, 1 ou 2.
- Se nenhuma venda ocorrer nas duas visitas, $X = 0$.

Exemplo: Vendedor

Seja V_1 : venda na primeira visita e V_2 : venda na segunda visita.

- Espaço amostral do fenômeno aleatório:

$$\Omega = \{(V_1^c \cap V_2^c), (V_1 \cap V_2^c), (V_1^c \cap V_2), (V_1 \cap V_2)\}$$

- A v.a. X pode assumir os valores 0, 1 ou 2.
- Se nenhuma venda ocorrer nas duas visitas, $X = 0$.

$$\begin{aligned} P(X = 0) &= P(V_1^c \cap V_2^c) \\ &\stackrel{ind}{=} P(V_1^c)P(V_2^c) \\ &= [1 - P(V_1)][1 - P(V_2)] \\ &= (1 - 0.3)(1 - 0.6) = 0.28 \end{aligned}$$

Exemplo: Vendedor

- $X = 1$ quando ocorre uma venda apenas na primeira visita **ou** uma venda apenas na segunda visita.

Exemplo: Vendedor

- $X = 1$ quando ocorre uma venda apenas na primeira visita **ou** uma venda apenas na segunda visita.

$$\begin{aligned}P(X = 1) &= P[(V_1 \cap V_2^c) \cup (V_1^c \cap V_2)] \\&= P(V_1 \cap V_2^c) + P(V_1^c \cap V_2) \\&\stackrel{ind}{=} P(V_1)P(V_2^c) + P(V_1^c)P(V_2) \\&= (0.3)(1 - 0.6) + (1 - 0.3)(0.6) \\&= 0.54\end{aligned}$$

Exemplo: Vendedor

- $X = 2$ quando ocorre uma venda nas duas visitas.

Exemplo: Vendedor

- $X = 2$ quando ocorre uma venda nas duas visitas.

$$\begin{aligned} P(X = 2) &= P(V_1 \cap V_2) \\ &\stackrel{ind}{=} P(V_1)P(V_2) = (0.3)(0.6) = 0.18 \end{aligned}$$

Exemplo: Vendedor

- $X = 2$ quando ocorre uma venda nas duas visitas.

$$\begin{aligned} P(X = 2) &= P(V_1 \cap V_2) \\ &\stackrel{ind}{=} P(V_1)P(V_2) = (0.3)(0.6) = 0.18 \end{aligned}$$

Satisfaz a propriedade:

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^2 P(X = i) &= P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) \\ &= 0.28 + 0.54 + 0.18 = 1 \end{aligned}$$

X	0	1	2
$P(X = x)$	0.28	0.54	0.18

Exemplo: Comissão

O Departamento de Estatística é formado por 35 professores, sendo 21 homens e 14 mulheres.

Uma comissão de 3 professores será constituída sorteando, ao acaso, três membros do departamento.

Qual é a probabilidade da comissão ser formada por pelo menos duas mulheres?

Exemplo: Comissão

O Departamento de Estatística é formado por 35 professores, sendo 21 homens e 14 mulheres.

Uma comissão de 3 professores será constituída sorteando, ao acaso, três membros do departamento.

Qual é a probabilidade da comissão ser formada por pelo menos duas mulheres?

Seja X o número de mulheres na comissão.

Exemplo: Comissão

O Departamento de Estatística é formado por 35 professores, sendo 21 homens e 14 mulheres.

Uma comissão de 3 professores será constituída sorteando, ao acaso, três membros do departamento.

Qual é a probabilidade da comissão ser formada por pelo menos duas mulheres?

Seja X o número de mulheres na comissão.

X pode assumir os valores: 0, 1, 2 e 3.

Como X = número de mulheres na comissão, então $X = 0, 1, 2, 3$.

Como X = número de mulheres na comissão, então $X = 0, 1, 2, 3$.

$$P(X = 0) = \frac{\binom{21}{3}\binom{14}{0}}{\binom{35}{3}} = 0.203$$

Como X = número de mulheres na comissão, então $X = 0, 1, 2, 3$.

$$P(X = 0) = \frac{\binom{21}{3}\binom{14}{0}}{\binom{35}{3}} = 0.203$$

$$P(X = 1) = \frac{\binom{21}{2}\binom{14}{1}}{\binom{35}{3}} = 0.450$$

Como X = número de mulheres na comissão, então $X = 0, 1, 2, 3$.

$$P(X = 0) = \frac{\binom{21}{3}\binom{14}{0}}{\binom{35}{3}} = 0.203$$

$$P(X = 1) = \frac{\binom{21}{2}\binom{14}{1}}{\binom{35}{3}} = 0.450$$

$$P(X = 2) = \frac{\binom{21}{1}\binom{14}{2}}{\binom{35}{3}} = 0.291$$

Como X = número de mulheres na comissão, então $X = 0, 1, 2, 3$.

$$P(X = 0) = \frac{\binom{21}{3}\binom{14}{0}}{\binom{35}{3}} = 0.203$$

$$P(X = 1) = \frac{\binom{21}{2}\binom{14}{1}}{\binom{35}{3}} = 0.450$$

$$P(X = 2) = \frac{\binom{21}{1}\binom{14}{2}}{\binom{35}{3}} = 0.291$$

$$P(X = 3) = \frac{\binom{21}{0}\binom{14}{3}}{\binom{35}{3}} = 0.056$$

Como X = número de mulheres na comissão, então $X = 0, 1, 2, 3$.

$$P(X = 0) = \frac{\binom{21}{3}\binom{14}{0}}{\binom{35}{3}} = 0.203$$

$$P(X = 1) = \frac{\binom{21}{2}\binom{14}{1}}{\binom{35}{3}} = 0.450$$

$$P(X = 2) = \frac{\binom{21}{1}\binom{14}{2}}{\binom{35}{3}} = 0.291$$

$$P(X = 3) = \frac{\binom{21}{0}\binom{14}{3}}{\binom{35}{3}} = 0.056$$

Veja que $\sum_{i=0}^3 P(X = i) = 1$.

Como X = número de mulheres na comissão, então $X = 0, 1, 2, 3$.

$$P(X = 0) = \frac{\binom{21}{3}\binom{14}{0}}{\binom{35}{3}} = 0.203$$

$$P(X = 1) = \frac{\binom{21}{2}\binom{14}{1}}{\binom{35}{3}} = 0.450$$

$$P(X = 2) = \frac{\binom{21}{1}\binom{14}{2}}{\binom{35}{3}} = 0.291$$

$$P(X = 3) = \frac{\binom{21}{0}\binom{14}{3}}{\binom{35}{3}} = 0.056$$

Veja que $\sum_{i=0}^3 P(X = i) = 1$.


Probabilidade da comissão ter pelo menos duas mulheres:

$$P(X \geq 2) = P(X = 2) + P(X = 3) = 0.347$$

Exemplo: Comissão

A distribuição de probabilidade de X é dada por:

X	0	1	2	3
$P(X = x)$	0.203	0.450	0.291	0.056




Exemplo: Comissão

Outra maneira para calcular as probabilidades:

Espaço amostral	Probabilidade	X
(HHH)	$\frac{21}{35} \times \frac{20}{34} \times \frac{19}{33} = 0,203$	0
(HHM)	$\frac{21}{35} \times \frac{20}{34} \times \frac{14}{33} = 0,150$	1
(HMH)	$\frac{21}{35} \times \frac{14}{34} \times \frac{20}{33} = 0,150$	1
(MHH)	$\frac{14}{35} \times \frac{21}{34} \times \frac{20}{33} = 0,150$	1
(HMM)	$\frac{21}{35} \times \frac{14}{34} \times \frac{13}{33} = 0,097$	2
(MHM)	$\frac{14}{35} \times \frac{21}{34} \times \frac{13}{33} = 0,097$	2
(MMH)	$\frac{14}{35} \times \frac{13}{34} \times \frac{21}{33} = 0,097$	2
(MMM)	$\frac{14}{35} \times \frac{13}{34} \times \frac{12}{33} = 0,056$	3

Exemplo: Lançamento de dois dados


Qual a probabilidade da soma ser menor do que 6?



X : soma dos dados.

Exemplo: Lançamento de dois dados

Qual a probabilidade da soma ser menor do que 6?



X : soma dos dados.

$$P(X < 6) = P(X = 5) + P(X = 4) + P(X = 3) + P(X = 2) = \frac{10}{36}$$

Exemplo: Lançamento de dois dados

Y : máximo resultado no lançamento de 2 dados.

(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)
(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)
(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)
(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)

Y	1	2	3	4	5	6
$P(Y = y)$	1/36	3/36	5/36	7/36	9/36	11/36

Exemplo: Lançamento de dois dados

Z : diferença entre os pontos do segundo e do primeiro lançamento.

(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)
(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)
(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)
(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)

Z	-5	-4	-3	-1	-1	0	1	2	3	4	5
$P(Z = z)$	1/36	2/36	3/36	4/36	5/36	6/36	5/36	4/36	3/36	2/36	1/36

Exemplo: Construção

Na construção de um certo prédio, as fundações devem atingir 15 metros de profundidade, e para cada 5 metros de estacas colocadas, o operador anota se houve alteração no ritmo de perfuração previamente estabelecido.

Essa alteração é resultado de mudanças para mais ou para menos na resistência do subsolo.

Nos dois casos, medidas corretivas serão necessárias, encarecendo o custo da obra.

Exemplo: Construção

Na construção de um certo prédio, as fundações devem atingir 15 metros de profundidade, e para cada 5 metros de estacas colocadas, o operador anota se houve alteração no ritmo de perfuração previamente estabelecido.

Essa alteração é resultado de mudanças para mais ou para menos na resistência do subsolo.

Nos dois casos, medidas corretivas serão necessárias, encarecendo o custo da obra.

- com base em avaliações geológicas, admite-se que a probabilidade de ocorrência de alterações é de 0.1 para cada 5 metros.
- o custo básico inicial é de 100 UPCs (Unidades Padrão de Construção) e será acrescido de $50k$, com k representando o número de alterações observadas.

Exemplo: Construção

Como se comporta a variável Custo de Obra de fundações?

Exemplo: Construção

Como se comporta a variável Custo de Obra de fundações?

Assumimos que as alterações ocorrem independentemente entre cada um dos três intervalos de 5 metros.

Exemplo: Construção

Como se comporta a variável Custo de Obra de fundações?

Assumimos que as alterações ocorrem independentemente entre cada um dos três intervalos de 5 metros.

A = ocorrência de alterações em cada intervalo.

Exemplo: Construção

Como se comporta a variável Custo de Obra de fundações?

Assumimos que as alterações ocorrem independentemente entre cada um dos três intervalos de 5 metros.

A = ocorrência de alterações em cada intervalo.

3 etapas $\Rightarrow 2 \times 2 \times 2 = 2^3 = 8$ possibilidades.

Espaço Amostral:

Exemplo: Construção

Como se comporta a variável Custo de Obra de fundações?

Assumimos que as alterações ocorrem independentemente entre cada um dos três intervalos de 5 metros.

A = ocorrência de alterações em cada intervalo.

3 etapas $\Rightarrow 2 \times 2 \times 2 = 2^3 = 8$ possibilidades.

Espaço Amostral:

$$\Omega = \{AAA, AA^cA, A^cAA, AA^cA^c, A^cAA^c, A^cA^cA, A^cA^cA^c\}$$

Evento	Probabilidade	Custo
AAA	$(0.1)^3 = 0.001$	250
$AAAc$	$(0.1)^2(0.9) = 0.009$	200
AA^cA	$(0.1)^2(0.9) = 0.009$	200
A^cAA	$(0.1)^2(0.9) = 0.009$	200
AA^cA^c	$(0.1)(0.9)^2 = 0.081$	150
A^cAA^c	$(0.1)(0.9)^2 = 0.081$	150
A^cA^cA	$(0.1)(0.9)^2 = 0.081$	150
$A^cA^cA^c$	$(0.9)^3 = 0.729$	100

Note que associamos a cada evento do espaço amostral um valor da variável C (custo), e eventos diferentes podem corresponder ao mesmo valor de C :

$$c_1 = 100, \quad c_2 = 150, \quad c_3 = 200, \quad c_4 = 250$$

- $P(C = c_1) = P(A^c A^c A^c) = 0.729$
- $P(C = c_2) = P(AA^c A^c \cup A^c AA^c \cup A^c A^c A) = 3 \times 0.081 = 0.243$
- $P(C = c_3) = P(AAA^c \cup AA^c A \cup A^c AA) = 3 \times 0.009 = 0.027$
- $P(C = c_4) = P(AAA) = 0.001$

O comportamento de C estudado através da probabilidade de ocorrência pode auxiliar na previsão de gastos e na elaboração de orçamentos:

C	100	150	200	250
$P(C = c)$	0.729	0.243	0.027	0.001

Exemplo: Lançamento de uma moeda duas vezes

$\Omega = \{CC, CX, XC, XX\}$, em que C = cara e X = coroa.

Seja a v.a. N = número de caras em dois lançamentos.

N	0	1	2
$P(N = n)$	$P(XX) = \frac{1}{4}$	$P(CX \cup XC) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$	$P(CC) = \frac{1}{4}$

Função de Distribuição Acumulada

Exemplo: Vacina

Um grupo de 1000 crianças foi analisado para determinar a efetividade de uma vacina contra um tipo de alergia. As crianças recebiam uma dose de vacina e após um mês passavam por um novo teste. Caso ainda tivessem tido alguma reação alérgica, recebiam outra dose.

Exemplo: Vacina

Um grupo de 1000 crianças foi analisado para determinar a efetividade de uma vacina contra um tipo de alergia. As crianças recebiam uma dose de vacina e após um mês passavam por um novo teste. Caso ainda tivessem tido alguma reação alérgica, recebiam outra dose.

Variável de interesse: X = número de doses.

Exemplo: Vacina

Um grupo de 1000 crianças foi analisado para determinar a efetividade de uma vacina contra um tipo de alergia. As crianças recebiam uma dose de vacina e após um mês passavam por um novo teste. Caso ainda tivessem tido alguma reação alérgica, recebiam outra dose.

Variável de interesse: X = número de doses.

Doses (X)	1	2	3	4	5
Frequência	245	288	256	145	66

Exemplo: Vacina

Um grupo de 1000 crianças foi analisado para determinar a efetividade de uma vacina contra um tipo de alergia. As crianças recebiam uma dose de vacina e após um mês passavam por um novo teste. Caso ainda tivessem tido alguma reação alérgica, recebiam outra dose.

Variável de interesse: X = número de doses.

Doses (X)	1	2	3	4	5
Frequência	245	288	256	145	66

Uma criança é sorteada ao acaso, qual será a probabilidade dela ter recebido 2 doses?

$$P(X = 2) = \frac{288}{1000} = 0.288$$

Exemplo: Vacina

Distribuição de Probabilidade de X

Doses (X)	1	2	3	4	5
$P(X = x)$	0.245	0.288	0.256	0.145	0.066

Qual a probabilidade da criança ter recebido até duas doses?

Exemplo: Vacina

Distribuição de Probabilidade de X

Doses (X)	1	2	3	4	5
$P(X = x)$	0.245	0.288	0.256	0.145	0.066

Qual a probabilidade da criança ter recebido até duas doses?

$$\begin{aligned}P(X \leq 2) &= P(X = 1) + P(X = 2) \\&= 0.245 + 0.288 \\&= 0.533\end{aligned}$$

Função de Distribuição Acumulada

A função de distribuição acumulada (f.d.a.) de uma variável aleatória X é definida por

$$F(x) = P(X \leq x), \quad x \in \mathbb{R}$$

Função de Distribuição Acumulada

A função de distribuição acumulada (f.d.a.) de uma variável aleatória X é definida por

$$F(x) = P(X \leq x), \quad x \in \mathbb{R}$$

Assim, se X assume os valores em $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, em que $x_1 < x_2 < \dots < x_n$:

Função de Distribuição Acumulada

A função de distribuição acumulada (f.d.a.) de uma variável aleatória X é definida por

$$F(x) = P(X \leq x), \quad x \in \mathbb{R}$$

Assim, se X assume os valores em $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, em que $x_1 < x_2 < \dots < x_n$:

$$F(x_1) = P(X = x_1)$$

$$F(x_2) = P(X = x_1) + P(X = x_2)$$

$$\vdots$$

$$F(x_n) = P(X = x_1) + \dots + P(X = x_n)$$

Exemplo: Vacina

Doses (X)	1	2	3	4	5
$P(X = x)$	0.245	0.288	0.256	0.145	0.066

Note que a f.d.a. de $X = \text{número de doses}$ é definida para qualquer valor real, logo:

Exemplo: Vacina


Doses (X)	1	2	3	4	5
$P(X = x)$	0.245	0.288	0.256	0.145	0.066

Note que a f.d.a. de $X = \text{número de doses}$ é definida para qualquer valor real, logo:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ 0.245 & 1 \leq x < 2 \\ 0.533 & 2 \leq x < 3 \\ 0.789 & 3 \leq x < 4 \\ 0.934 & 4 \leq x < 5 \\ 1 & x \geq 5 \end{cases}$$

Exemplo: Vacina

Função de distribuição acumulada (f.d.a.) do número de doses (X)



Exemplo: Comissão

O Departamento de Estatística é formado por 35 professores, sendo 21 homens e 14 mulheres. Uma comissão de 3 professores será constituída sorteando, ao acaso, três membros do departamento.

Exemplo: Comissão

O Departamento de Estatística é formado por 35 professores, sendo 21 homens e 14 mulheres. Uma comissão de 3 professores será constituída sorteando, ao acaso, três membros do departamento.

Seja X o número de mulheres na comissão. X pode ser 0, 1, 2 e 3.

Exemplo: Comissão


O Departamento de Estatística é formado por 35 professores, sendo 21 homens e 14 mulheres. Uma comissão de 3 professores será constituída sorteando, ao acaso, três membros do departamento.

Seja X o número de mulheres na comissão. X pode ser 0, 1, 2 e 3.

X	0	1	2	3
$P(X = x)$	0.203	0.450	0.291	0.056

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 0 \\ 0.203 & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ 0.653 & \text{se } 1 \leq x < 2 \\ 0.944 & \text{se } 2 \leq x < 3 \\ 1 & \text{se } x \geq 3 \end{cases}$$

Exemplo: Comissão



Esperança

Esperança: variável aleatória discreta

Seja X uma v.a. discreta assumindo os valores x_1, \dots, x_n .

A **esperança** (ou valor esperado) da variável X é dada por:

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^n x_i P(X = x_i)$$

Esperança: variável aleatória discreta

Seja X uma v.a. discreta assumindo os valores x_1, \dots, x_n .

A **esperança** (ou valor esperado) da variável X é dada por:

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^n x_i P(X = x_i)$$

A esperança de X é a média ponderada de todos os valores possíveis de X , onde o peso de cada valor é a probabilidade.

Esperança - Exemplos

Suponha que X assumira os valores 0 ou 1 com igual probabilidade, ou seja,

$$P(X = 0) = P(X = 1) = \frac{1}{2}$$

Esperança - Exemplos

Suponha que X assumira os valores 0 ou 1 com igual probabilidade, ou seja,

$$P(X = 0) = P(X = 1) = \frac{1}{2}$$

$$\mathbb{E}(X) = 0 \times P(X = 0) + 1 \times P(X = 1) = \frac{1}{2}$$

Esperança - Exemplos

Suponha que X assumira os valores 0 ou 1 com igual probabilidade, ou seja,

$$P(X = 0) = P(X = 1) = \frac{1}{2}$$

$$\mathbb{E}(X) = 0 \times P(X = 0) + 1 \times P(X = 1) = \frac{1}{2}$$

Suponha que X assumira os valores 0 ou 1 com as seguintes probabilidades,

$$P(X = 0) = \frac{2}{3} \quad \text{e} \quad P(X = 1) = \frac{1}{3}$$

Esperança - Exemplos

Suponha que X assumira os valores 0 ou 1 com igual probabilidade, ou seja,

$$P(X = 0) = P(X = 1) = \frac{1}{2}$$

$$\mathbb{E}(X) = 0 \times P(X = 0) + 1 \times P(X = 1) = \frac{1}{2}$$

Suponha que X assumira os valores 0 ou 1 com as seguintes probabilidades,

$$P(X = 0) = \frac{2}{3} \quad \text{e} \quad P(X = 1) = \frac{1}{3}$$

$$\mathbb{E}(X) = 0 \times P(X = 0) + 1 \times P(X = 1) = 0 \times \frac{2}{3} + 1 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

Esperança - Exemplos

Suponha que X assumira os valores 0 ou 1 com igual probabilidade, ou seja,

$$P(X = 0) = P(X = 1) = \frac{1}{2}$$

$$\mathbb{E}(X) = 0 \times P(X = 0) + 1 \times P(X = 1) = \frac{1}{2}$$

Suponha que X assumira os valores 0 ou 1 com as seguintes probabilidades,

$$P(X = 0) = \frac{2}{3} \quad \text{e} \quad P(X = 1) = \frac{1}{3}$$

$$\mathbb{E}(X) = 0 \times P(X = 0) + 1 \times P(X = 1) = 0 \times \frac{2}{3} + 1 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

Veja que nesses dois exemplos: $\mathbb{E}(X) = P(X = 1)$

Exemplo: Lançamento de um dado

X é a v.a. representando o resultado do lançamento.

$$P(X = i) = \frac{1}{6}, \quad i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

Exemplo: Lançamento de um dado

X é a v.a. representando o resultado do lançamento.

$$P(X = i) = \frac{1}{6}, \quad i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

$$\mathbb{E}(X) = 1 \times \frac{1}{6} + 2 \times \frac{1}{6} + 3 \times \frac{1}{6} + 4 \times \frac{1}{6} + 5 \times \frac{1}{6} + 6 \times \frac{1}{6} = 3.5$$

Exemplo: Lançamento de um dado

X é a v.a. representando o resultado do lançamento.

$$P(X = i) = \frac{1}{6}, \quad i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

$$\mathbb{E}(X) = 1 \times \frac{1}{6} + 2 \times \frac{1}{6} + 3 \times \frac{1}{6} + 4 \times \frac{1}{6} + 5 \times \frac{1}{6} + 6 \times \frac{1}{6} = 3.5$$

Neste caso, a esperança de X não é igual a nenhum dos valores possíveis de X .

Não podemos interpretar $\mathbb{E}(X)$ como o valor que esperamos que X irá assumir, mas sim como uma média dos valores observados de X ao longo de muitas repetições do experimento aleatório.

Se jogarmos o dado muitas vezes e calcularmos uma média de todos os resultados obtidos, essa média será aproximadamente 3.5.

Exemplo: Seguros

Uma companhia de seguros determina o prêmio anual do seguro de vida de maneira a obter um lucro esperado de 1% do valor que o segurado recebe em caso de morte.

Encontre o valor do prêmio anual para um seguro de vida no valor de 200 mil reais assumindo que a probabilidade do cliente morrer naquele ano é 0.02.

Exemplo: Seguros

Uma companhia de seguros determina o prêmio anual do seguro de vida de maneira a obter um lucro esperado de 1% do valor que o segurado recebe em caso de morte.

Encontre o valor do prêmio anual para um seguro de vida no valor de 200 mil reais assumindo que a probabilidade do cliente morrer naquele ano é 0.02.

A : prêmio anual

X : lucro da companhia no ano para o cliente

Exemplo: Seguros

Uma companhia de seguros determina o prêmio anual do seguro de vida de maneira a obter um lucro esperado de 1% do valor que o segurado recebe em caso de morte.

Encontre o valor do prêmio anual para um seguro de vida no valor de 200 mil reais assumindo que a probabilidade do cliente morrer naquele ano é 0.02.

A : prêmio anual

X : lucro da companhia no ano para o cliente

Então,

$$X = \begin{cases} A, & \text{se o cliente sobrevive} \\ A - 200000, & \text{se o cliente morre} \end{cases}$$

Exemplo: Seguros

$$\mathbb{E}(X) = A \times P(\text{sobreviver}) + (A - 200000) \times P(\text{morrer})$$

Exemplo: Seguros

$$\mathbb{E}(X) = A \times P(\text{sobreviver}) + (A - 200000) \times P(\text{morrer})$$

$$\mathbb{E}(X) = A \times 0.98 + (A - 200000) \times 0.02$$

Exemplo: Seguros

$$\mathbb{E}(X) = A \times P(\text{sobreviver}) + (A - 200000) \times P(\text{morrer})$$

$$\mathbb{E}(X) = A \times 0.98 + (A - 200000) \times 0.02$$

$$\mathbb{E}(X) = A - 4000$$

Exemplo: Seguros

$$\mathbb{E}(X) = A \times P(\text{sobreviver}) + (A - 200000) \times P(\text{morrer})$$

$$\mathbb{E}(X) = A \times 0.98 + (A - 200000) \times 0.02$$

$$\mathbb{E}(X) = A - 4000$$

Companhia quer lucro esperado de 1% do valor recebido em caso de morte: 2000 reais.

Exemplo: Seguros

$$\mathbb{E}(X) = A \times P(\text{sobreviver}) + (A - 200000) \times P(\text{morrer})$$

$$\mathbb{E}(X) = A \times 0.98 + (A - 200000) \times 0.02$$

$$\mathbb{E}(X) = A - 4000$$

Companhia quer lucro esperado de 1% do valor recebido em caso de morte: 2000 reais.

$$\mathbb{E}(X) = 2000 = A - 4000$$

Exemplo: Seguros

$$\mathbb{E}(X) = A \times P(\text{sobreviver}) + (A - 200000) \times P(\text{morrer})$$

$$\mathbb{E}(X) = A \times 0.98 + (A - 200000) \times 0.02$$

$$\mathbb{E}(X) = A - 4000$$

Companhia quer lucro esperado de 1% do valor recebido em caso de morte: 2000 reais.

$$\mathbb{E}(X) = 2000 = A - 4000$$

Portanto, $A = 6000$ é o valor do prêmio anual.

Exemplo: Montagem

Um empresário pretende estabelecer uma firma para montagem de um componente mecânico. Cada peça é composta de duas partes, A e B , cada uma com uma chance específica de ser defeituosa. Só é possível verificar a qualidade das peças depois que elas são montadas.

Se ambas são defeituosas, a peça é descartada e dá um prejuízo de \$5.

Se a peça B é defeituosa, ainda é possível reparar a peça e obter um lucro de \$5.

De maneira semelhante, se A é defeituosa, o reparo permite vender a peça inteira com um lucro de \$10.

Se as duas peças são boas, o lucro é de \$15.

Exemplo: Montagem

Seja A o evento indicando que a peça A está perfeita.

Então A^c indica que a peça A está com defeito.

Exemplo: Montagem

Seja A o evento indicando que a peça A está perfeita.

Então A^c indica que a peça A está com defeito.

Seja B o evento indicando que a peça B está perfeita.

Então B^c indica que a peça B está com defeito.

Exemplo: Montagem

Seja A o evento indicando que a peça A está perfeita.

Então A^c indica que a peça A está com defeito.

Seja B o evento indicando que a peça B está perfeita.

Então B^c indica que a peça B está com defeito.

Cada uma das configurações está associada a uma probabilidade:

$$P(A \cap B) = 0.56 \quad P(A^c \cap B) = 0.23$$

$$P(A \cap B^c) = 0.02 \quad P(A^c \cap B^c) = 0.19$$

Exemplo: Montagem

Seja A o evento indicando que a peça A está perfeita.

Então A^c indica que a peça A está com defeito.

Seja B o evento indicando que a peça B está perfeita.

Então B^c indica que a peça B está com defeito.

Cada uma das configurações está associada a uma probabilidade:

$$P(A \cap B) = 0.56 \quad P(A^c \cap B) = 0.23$$

$$P(A \cap B^c) = 0.02 \quad P(A^c \cap B^c) = 0.19$$

Como podemos descrever a distribuição do lucro por componente?

Exemplo: Montagem

Seja A o evento indicando que a peça A está perfeita.

Então A^c indica que a peça A está com defeito.

Seja B o evento indicando que a peça B está perfeita.

Então B^c indica que a peça B está com defeito.

Cada uma das configurações está associada a uma probabilidade:

$$P(A \cap B) = 0.56 \quad P(A^c \cap B) = 0.23$$

$$P(A \cap B^c) = 0.02 \quad P(A^c \cap B^c) = 0.19$$

Como podemos descrever a distribuição do lucro por componente?

Qual o lucro esperado por peça produzida?

Exemplo: Montagem

$$P(A \cap B) = 0.56, P(A^c \cap B) = 0.23, P(A \cap B^c) = 0.02 \text{ e } P(A^c \cap B^c) = 0.19$$


Seja X a variável indicando o lucro na produção de um componente.

- X assume o valor 15 se as peças A e B estão ok, o que ocorre com probabilidade 0.56.
- X assume o valor 10 se apenas A apresentar defeito, o que ocorre com probabilidade 0.23.
- X assume o valor 5 se apenas B apresentar defeito, o que ocorre com probabilidade 0.02.
- X assume o valor -5 se tanto A quanto B apresentarem defeito, o que ocorre com probabilidade 0.19.

Exemplo: Montagem

Distribuição de probabilidade para a variável aleatória X :

X	-5	5	10	15
$P(X = x)$	0.19	0.02	0.23	0.56




Exemplo: Montagem

X	-5	5	10	15
$P(X = x)$	0.19	0.02	0.23	0.56

Função de Distribuição Acumulada:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < -5 \\ 0.19 & \text{se } -5 \leq x < 5 \\ 0.21 & \text{se } 5 \leq x < 10 \\ 0.44 & \text{se } 10 \leq x < 15 \\ 1 & \text{se } x \geq 15 \end{cases}$$

Exemplo: Montagem



Exemplo: Montagem

Suponha que o empresário faça a seguinte pergunta: *Qual o lucro médio por conjunto montado que espero conseguir?*

X	-5	5	10	15
$P(X = x)$	0.19	0.02	0.23	0.56

Exemplo: Montagem

Suponha que o empresário faça a seguinte pergunta: *Qual o lucro médio por conjunto montado que espero conseguir?*

X	-5	5	10	15
$P(X = x)$	0.19	0.02	0.23	0.56

Lembrem-se que a esperança de uma v.a. X com valores x_1, x_2, \dots, x_n é:

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^n x_i P(X = x_i)$$

Exemplo: Montagem

Suponha que o empresário faça a seguinte pergunta: *Qual o lucro médio por conjunto montado que espero conseguir?*

X	-5	5	10	15
$P(X = x)$	0.19	0.02	0.23	0.56

Lembrem-se que a esperança de uma v.a. X com valores x_1, x_2, \dots, x_n é:

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^n x_i P(X = x_i)$$

Para saber o lucro esperado, basta aplicar a fórmula:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= -5 \times 0.19 + 5 \times 0.02 + 10 \times 0.23 + 15 \times 0.56 \\ &= 9.85\end{aligned}$$

Exemplo: Pedágio

Você, cansado de esperar em filas de pedágio com frequência, está considerando assinar o serviço de pagamento eletrônico. Dentre as opções oferecidas, você se interessa pelas duas abaixo:

PLANOS DISPONÍVEIS		
Nunca foi tão fácil ter o Sem Par. Aproveite e diga adeus às filas na		
		
 COBERTURA	Nacional: Pedágios, Shoppings e Estacionamento	Nacional: Pedágios, Shoppings e Estacionamento
 ADEÇÃO	R\$ 73,16	ZERO
 MENSALIDADE	R\$ 13,05	R\$ 17,28
 SUBSTITUIÇÃO	R\$ 43,83	ZERO
 FIDELIDADE	ZERO	ZERO
	CLIQUE AQUI e adquira	CLIQUE AQUI e adquira

ATENDIMENTO
ON LINE
SEM PARAR

samara 04/02/2014 11:33 disse:
gostaria de saber se no plano classico, tenho que refazer a adesao apos certo periodo

Thamires 04/02/2014 11:34 disse:
Esclarecemos que a renovação automática do serviço ocorre quando o nosso relacionamento completa 05 anos, de acordo com o aceite entre as partes do Item 3.5 do termo de adesão, neste momento está suspensa cobrança para essa renovação

Plano Clássico: obrigatório fazer adesão novamente após 5 anos.



Plano Clássico: obrigatório fazer adesão novamente após 5 anos.

Plano Clássico: em caso de perda/roubo/troca é preciso pagar a taxa de substituição.



Plano Clássico: obrigatório fazer adesão novamente após 5 anos.

Plano Clássico: em caso de perda/roubo/troca é preciso pagar a taxa de substituição.

Assumindo que não há roubo/perda, mas apenas troca do veículo e que não há o desconto na adesão para renovar após 5 anos, como decidir?



Plano Clássico: obrigatório fazer adesão novamente após 5 anos.

Plano Clássico: em caso de perda/roubo/troca é preciso pagar a taxa de substituição.

Assumindo que não há roubo/perda, mas apenas troca do veículo e que não há o desconto na adesão para renovar após 5 anos, como decidir?

Podemos fazer um exemplo de acordo com o período em que vamos assinar o plano escolhido.

Exemplo: Pedágio


Seja a v.a. T : idade do veículo até a troca.

E a função de distribuição acumulada dada por:

$$F(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } t < 2 \\ 0.1 & \text{se } 2 \leq t < 3 \\ 0.2 & \text{se } 3 \leq t < 4 \\ 0.5 & \text{se } 4 \leq t < 5 \\ 0.7 & \text{se } 5 \leq t < 6 \\ 0.9 & \text{se } 6 \leq t < 7 \\ 1 & \text{se } t \geq 7 \end{cases}$$

Exemplo: Pedágio

T : idade do veículo até a troca.



Assumindo que você queira assinar por um período de 3 anos. Vamos definir:

Assumindo que você queira assinar por um período de 3 anos. Vamos definir:

C_1 : custo do plano 1 por 3 anos.

Assumindo que você queira assinar por um período de 3 anos. Vamos definir:

C_1 : custo do plano 1 por 3 anos.

Probabilidade de trocar de carro em até 3 anos: 0.2

Assumindo que você queira assinar por um período de 3 anos. Vamos definir:

C_1 : custo do plano 1 por 3 anos.

Probabilidade de trocar de carro em até 3 anos: 0.2

Portanto, C_1 assume os valores:

$$C_1 = \begin{cases} 73.16 + 13.05 \times 12 \times 3 = 542.96, & \text{com probabilidade 0.8} \\ 73.16 + 13.05 \times 12 \times 3 + 43.83 = 586.79, & \text{com probabilidade 0.2} \end{cases}$$

Assumindo que você queira assinar por um período de 3 anos. Vamos definir:

C_1 : custo do plano 1 por 3 anos.

Probabilidade de trocar de carro em até 3 anos: 0.2

Portanto, C_1 assume os valores:

$$C_1 = \begin{cases} 73.16 + 13.05 \times 12 \times 3 = 542.96, & \text{com probabilidade 0.8} \\ 73.16 + 13.05 \times 12 \times 3 + 43.83 = 586.79, & \text{com probabilidade 0.2} \end{cases}$$

$$\mathbb{E}(C_1) = 542.96 \times 0.8 + 586.79 \times 0.2 = 551.73$$

Assumindo que você queira assinar por um período de 3 anos. Vamos definir:

C_1 : custo do plano 1 por 3 anos.

Probabilidade de trocar de carro em até 3 anos: 0.2

Portanto, C_1 assume os valores:

$$C_1 = \begin{cases} 73.16 + 13.05 \times 12 \times 3 = 542.96, & \text{com probabilidade } 0.8 \\ 73.16 + 13.05 \times 12 \times 3 + 43.83 = 586.79, & \text{com probabilidade } 0.2 \end{cases}$$

$$\mathbb{E}(C_1) = 542.96 \times 0.8 + 586.79 \times 0.2 = 551.73$$

C_2 : custo do plano 2 por 3 anos.

Assumindo que você queira assinar por um período de 3 anos. Vamos definir:

C_1 : custo do plano 1 por 3 anos.

Probabilidade de trocar de carro em até 3 anos: 0.2

Portanto, C_1 assume os valores:

$$C_1 = \begin{cases} 73.16 + 13.05 \times 12 \times 3 = 542.96, & \text{com probabilidade 0.8} \\ 73.16 + 13.05 \times 12 \times 3 + 43.83 = 586.79, & \text{com probabilidade 0.2} \end{cases}$$

$$\mathbb{E}(C_1) = 542.96 \times 0.8 + 586.79 \times 0.2 = 551.73$$

C_2 : custo do plano 2 por 3 anos.

C_2 assume o valor $17.28 \times 12 \times 3 = 622.08$, com probabilidade 1

Assumindo que você queira assinar por um período de 3 anos. Vamos definir:

C_1 : custo do plano 1 por 3 anos.

Probabilidade de trocar de carro em até 3 anos: 0.2

Portanto, C_1 assume os valores:

$$C_1 = \begin{cases} 73.16 + 13.05 \times 12 \times 3 = 542.96, & \text{com probabilidade } 0.8 \\ 73.16 + 13.05 \times 12 \times 3 + 43.83 = 586.79, & \text{com probabilidade } 0.2 \end{cases}$$

$$\mathbb{E}(C_1) = 542.96 \times 0.8 + 586.79 \times 0.2 = 551.73$$

C_2 : custo do plano 2 por 3 anos.

C_2 assume o valor $17.28 \times 12 \times 3 = 622.08$, com probabilidade 1

$$\mathbb{E}(C_2) = 622.08$$

Assumindo que você queira assinar por um período de 6 anos. Vamos definir:

Assumindo que você queira assinar por um período de 6 anos. Vamos definir:

C_1 : custo do plano 1 por 6 anos.

Probabilidade de trocar de carro em até 6 anos: 0.9

Assumindo que você queira assinar por um período de 6 anos. Vamos definir:

C_1 : custo do plano 1 por 6 anos.

Probabilidade de trocar de carro em até 6 anos: 0.9

Portanto, C_1 assume os valores:

$$C_1 = \begin{cases} 2 \times 73.16 + 13.05 \times 12 \times 6 = 1085.92, & \text{com prob. } 0.1 \\ 2 \times 73.16 + 13.05 \times 12 \times 6 + 43.83 = 1129.75, & \text{com prob. } 0.9 \end{cases}$$

$$\mathbb{E}(C_1) = 1085.92 \times 0.1 + 1129.75 \times 0.9 = 1125.37$$

Assumindo que você queira assinar por um período de 6 anos. Vamos definir:

C_1 : custo do plano 1 por 6 anos.

Probabilidade de trocar de carro em até 6 anos: 0.9

Portanto, C_1 assume os valores:

$$C_1 = \begin{cases} 2 \times 73.16 + 13.05 \times 12 \times 6 = 1085.92, & \text{com prob. } 0.1 \\ 2 \times 73.16 + 13.05 \times 12 \times 6 + 43.83 = 1129.75, & \text{com prob. } 0.9 \end{cases}$$

$$\mathbb{E}(C_1) = 1085.92 \times 0.1 + 1129.75 \times 0.9 = 1125.37$$

C_2 : custo do plano 2 por 6 anos.

Assumindo que você queira assinar por um período de 6 anos. Vamos definir:

C_1 : custo do plano 1 por 6 anos.

Probabilidade de trocar de carro em até 6 anos: 0.9

Portanto, C_1 assume os valores:

$$C_1 = \begin{cases} 2 \times 73.16 + 13.05 \times 12 \times 6 = 1085.92, & \text{com prob. } 0.1 \\ 2 \times 73.16 + 13.05 \times 12 \times 6 + 43.83 = 1129.75, & \text{com prob. } 0.9 \end{cases}$$

$$\mathbb{E}(C_1) = 1085.92 \times 0.1 + 1129.75 \times 0.9 = 1125.37$$

C_2 : custo do plano 2 por 6 anos.

C_2 assume o valor $17.28 \times 12 \times 6 = 1244.16$, com probabilidade 1

Assumindo que você queira assinar por um período de 6 anos. Vamos definir:

C_1 : custo do plano 1 por 6 anos.

Probabilidade de trocar de carro em até 6 anos: 0.9

Portanto, C_1 assume os valores:

$$C_1 = \begin{cases} 2 \times 73.16 + 13.05 \times 12 \times 6 = 1085.92, & \text{com prob. } 0.1 \\ 2 \times 73.16 + 13.05 \times 12 \times 6 + 43.83 = 1129.75, & \text{com prob. } 0.9 \end{cases}$$

$$\mathbb{E}(C_1) = 1085.92 \times 0.1 + 1129.75 \times 0.9 = 1125.37$$

C_2 : custo do plano 2 por 6 anos.

C_2 assume o valor $17.28 \times 12 \times 6 = 1244.16$, com probabilidade 1

$$\mathbb{E}(C_2) = 1244.16$$

- [OpenIntro](#): seção 2.4.
- [Ross](#): seções 5.1, 5.2, 5.3.
- Magalhães: seção 3.1.