



HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Avdeling for informatikk og e-læring

Målform:	Bokmål					
Eksamensdato:	12. desember 2014					
Varighet/eksamenstid:	09:00 – 13:00					
Emnekode:	TDAT2002					
Emnenavn:	Matematikk 2					
Klasse(r):	Ing 2					
Studiepoeng:	10 (denne deleksamenen teller 45% av sluttresultatet)					
Faglærer(e): <small>(navn og telefonnr på eksamensdagen)</small>	Anette Wrålsen (mobil 97 79 68 78) Hans Jakob Rivertz (mobil 93 83 21 72)					
Kontaktperson(adm.) <small>(fylles ut ved behov – kun ved kursemner)</small>						
Hjelpemidler:	Godkjent kalkulator emnetype 1					
Oppgavesettet består av: <small>(antall oppgaver og antall sider inkl. forside)</small>	5 oppgaver og 6 sider					
Vedlegg består av: <small>(antall sider)</small>	3					

Merknad:

Oppgaveteksten kan beholdes av studenter som sitter eksamenstiden ut.

NB! Les gjennom hele oppgavesettet før du begynner arbeidet, og disponer tiden.

Dersom noe virker uklart i oppgavesettet, skal du gjøre dine egne antagelser og forklare dette i besvarelsen.

Lykke til!

Husk: Ha alltid med nok begrunnelse/utregning til at det ikke er tvil om hvordan du har løst oppgaven for å få full uttelling!

Oppgave 1 (20%)

a) La $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{\emptyset, \{1\}, 2, 3\}$ og $C = \{0, 1\}$ være mengder. Avgjør om påstandene under er sanne eller usanne:

- (i) $A \cup C = A$
- (ii) $A - C = \{2, 3\}$ ($-$ = mengdedifferens)
- (iii) $A \cap B = \{1, 2, 3\}$
- (iv) A og C er komplementære mengder.
- (v) $(A - B) \cap C \subseteq B$
- (vi) $\emptyset \subseteq B$
- (vii) $\emptyset \in B$
- (viii) $\{\emptyset\} \subseteq B$
- (ix) $A - B = A \cap B^c$
- (x) $\mathcal{P}(C) \cap B = \emptyset$

b) Beskriv funksjoner fra A til C (der A og C er mengdene i a)) som har følgende egenskaper:

- (i) Surjektiv men ikke injektiv.
- (ii) Injektiv men ikke surjektiv.
- (iii) Verken injektiv eller surjektiv.

Hvis du mener noe av dette er umulig, forklar hvorfor.

Oppgave 2 (20%)

a) La A og B være mengder inneholdt i en universalmengde \mathcal{U} .

- (i) Vis eller motbevis at uansett hva A og B er, er mengdene

$$A - B, B - A \text{ og } A \cap B$$

parvis disjunkte (det vil si at hvert par av dem er disjunkte).

- (ii) Vis eller motbevis at $A - B, B - A$ og $A \cap B$ gir en oppdeling av $A \cup B$.

b) Vis at for alle heltall n har vi at 3 *ikke* deler $n^2 + 1$.

Oppgave 3 (20%)

a) Finn

$$17^{35} + 676^7 \cdot 3 \pmod{39}.$$

b) Gi et induksjonsbevis for følgende kongruensregningsregel:

For alle heltall $n \geq 1$ har vi at hvis $a \equiv c \pmod{m}$, så er

$$a^n \equiv c^n \pmod{m},$$

der m er et heltall større enn 1.**Oppgave 4 (25%)** Vi definerer funksjonen $f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 3x$.a) Regn ut de første ordens og andre ordens partiellderiverte til f . Skriv ned gradienten ∇f .b) Bestem de kritiske punktene til $f(x, y)$.c) Regn ut diskriminanten $D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ for alle de kritiske punktene og bestem hvilke typer disse er (sadel-punkt, lokalt minimum, lokalt maksimum.)d) La C være sirkelen med radius $\sqrt{3}$ og senter i origo. ($g(x, y) = x^2 + y^2 = 3$.) Vis med hjelp av Lagrange multiplikator at på sirkelen C har $f(x, y)$ seks kritiske punkter $(\pm 2, 0)$, $(\pm 1, \pm\sqrt{2})$.e) Finn ligningen til tangentplanet til grafen $z = f(x, y)$ i punktet $(1, 1, 1)$.**Oppgave 5 (15%)**a) Finn gradienten til $f(x, y, z) = xy + 2yz + 3zx$.b) Finn den retningsderivate til $f(x, y, z)$ i retningen $\mathbf{u} = (1/3, 2/3, 2/3)$ i punktet $(1, 1, 1)$.c) I hvilken retning øker $f(x, y, z)$ mest i punktet $(1, 1, 1)$?

1. LOGIKK

Logikklovene

Kommutative lover:	$p \wedge q \equiv q \wedge p$	$p \vee q \equiv q \vee p$
Assosiative lover:	$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$	$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$
Distributive lover:	$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
Identitetslover:	$p \wedge \mathbf{t} \equiv p$	$p \vee \mathbf{c} \equiv p$
Negasjonslover:	$p \vee \sim p \equiv \mathbf{t}$	$p \wedge \sim p \equiv \mathbf{c}$
Dobbel negativ-lov:	$\sim(\sim p) \equiv p$	
Idempotente lover:	$p \wedge p \equiv p$	$p \vee p \equiv p$
Universalgrenselover:	$p \vee \mathbf{t} \equiv \mathbf{t}$	$p \wedge \mathbf{c} \equiv \mathbf{c}$
DeMorgans lover:	$\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$	$\sim(p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$
Absorpsjonslover:	$p \vee (p \wedge q) \equiv p$	$p \wedge (p \vee q) \equiv p$
Negasjon av \mathbf{t} og \mathbf{c} :	$\sim \mathbf{t} \equiv \mathbf{c}$	$\sim \mathbf{c} \equiv \mathbf{t}$

2. INDUKSJON OG REKURSJON

Regneregler for rekker

Hvis $a_m, a_{m+1}, a_{m+2}, \dots$ og $b_m, b_{m+1}, b_{m+2}, \dots$ er følger av reelle tall og c er et reelt tall, har vi følgende for ethvert heltall $n \geq m$:

$$\sum_{k=m}^n a_k + \sum_{k=m}^n b_k = \sum_{k=m}^n (a_k + b_k)$$

$$c \cdot \sum_{k=m}^n a_k = \sum_{k=m}^n (c \cdot a_k)$$

$$\left(\prod_{k=m}^n a_k \right) \cdot \left(\prod_{k=m}^n b_k \right) = \prod_{k=m}^n (a_k \cdot b_k)$$

Noen kjente rekker

Summen av de n første heltallene: For alle heltall $n \geq 1$ er

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Summen av en geometrisk rekke: For alle heltall $n \geq 0$ og alle reelle tall $r \neq 1$ er

$$\sum_{i=0}^n r^i = \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1}$$

Prinsippet for matematisk induksjon

La $P(n)$ være en påstand om heltall n , og la a være et bestemt heltall. Anta videre følgende:

- 1) $P(a)$ er sann. (**Basissteg**)
- 2) For ethvert heltall $k \geq a$, hvis $P(k)$ er sann så er $P(k+1)$ sann. (**Induktivt steg**)

Da er $P(n)$ sann for alle heltall $n \geq a$.

Prinsippet for sterk matematisk induksjon

La $P(n)$ være en påstand om heltall n , og la a og b være bestemte heltall slik at $a \leq b$. Anta videre følgende:

- 1) $P(a), P(a+1), \dots, P(b)$ er sanne. (**Basissteg**)
- 2) For ethvert heltall $k > b$, hvis $P(i)$ er sann for alle heltall i slik at $a \leq i < k$, så er $P(k)$ sann. (**Induktivt steg**)

Da er $P(n)$ sann for alle heltall $n \geq a$.

Andreordens lineære homogene differensligninger med konstante koeffisienter

La følgen $a_0, a_1, a_2 \dots$ oppfylle en differensligning

$$a_k = Aa_{k-1} + Ba_{k-2} \text{ for alle heltall } k \geq 2 \text{ og reelle tall } A, B,$$

og la a_0 og a_1 være gitte tall (initialbetingelser).

Tilfelle 1: Distinkte røtter

Hvis den karakteristiske ligningen

$$t^2 - At - B = 0$$

har to forskjellige røtter r og s , er følgen gitt ved formelen

$$a_n = Cr^n + Ds^n \text{ for alle } n \geq 0.$$

Tilfelle 2: Sammenfallende røtter

Hvis den karakteristiske ligningen

$$t^2 - At - B = 0$$

bare har en dobbelrot $t = r$, er følgen gitt ved formelen

$$a_n = Cr^n + Dnr^n \text{ for alle } n \geq 0.$$

I begge tilfeller bestemmes C og D ut fra initialbetingelsene.

3. MENGDELÆRE

Mengdelovene

Alle mengder er inneholdt i en universalmengde U .

Kommutative lover:	$A \cap B = B \cap A$	$A \cup B = B \cup A$
Assosiative lover:	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
Distributive lover:	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
Identitetslover:	$A \cap U = A$	$A \cup \emptyset = A$
Negasjonslover:	$A \cup A^c = U$	$A \cap A^c = \emptyset$
Dobbel negativ-lov:	$(A^c)^c = A$	
Idempotente lover:	$A \cap A = A$	$A \cup A = A$
Universalgrenselover:	$A \cup U = U$	$A \cap \emptyset = \emptyset$
DeMorgans lover:	$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$	$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
Absorpsjonslover:	$A \cup (A \cap B) = A$	$A \cap (A \cup B) = A$
Komplement av U og \emptyset :	$U^c = \emptyset$	$\emptyset^c = U$
Mengdedifferensloven:	$A - B = A \cap B^c$	

4. TALLTEORI

Aritmetikkens fundamentalteorem

Gitt et heltall n eksisterer det et positivt heltall k , forskjellige primtall $p_1, p_2, p_3, \dots, p_k$ og positive heltall $e_1, e_2, e_3, \dots, e_k$ slik at

$$n = p_1^{e_1} \cdot p_2^{e_2} \cdot p_3^{e_3} \cdot \dots \cdot p_k^{e_k}.$$

Videre er denne måten å skrive n som et produkt av primtall på unik bortsett fra rekkefølgen på faktorene.

Euklids algoritme

Euklids algoritme brukes til å bestemme $\gcd(A, B)$ for to heltall A og B , der vi antar at $A > B \geq 0$.

1. Hvis $B = 0$, er $\gcd(A, B) = A$.
2. Hvis ikke, finn q og r slik at

$$A = Bq + r \text{ slik at } 0 \leq r < B.$$

Da er $\gcd(A, B) = \gcd(B, r)$.

3. Sett $A := B$ og $B := r$ og gå tilbake til trinn 1.

Regneregler for kongruenser

La a, b, c, d, n være heltall slik at $n > 1$, og anta at $a \equiv c \pmod{n}$ og $b \equiv d \pmod{n}$. Da har vi at

- a) $(a + b) \equiv (c + d) \pmod{n}$
- b) $(a - b) \equiv (c - d) \pmod{n}$
- c) $ab \equiv cd \pmod{n}$
- d) $a^m \equiv c^m \pmod{n}$ for alle positive heltall m .

5. RSA

RSA er offentlig nøkkel-kryptografi. Et RSA-kryptosystem er basert på to (helst veldig store) primtall p og q .

Prosedyre for å finne nøkler

1. Finn et tall e som er relativt primisk med $(p-1)(q-1)$ og finn så en positiv invers d til dette tallet modulo $(p-1)(q-1)$.
2. La $n = pq$. Da blir (n, e) offentlig nøkkel og
3. (n, d) privat nøkkel.

Kryptering og dekryptering

Du ønsker å sende en melding M . Du må da kjenne mottakerens offentlige nøkkel (n, e) .

- Den krypterte meldingen C er gitt ved

$$C \equiv M^e \pmod{n}.$$

- C dekrypteres av mottakeren ved å beregne

$$M \equiv C^d \pmod{n}.$$

6. FLERVARIABELANALYSE

Diverse formler

Likningen for sirkelen med radius r og sentrum i (x_0, y_0) :

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$$

Likningen for ellipsen med sentrum i (x_0, y_0) og halvaksler a og b :

$$1 = \frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2}$$

Tangentplanet til funksjonen $z = f(x, y)$ i punktet (x_0, y_0, z_0) :

$$z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

Lineærapprosimasjonen til funksjonen $z = f(x, y)$ rundt punktet $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$:

$$L(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

Gradienten til en funksjon $z = f(x, y)$:

$$\nabla f = f_x(x, y)\mathbf{i} + f_y(x, y)\mathbf{j}$$

Den retningsderiverte til en funksjon $z = f(x, y)$ i retningen gitt ved enhetsvektoren \vec{u} :

$$D_{\vec{u}}f = \nabla f \cdot \vec{u}$$