

# TRAVAUX DIRIGÉS ECT1

## Description macroscopique d'un système thermodynamique à l'équilibre

### Niveau 1

#### \*Exercice 1. Propriétés d'un gaz parfait

##### MASSE VOLUMIQUE

1. Exprimer la masse volumique  $\rho$  d'un gaz parfait en fonction de la pression  $P$ , de la température  $T$  et de la masse molaire  $M$ .
2. Calculer la masse volumique  $\rho_0$  de l'air dans les conditions normales de pression et de température :  $\theta_0 = 0^\circ\text{C}$  et  $P_0 = 1,013 \text{ bar}$ .
3. Quelle est l'expression de  $\rho$  pour l'air en fonction de  $\rho_0$  ?

##### VOLUME MOLAIRE

4. Exprimer le volume molaire  $V_m$  d'un gaz parfait en fonction de la pression  $P$  et de la température  $T$ .
5. Calculer le volume molaire  $V_m$  de l'air dans les conditions normales de pression et de température, puis dans les conditions standard de pression et de température :  $\theta_0 = 25^\circ\text{C}$  et  $P_1 = 1,013 \text{ bar}$ .

##### DENSITÉ


La densité  $d$  d'un gaz parfait est le rapport de la masse d'un certain volume de ce gaz par la masse du même volume de gaz parfait de référence (l'air) dans les mêmes conditions de température et de pression.

6. Exprimer la densité  $d$  en fonction de la masse molaire  $M$  du gaz parfait et de la masse molaire  $M_a$  de l'air.

Données :  $R = 8,31 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$  Masse molaire de l'air :  $M_a = 29 \text{ g.mol}^{-1}$

#### \*Exercice 2. Piston à deux compartiments

Une enceinte cylindrique de section  $S$  et de longueur  $L$  est partagée en deux compartiments par un piston adiabatique de masse  $m$ . Dans chaque compartiment, on place une mole de gaz parfait. Les gaz ont une température  $T_0$ . Par un système de chauffage annexe, on chauffe le gaz de gauche jusqu'à la température  $2T_0$ , le gaz de droite étant maintenu à la température  $T_0$ . On repère le piston par sa coordonnée  $x$  depuis le bord gauche de l'enceinte. On note  $P_1$  la pression dans le compartiment de gauche et  $P_2$  la pression dans le compartiment de droite.



1. Montrer qu'à l'équilibre mécanique la pression est la même dans les deux compartiments.
2. Avant chauffage, déterminer la position  $x_P$  du piston et la pression  $P_0$  des gaz.
3. Après chauffage, déterminer la nouvelle position  $x'_P$  du piston, puis la nouvelle pression  $P'_0$  dans les compartiments en fonction de  $P_0$ .

### Exercice 3. Énergie interne d'un gaz : gaz réel ou parfait ?

Les valeurs expérimentales de l'énergie interne massique de la vapeur d'eau, exprimées en  $\text{J.kg}^{-1}$ , sont les suivantes :

| $T$ (K)          | 523         | 573         | 623         | 673         |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| à $P_1 = 10$ bar | $2711.10^3$ | $2793.10^3$ | $2874.10^3$ | $2956.10^3$ |
| à $P_2 = 20$ bar | $2683.10^3$ | $2773.10^3$ | $2859.10^3$ | $2944.10^3$ |

1. Tracer les courbes donnant l'énergie interne massique en fonction de la température.
2. A-t-on un gaz parfait ? Justifier.
3. Comparer la capacité thermique molaire à volume constant à celle d'un gaz parfait monoatomique.

### Exercice 4. Bouteille de diazote

Une bouteille de volume  $V_1 = 100$  L contient du diazote à la température  $T_1 = 300$  K sous la pression  $p_1 = 10$  bar.

1. Quel est le nombre  $n_1$  de moles de diazote dans la bouteille ? On donne la constante des gaz parfaits  $R = 8,31 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$ .
2. Sachant que la masse molaire du diazote est  $M_{N_2} = 28 \text{ g.mol}^{-1}$ , quelle est la masse volumique  $\rho$  du gaz dans la bouteille ?
3. On ouvre la bouteille et le diazote se détend à l'air libre, dont la pression et la température sont respectivement  $p_a = 1,0$  bar et  $T_a = 300$  K. Exprimer le volume  $V_2$  du diazote détendu.
4. Calculer le volume  $V$  de diazote qui s'est échappé de la bouteille.
5. Dans la gamme de température considérées dans l'exercice, on admet que l'énergie interne du gaz parfait diatomique s'écrit  $U = \frac{5}{2}nRT$  où  $T$  est la température du gaz et  $n$  son nombre de moles. Calculer l'énergie interne  $U_1$  du diazote comprimé dans la bouteille, puis celle  $U_2$  du diazote détendu.

## SOLUTIONS

### \*Exercice 1. Propriétés d'un gaz parfait

1. Équation d'état :  $PV = nRT \Leftrightarrow V = \frac{nRT}{P}$

Masse volumique :  $\rho = \frac{m}{V} = \frac{mP}{nRT}$  et masse molaire :  $M = \frac{m}{n}$  d'où :  $\boxed{\rho = \frac{MP}{RT}}$

2. **Attention aux unités SI !**

Conditions normales de pression et de température :  $T_0 = 273 \text{ K}$  et  $P_0 = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$  ; masse molaire :  $M_a = 29 \cdot 10^{-3} \text{ kg.mol}^{-1}$

$$\boxed{\rho_0 = \frac{M_a P_0}{RT_0} = 1,29 \text{ kg.m}^{-3}}$$

3.  $\rho_0 = \frac{M_a P_0}{RT_0} \Leftrightarrow \frac{M_a}{R} = \rho_0 \frac{T_0}{P_0}$  et  $\rho = \frac{M_a P}{RT}$  soit  $\boxed{\rho = \rho_0 \frac{T_0}{P_0} \frac{P}{T}}$

4. Équation d'état :  $PV = nRT$  d'où volume molaire  $\boxed{V_m = \frac{RT}{P}}$

5. Conditions normales de pression et de température :  $T_0 = 273 \text{ K}$  et  $P_0 = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$  :  $\boxed{V_m = 22,4 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1} = 22,4 \text{ L.mol}^{-1}}$

Conditions standard de pression et de température :  $T_1 = 298 \text{ K}$  et  $P_1 = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$  :  $\boxed{V_m = 24,5 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1} = 24,5 \text{ L.mol}^{-1}}$

Le volume molaire est le même pour tous les gaz parfaits.

6. Densité :  $d = \frac{m}{m_a}$  pour un volume  $V$ . Si le volume  $V$  considéré est le volume

molaire  $V_m$ , sachant qu'il est identique pour tous les gaz parfaits, alors, le rapport de masses devient un rapport de masses molaires :

$$\boxed{d = \frac{M}{M_a} = \frac{M}{29}} \text{ avec } M \text{ en g.mol}^{-1}$$

### \*Exercice 2. Piston à deux compartiments

1. Système : piston horizontal de masse  $m$

Référentiel terrestre supposé galiléen

Bilan des forces : Poids  $\vec{P} = -mg\vec{e}_z$

Réaction normale de l'enceinte :  $\vec{R}_N = R_N \vec{e}_z$

Force pressante exercée par le gaz de gauche :  $\vec{F}_1 = P_1 S \vec{e}_x$

Force pressante exercée par le gaz de droite :  $\vec{F}_2 = -P_2 S \vec{e}_x$

PFS :  $\vec{P} + \vec{R}_N + \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$

Projection du PFS sur (Ox) :  $P_1 S - P_2 S = 0 \Leftrightarrow \boxed{P_1 = P_2}$

2. Volume du compartiment de gauche :  $V_1 = S x_p$

Volume du compartiment de droite :  $V_2 = S(L - x_p)$

Équation d'état des GP :

- Pour  $n = 1$  mol de gaz à gauche :  $P_1 V_1 = n R T_0 \Leftrightarrow P_1 = \frac{R T_0}{S x_p}$
- Pour  $n = 1$  mol de gaz à droite :  $P_2 V_2 = n R T_0 \Leftrightarrow P_2 = \frac{R T_0}{S(L - x_p)}$

Équilibre mécanique :  $P_1 = P_2$  d'où  $L - x_p = x_p \Leftrightarrow \boxed{x_p = \frac{L}{2}}$  : le piston est au milieu de l'enceinte.

Pression à l'équilibre :  $\boxed{P_1 = P_2 = P_0 = \frac{2 R T_0}{S L}}$

3. Raisonnement analogue :  $P'_1 = \frac{R 2 T_0}{S x'_p}$  et  $P'_2 = \frac{R T_0}{S(L - x'_p)}$

Équilibre mécanique :  $P'_1 = P'_2 \Leftrightarrow L - x'_p = \frac{x'_p}{2} \Leftrightarrow 3 \frac{x'_p}{2} = L$  soit  $\boxed{x'_p = \frac{2}{3} L}$

Pression à l'équilibre :  $P'_1 = P'_2 = P'_0 = \frac{2 R T_0}{2 S L} 3$  soit  $\boxed{P'_0 = 3 \frac{R T_0}{S L} = \frac{3}{2} P_0}$

### Exercice 3. Énergie interne d'un gaz : gaz réel ou parfait ?

3.  $C_{Vm1} = 29,4 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$ ,  $C_{Vm2} = 31,3 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$ ,  $C_{Vm1}, C_{Vm2} > C_{Vm,GPM}$

### Exercice 4. Bouteille de diazote

1.  $n_1 = 40 \text{ mol}$  2.  $\rho = 11 \text{ kg.m}^{-3}$  3.  $V_2 = 1,0 \text{ m}^3$  4.  $V = 0,9 \text{ m}^3$  5.  $U_1 = U_2 = 0,25 \text{ MJ}$