

1. Calcul de l'intégrale de Dirichlet : $\int_0^{\infty} \frac{\sin t}{t} dt$.

- (a) A l'aide d'une intégration par parties sur des segments justifier l'existence de l'intégrale puis, montrer :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t^2} dt$$

(indication : $t \mapsto 1 - \cos t$ est une primitive de $t \mapsto \sin t$)

- (b) Montrer que $I_n = \int_{t=0}^{\pi/2} \frac{\sin^2 nt}{t^2} dt$ est comprise entre :

$$A_n = \int_{t=0}^{\pi/2} \frac{\sin^2 nt}{\sin^2 t} dt \text{ et } B_n = \int_{t=0}^{\pi/2} \cotan^2 t \sin^2 nt dt.$$

- (c) Démontrer que $A_n + A_{n+2} - 2A_{n+1} = 0$ et $A_n - B_n = \frac{\pi}{4}$.
En déduire les valeurs de A_n et B_n en fonction de n .

- (d) Montrer que $\frac{I_n}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} J = \int_{t=0}^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t^2} dt$ et donner la valeur de cette dernière intégrale.

En déduire la valeur de l'intégrale de Dirichlet : $\int_0^{\infty} \frac{\sin t}{t} dt$.

2. Calcul de l'intégrale de Gauss : $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$.

- (a) Montrer que pour $0 \leq x \leq \sqrt{n}$ on a : $\left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n \leq e^{-x^2}$ et pour x quelconque : $e^{-x^2} \leq \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n}$.

- (b) Calculer les intégrales $I_n = \int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{t^2}{n}\right)^n dt$ et $J_n = \int_0^{+\infty} \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-n} dt$ en fonction des intégrales : $K_p = \int_0^{\pi/2} \cos^p t dt$.

- (c) On admet que $K_p \sim \sqrt{\frac{\pi}{2p}}$ quand $p \rightarrow \infty$. (cf compo 1)

En déduire la valeur de l'intégrale de Gauss : $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$.

